

(Testfragen)

Welche der folgenden Aussagen sind in der Ebene wahr bez. falsch?

- a) wahr
- b) falsch
- c) falsch
- d) wahr so liegen f und h parallel.

(G 1) Geraden in der Ebene

Es seien $P = (2, 0)$, $Q = (5, 4)$ sowie $R = (3, 3)$ drei Punkte und g die Gerade durch P und Q .

- a) Richtungsvektor der Geraden ist $\vec{PQ} = (3, 4)^T$, also ist eine Parameterdarstellung $\vec{r} = (2, 0)^T + t(3, 4)^T$, $t \in \mathbb{R}$.
- b) Wähle A , B und C so, dass P und Q die Gleichung $Ax + By = C$ erfüllen, z.B. $4x - 3y = 8$.
- c) nein, P erfüllt nicht die Gleichung aus b).
- c) Der Richtungsvektor dieser Gerade steht senkrecht auf dem Richtungsvektor von g und ist also $(-4, 3)^T$. Eine Geradengleichung lautet dann $3x + 4y = 21$.
- e) Löse das Gleichungssystem $4x - 3y = 8$ und $3x + 4y = 21$, Lösung ist $x = \frac{19}{5}$ und $y = \frac{12}{5}$, also ist der Schnittpunkt $(\frac{19}{5}, \frac{12}{5})$.

(G 2) Hessesche Normalform

Die Gerade g sei durch die Parameterdarstellung $\vec{r} = (2, 1)^T + t(3, 2)^T$.

- a) Normalenvektor ist $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{13}}(-2, 3)^T$ und ein Punkt auf g ist $P = (2, 1)$.
- b) Eine Geradengleichung lautet $-2x + 3y + 1 = 0$ und eine Hesse-Normalform von g ist $\frac{-2}{\sqrt{13}}x + \frac{3}{\sqrt{13}}y + \frac{1}{\sqrt{13}} = 0$.
- c) Man setzt $(1, 1)$ in die Hesse-Normalform von g ein und erhält $d = |\frac{-2}{\sqrt{13}} + \frac{3}{\sqrt{13}} + \frac{1}{\sqrt{13}}| = \frac{2}{\sqrt{13}}$.

(G 3) Länge und Skalarprodukt von Vektoren

- a) Der Winkel berechnet sich über $\cos \alpha = \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{|\vec{r}| |\vec{s}|} = \frac{7}{\sqrt{25} \sqrt{2}} = 0,99$ und damit $\alpha = 8,1^\circ$.
- b) Ist $\alpha \in [0, \pi)$ der Winkel zwischen \vec{r} und \vec{s} und $\beta \in [0, \pi)$ der zwischen $a\vec{r}$ und $b\vec{s}$, so gilt

$$\cos \beta = \frac{(a\vec{r}) \cdot (b\vec{s})}{|a\vec{r}| |b\vec{s}|} = \frac{ab \vec{r} \cdot \vec{s}}{|a| |b| |\vec{r}| |\vec{s}|} = \frac{ab \vec{r} \cdot \vec{s}}{ab |\vec{r}| |\vec{s}|} = \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{|\vec{r}| |\vec{s}|} = \cos \alpha$$

und damit $\beta = \alpha$ (Wegen $a, b > 0$ ist $|a| = a$ und $|b| = b$.)

- c) Wir benutzen die Definition der Norm $|\vec{r}| = \sqrt{\vec{r} \cdot \vec{r}}$ und erhalten

$$\begin{aligned} |\vec{u} + \vec{v}|^2 + |\vec{u} - \vec{v}|^2 &= (\vec{r} + \vec{s}) \cdot (\vec{r} + \vec{s}) + (\vec{r} - \vec{s}) \cdot (\vec{r} - \vec{s}) \\ &= \vec{r} \cdot \vec{r} + 2\vec{r} \cdot \vec{s} + \vec{s} \cdot \vec{s} + \vec{r} \cdot \vec{r} - 2\vec{r} \cdot \vec{s} + \vec{s} \cdot \vec{s} = 2(|\vec{r}|^2 + |\vec{s}|^2). \end{aligned}$$

Die zwei Vektoren \vec{r} und \vec{s} spannen ein Parallelogramm auf, dessen Diagonalen gerade $\vec{r} + \vec{s}$ und $\vec{r} - \vec{s}$ sind. Hat also ein Parallelogramm die Seitenlängen a und b und die Diagonalenlängen c und d , so gilt $c^2 + d^2 = 2(a^2 + b^2)$, daher der Name Parallelogrammgleichung.



(H 1) Geraden in der Ebene

Die Gerade g sei durch die Gleichung $2x + y = 10$ erklärt. Die Gerade h enthalte den Punkt $(1, 1)$ und besitze den Richtungsvektor $(1, 3)^T$.

- Schnittpunkt mit x -Achse: Setze $y = 0$ in Gleichung für g ein, dann ist $x = 5$, also Schnittpunkt $(5, 0)$ analog Schnittpunkt mit y -Achse: $(0, 10)$.
- Diese Gerade hat Richtungsvektor $(-1, 2)$, also denselben Richtungsvektor wie g , die Geraden sind parallel. Da $(3, 3)$ nicht auf g liegt (erfüllt nicht die Gleichung von g), stimmen diese beiden Geraden nicht überein.
- Parameterdarstellung von g : $\vec{r} = (5, 0)^T + t(-1, 2)^T$, $t \in \mathbb{R}$; Gleichung für h : $-3x + y = -2$.
- Schnittpunkt von g und h : $(\frac{12}{5}, \frac{26}{5})$.

(H 2) Hesse-Normalform

Die Gerade g gehe durch die Punkte $(1, -1)$ sowie $(4, 3)$, die Gerade h ist durch die Gleichung $y - x = 1$ gegeben.

- Hesse-Normalform von g : $-\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y + \frac{7}{5} = 0$ und die von h : $-\frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y - \frac{1}{\sqrt{2}} = 0$.
- Alle Punkte, welche von g den Abstand 1 haben, werden durch die Gleichung $1 = d = |-\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y + \frac{7}{5}|$ beschrieben. Nach Auflösen des Betrages erhält man die Gleichung $\pm 5 = -4x + 3y + 7$. Zusammen mit der Gleichung $y - x = 1$ von h erhält man ein Gleichungssystem, dessen zwei Lösungen $(5, 6)$ und $(15, 16)$ sind.

(H 3) Dreieck in der Ebene

Ein Dreieck PQR ist gegeben durch die drei Eckpunkte $P = (1, 2)$, $Q = (3, 1)$ und $R = (5, 4)$.

- Es sind $a = |\vec{PQ}| = \sqrt{5}$, $b = |\vec{PR}| = \sqrt{20}$ und $c = |\vec{QR}| = \sqrt{13}$.
- Es ist $\cos \alpha = \frac{\vec{PQ} \cdot \vec{PR}}{|\vec{PQ}| |\vec{PR}|} = \frac{6}{\sqrt{5} \sqrt{20}} = 0.6$, damit $\alpha = 53.13^\circ$.
- Es ist $A = \frac{1}{2} \sqrt{5} \sqrt{20} \sin \alpha = 4$. *Hinweis*: $A = 4$ ist das exakte Ergebnis! (keine Rundungsfehler)