



Analysis III

8. Tutorium

(T 1) Reelle Differentiale

Wir identifizieren die reellen Vektorräume \mathbb{C} und \mathbb{R}^2 vermöge $z = x + iy$, $x = \operatorname{Re}(z)$, $y = \operatorname{Im}(z)$. Bezeichnet man den Real und den Imaginärteil einer reell differenzierbare Funktion $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ mit u bzw. v , so hat die Jacobimatrix von f die Gestalt

$$J_f := \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix}$$

Das Bild einer komplexen Zahl unter der Ableitung df ist somit durch $df(h) = J_f(\operatorname{Re}(h), \operatorname{Im}(h))^T$ gegeben.

- Zeigen Sie $df(h) = df(1) \cdot \operatorname{Re}(h) + df(i) \cdot \operatorname{Im}(h)$.
- Beweisen Sie, daß sich die reell lineare Abbildung df in einen komplex linearen und einen komplex antilinearen Anteil zerlegen läßt, d.h. daß es stetige Funktionen λ und μ mit $df(h) = \lambda h + \mu \bar{h}$ gibt.
- Beschreiben Sie die Funktionen λ und μ durch die Funktionen u_x, u_y, v_x und v_y .

(T 2) Wirtinger-Kalkül

Wir betrachten wieder die Menge aller reell differenzierbaren Funktionen $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Auf dieser Menge definiert man durch

$$\frac{\partial}{\partial z} := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) \quad \text{und} \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

die **Wirtinger Ableitungen** $\frac{\partial}{\partial z}$ und $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$. Wie zuvor sei $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ eine reell differenzierbare Abbildung.

- Zeigen Sie, daß die Wirtinger Ableitungen \mathbb{C} -lineare Abbildungen sind.
- Beschreiben Sie die Funktionen λ und μ aus Aufgabe T1 durch die Ableitungen $\frac{\partial f}{\partial z}$ und $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$.
- Beweisen Sie, daß f genau dann holomorph ist, wenn $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ gilt.

(T 3) Wirtinger-Kalkül II

Es sei $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ eine reell differenzierbare Funktion und $c \in \mathbb{C}$.

- Zeigen Sie $\overline{\frac{\partial f}{\partial z}} = \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}$.
- Beweisen Sie, daß es stetige Funktionen $f_1, f_2 : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ gibt, so daß

$$f(z) = f(c) + (z - c)f_1(z) + (\bar{z} - \bar{c})f_2(z)$$

gilt.

- (c) Beweisen Sie, daß für die Wirtinger Ableitungen $\frac{\partial}{\partial z}$ bzw. $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ jeweils die Produk- und die Kettenregel gilt.
- (d) Beweisen Sie, daß der Laplace-Operator $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ die folgende Identität erfüllt:

$$\Delta = 4 \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}}$$