

Wahrscheinlichkeit und Statistik

Skript zur Vorlesung:
Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, WS 2006.

*Prof. Dr. Michael Kohler
Fachrichtung 6.1 - Mathematik
Universität des Saarlandes
Postfach 151150
D-66041 Saarbrücken*

`kohler@math.uni-sb.de`
<http://www.uni-sb.de/ag-statistik/>

“Those who ignore Statistics are condemned to reinvent it.”

BRAD EFRON

“Was war das für eine Stimme?” schrie Arthur.

“Ich weiß es nicht”, brüllte Ford zurück, “ich weiß es nicht. Es klang wie eine Wahrscheinlichkeitsrechnung.”

“Wahrscheinlichkeit? Was willst du damit sagen?”

“Eben Wahrscheinlichkeit. Verstehst du, so was wie zwei zu eins, drei zu eins, fünf zu vier. Sie sagte, zwei hoch einhunderttausend zu eins. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, verstehst du?”

Ein Fünf-Millionen-Liter-Bottich Vanillesoße ergoß sich ohne Warnung über sie.

“Aber was soll das denn?” rief Arthur.

“Was, die Vanillesoße?”

“Nein, die Wahrscheinlichkeitsrechnung!”

DOUGLAS ADAMS

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation	3
1.1	Statistik-Prüfung, Herbst 2001	3
1.2	Sex und Herzinfarkt	4
1.3	Die Challenger-Katastrophe	5
1.4	Genetischer Fingerabdruck	7
1.5	Präsidentenwahl in den USA, Herbst 2000	8
1.6	Personalisierung von Internetseiten	9
2	Erhebung von Daten	11
2.1	Kontrollierte Studien	11
2.2	Beobachtungsstudien	17
2.3	Umfragen	20
3	Deskriptive und explorative Statistik	24
3.1	Histogramme	26
3.2	Dichteschätzung	28
3.3	Statistische Maßzahlen	33
3.4	Regressionsrechnung	37
3.5	Nichtparametrische Regressionsschätzung	46

<i>INHALTSVERZEICHNIS</i>	2
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie	49
4.1 Grundaufgaben der Kombinatorik	49
4.2 Der Begriff des Wahrscheinlichkeitsraumes	55
4.3 Konstruktion von W-Räumen	67
4.3.1 Laplacesche W-Räume	67
4.3.2 W-Räume mit Zähldichten	71
4.3.3 W-Räume mit Dichten	78
4.3.4 Verallgemeinerung der Begriffe Dichte und Zähldichte . . .	82
4.4 Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit	84
4.5 Zufallsvariablen	90
4.6 Erwartungswert	103
4.6.1 Diskrete Zufallsvariablen	105
4.6.2 Stetig verteilte Zufallsvariablen	106
4.6.3 Berechnung allgemeinerer Erwartungswerte	107
4.6.4 Mathematisch exakte Definition des Erwartungswertes . .	112
4.7 Varianz	121
4.8 Gesetze der großen Zahlen	126
4.9 Der zentrale Grenzwertsatz	129
5 Induktive Statistik	135
5.1 Einführung	135
5.2 Punktschätzverfahren	138
5.3 Statistische Testverfahren	147

Kapitel 4

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der mathematischen Beschreibung *zufälliger* Phänomene. Dabei kann das Auftreten des Zufalls verschiedene Ursachen haben: Zum einen kann es auf unvollständiger Information basieren. Ein Beispiel dafür wäre ein Münzwurf, bei dem man sich vorstellen kann, dass bei exakter Beschreibung der Ausgangslage (Startposition der Münze, Beschleunigung am Anfang) das Resultat (Münze landet mit Kopf oder mit Zahl nach oben) genau berechnet werden kann. Allerdings ist es häufig unmöglich, die Ausgangslage genau zu beschreiben, und es bietet sich daher eine stochastische Modellierung an, bei der man die unbestimmten Größen als zufällig ansieht. Zum anderen kann das Auftreten des Zufalls zur Vereinfachung der Analyse eines deterministischen Vorgangs künstlich eingeführt werden. Beispiele dafür wurden bereits in Kapitel 2 gegeben, wo man statt einer (sehr aufwendigen) Befragung der gesamten Grundmenge bei einer Umfrage nur eine zufällig ausgewählte kleine Teilmenge betrachtet hat.

4.1 Grundaufgaben der Kombinatorik

Manchmal lassen sich Fragestellungen der Wahrscheinlichkeitstheorie durch einfaches Abzählen der “günstigen” bzw. “möglichen” Fälle bestimmen. Dafür sind die in diesem Abschnitt behandelten Formeln der Kombinatorik extrem nützlich.

Betrachtet wird das Ziehen von k Elementen aus einer Grundmenge Ω vom Um-

fang $|\Omega| = n$. Die Anzahl aller möglichen Stichproben sei N .

Dabei kann man vier verschiedene Vorgehensweisen unterscheiden, und zwar je nachdem, ob man die Elemente unmittelbar nach dem Ziehen wieder zurücklegt oder nicht, und je nachdem, ob man die Reihenfolge, in der die Elemente gezogen werden, beachtet oder nicht.

Zuerst betrachten wir das Ziehen **mit Zurücklegen** und **mit Berücksichtigung der Reihenfolge**. Hierbei wird k mal ein Element aus der Grundmenge gezogen, dabei hat man jeweils n Möglichkeiten, so dass man für die Anzahl der möglichen Stichproben erhält:

$$N = n \cdot n \cdot n \cdot \dots \cdot n = n^k.$$

Als nächstes wird das Ziehen **ohne Zurücklegen** und **mit Berücksichtigung der Reihenfolge** betrachtet. Hier hat man für das erste Element n Möglichkeiten, für das zweite aber nur noch $n - 1$, für das dritte $n - 2$, u.s.w., und für das k -te noch $(n - k + 1)$ Möglichkeiten. Damit erhält man für die Anzahl der möglichen Stichproben:

$$N = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}.$$

Dabei ist $n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 1$ (gesprochen: n Fakultät) die sogenannte Fakultät von n .

Nun wird das Ziehen **ohne Zurücklegen** und **ohne Berücksichtigung der Reihenfolge** betrachtet. Ordnet man jede der dabei erhaltenen Stichproben auf alle $k!$ möglichen Weisen um, so erhält man alle Stichproben bzgl. Ziehen ohne Zurücklegen und mit Berücksichtigung der Reihenfolge.

Beispiel: Für $\Omega = \{1, 2, 3\}$, $n = 3$ und $k = 2$ erhält man die Zuordnungen

$$\begin{aligned} (1, 2) &\mapsto (1, 2) \text{ oder } (2, 1) \\ (1, 3) &\mapsto (1, 3) \text{ oder } (3, 1) \\ (2, 3) &\mapsto (2, 3) \text{ oder } (3, 2) \end{aligned}$$

Daher gilt für die Anzahl der möglichen Stichproben:

$$\begin{aligned} &N \cdot k! \\ &= \text{Wert beim Ziehen ohne Zurücklegen und mit Berücksichtigung} \\ &\quad \text{der Reihenfolge} \\ &= \frac{n!}{(n - k)!}, \end{aligned}$$

also

$$N = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} = \binom{n}{k}.$$

Hierbei ist $\binom{n}{k}$ (gesprochen: n über k) der sogenannte Binomialkoeffizient.

Beispiel 4.1 *Binomischer Lehrsatz.*

Zur Illustration der Nützlichkeit der obigen Formel zeigen wir im Folgenden, dass für beliebige $a, b \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

(sogenannter Binomischer Lehrsatz).

Beweis: Wir schreiben $(a+b)^n$ in die Form

$$(a+b)^n = (a+b) \cdot (a+b) \cdot \dots \cdot (a+b),$$

wobei das Produkt aus genau n Faktoren besteht. Beim Ausmultiplizieren kann man sich bei jedem Faktor für a oder b entscheiden. Wählt man k -mal a und $(n-k)$ -mal b , so erhält man den Summanden $a^k b^{n-k}$. Da es genau

$$\binom{n}{k}$$

Möglichkeiten gibt, k -mal a und $(n-k)$ -mal b zu wählen, taucht nach vollständigem Ausmultiplizieren der Summand $a^k b^{n-k}$ genau $\binom{n}{k}$ mal auf. \square

Zum Abschluss wird noch das Ziehen **mit Zurücklegen** und **ohne Berücksichtigung der Reihenfolge** betrachtet. Hierbei gilt für die Anzahl der möglichen Stichproben:

$$N = \binom{n+k-1}{k}.$$

Beweis: Gesucht ist die Anzahl der Elemente der Menge

$$A = \{(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{N}^k : 1 \leq x_1 \leq \dots \leq x_k \leq n\}.$$

Durch die Zuordnung

$$(x_1, \dots, x_k) \mapsto (x_1, x_2 + 1, x_3 + 2, \dots, x_k + k - 1)$$

wird jedem Element aus A genau ein Element (!) aus der Menge

$$B = \{(y_1, \dots, y_k) \in \mathbb{N}^k : 1 \leq y_1 < y_2 < \dots < y_k \leq n+k-1\}$$

zugeordnet.

Beispiel: Für $\Omega = \{1, 2, 3\}$, $n = 3$ und $k = 2$ erhält man die Zuordnungen

$$\begin{aligned}(1, 1) &\mapsto (1, 2) \\ (1, 2) &\mapsto (1, 3) \\ (1, 3) &\mapsto (1, 4) \\ (2, 2) &\mapsto (2, 3) \\ (2, 3) &\mapsto (2, 4) \\ (3, 3) &\mapsto (3, 4)\end{aligned}$$

Um dies formal nachzuweisen, betrachten wir die Abbildung

$$f : A \rightarrow B, f((x_1, \dots, x_k)) = (x_1, x_2 + 1, x_3 + 2, \dots, x_k + k - 1).$$

Für $(x_1, \dots, x_k) \in A$ gilt $1 \leq x_1 \leq \dots \leq x_k \leq n$, was impliziert $1 \leq x_1 < x_2 + 1 < x_3 + 2 < \dots < x_k + k - 1 \leq n + k - 1$, woraus folgt, dass $f((x_1, \dots, x_k))$ in B liegt. Daher ist die Abbildung f wohldefiniert.

Als nächstes zeigen wir, dass sie auch *injektiv* ist. Seien dazu $(x_1, \dots, x_k), (y_1, \dots, y_k) \in A$ gegeben mit

$$f((x_1, \dots, x_k)) = f((y_1, \dots, y_k)).$$

Dies bedeutet

$$(x_1, x_2 + 1, x_3 + 2, \dots, x_k + k - 1) = (y_1, y_2 + 1, y_3 + 2, \dots, y_k + k - 1),$$

woraus folgt $x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_k = y_k$, also

$$(x_1, \dots, x_k) = (y_1, \dots, y_k).$$

Abschließend zeigen wir noch, dass f auch *surjektiv* ist. Dazu wählen wir $(y_1, \dots, y_k) \in B$ beliebig. Dann gilt

$$1 \leq y_1 < y_2 < y_3 < \dots < y_k \leq n + k - 1,$$

woraus folgt

$$1 \leq y_1 \leq y_2 - 1 \leq y_3 - 2 \leq \dots \leq y_k - (k - 1) \leq n,$$

was bedeutet, dass $(y_1, y_2 - 1, \dots, y_k - (k - 1))$ in A liegt. Wegen

$$f((y_1, y_2 - 1, \dots, y_k - (k - 1))) = (y_1, \dots, y_k)$$

folgt die Surjektivität von f .

Da zwei Mengen, zwischen denen eine bijektive (d.h. injektive und surjektive) Abbildung existiert, immer die gleiche Anzahl an Elementen haben, folgt $N = |A| = |B|$ und mit der oben hergeleiteten Formel für das Ziehen *ohne Zurücklegen* und *ohne Berücksichtigung der Reihenfolge* erhält man:

$$N = |A| = |B| = \binom{n+k-1}{k}.$$

□

Die Ergebnisse dieses Abschnitts sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst.

Anzahl Möglichkeiten	Ziehen mit Zurücklegen	Ziehen ohne Zurücklegen
Ziehen mit Berücksichtigung der Reihenfolge	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$
Ziehen ohne Berücksichtigung der Reihenfolge	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$

Tabelle 4.1: Grundformeln der Kombinatorik.

Eine weitere Illustration der Nützlichkeit der obigen Formeln erfolgt im nächsten Beispiel. In diesem wird gleichzeitig eine grundlegende Schlussweise der Statistik eingeführt.

Beispiel 4.2 *Die an der Universität Stuttgart im Sommer 2002 abgehaltene schriftliche Prüfung "Statistik II für WiWi" wurde von mehreren Prüfern korrigiert. Dabei bewertete Korrektor K von 98 Klausuren 8 mit der Note 5,0, während Korrektor W von 102 Klausuren nur 1 mit der Note 5,0 benotete. Kann man daraus schließen, dass Korrektor K strenger korrigierte als Korrektor W?*

Offensichtlich hat Korrektor K prozentual deutlich mehr Klausuren mit der Note 5,0 bewertet als Korrektor W. Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieser Unterschied vielleicht nur durch das zufällige Aufteilen der Klausuren auf zwei Korrektoren auftrat.

Um dies zu beantworten, gehen wir zunächst einmal von der Annahme aus, dass beide Korrektoren genau gleich korrigiert haben, und betrachten den Fall, dass $98 + 102 = 200$ Klausuren, von denen $8 + 1 = 9$ mit der Note 5,0 zu bewerten sind, rein zufällig auf diese beiden Korrektoren aufgeteilt werden. Wissen möchten wir, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass in diesem Fall der Korrektor, der

98 der Klausuren bekommt, mindestens 8 mit der Note 5,0 bewertet. Sofern diese Wahrscheinlichkeit sich als klein herausstellen wird (und in der Statistik betrachtet man aus historischen Gründen meist Wahrscheinlichkeiten unter 0,05 als klein), ist es nicht plausibel, dass wir bei Gültigkeit der obigen Annahme ein solches Resultat beobachten würden. Der übliche statistische Schluss ist dann, die obige Annahme zu verwerfen.

Zur Berechnung der gesuchten Wahrscheinlichkeit betrachten wir das folgende *Urnenmodell*. In einer Urne sind 200 Kugeln, und zwar 9 rote und 191 schwarze Kugeln. Aus diesen werden "rein zufällig" 98 Kugeln gezogen. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass unter den 98 gezogenen Kugeln mindestens 8 rote Kugeln sind ?

Wir betrachten das Ziehen ohne Zurücklegen und ohne Beachtung der Reihenfolge. Dies ist auf insgesamt

$$\binom{200}{98}$$

verschiedenen Arten möglich. Da die Reihenfolge hierbei nicht beachtet wird, kann man o.B.d.A. davon ausgehen, dass man zuerst die roten Kugeln und dann erst die schwarzen Kugeln zieht. Um genau 8 rote Kugeln dabei zu erhalten, muss man aus den 9 roten Kugeln 8 ziehen und sodann aus den 191 schwarzen Kugeln 90 ziehen, was auf

$$\binom{9}{8} \cdot \binom{191}{90}$$

verschiedene Arten möglich ist. Analog erhält man, dass Ziehen von genau 9 roten Kugeln auf

$$\binom{9}{9} \cdot \binom{191}{89}$$

vielen Arten möglich ist.

Da jede dieser Kombinationen der Kugeln mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftritt, erhält man für die gesuchte Wahrscheinlichkeit

$$\frac{\text{Anzahl günstiger Fälle}}{\text{Anzahl möglicher Fälle}} = \frac{\binom{9}{8} \cdot \binom{191}{90} + \binom{9}{9} \cdot \binom{191}{89}}{\binom{200}{98}} \approx 0,015,$$

und man kommt zu dem Schluss, dass die Annahme des rein zufälligen Verteilens der Noten 5,0 auf die beiden Korrektoren bei den aufgetretenden Beobachtungen nicht plausibel ist.

Dennoch kann man hier nicht auf Unterschiede bei den beiden Korrektoren schließen. Vielmehr ist es plausibel, dass die Klausuren keineswegs zufällig aufgeteilt

wurden. Die Klausuren wurden nämlich in der Reihenfolge der Abgabe der Studenten eingesammelt, und dann in zwei Teile unterteilt. Dabei ist zu vermuten, dass einer der beiden Korrektoren vor allem Abgaben von den Studenten erhalten hat, die auf die Klausur nur sehr schlecht vorbereitet waren, nur eine der vier Aufgaben bearbeiten konnten und daher die Klausur frühzeitig wieder abgegeben haben.

4.2 Der Begriff des Wahrscheinlichkeitsraumes

Ausgangspunkt der folgenden Betrachtungen ist ein *Zufallsexperiment mit unbestimmtem Ergebnis* $\omega \in \Omega$. Zur Illustration dienen die folgenden beiden Beispiele.

Beispiel 4.3 *Ein Spieler zahlt zu Beginn 1.50 Euro. Dann werden vier Münzen geworfen, und zwar zwei 1 Euro Münzen und zwei 50 Cent Münzen, und der Spieler bekommt alle die Münzen, die mit Kopf nach oben landen.*

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert der Münzen, die der Spieler bekommt, höher ist als der Einsatz von 1.50 Euro ?

Beispiel 4.4 *Student S. fährt immer mit dem Auto zur Uni. Dabei passiert er eine Ampelanlage, bei der sich eine zweiminütige Grünphase mit einer dreiminütigen Rotphase abwechselt.*

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er an der Ampel länger als eine Minute warten muss, vorausgesetzt seine Ankunft an der Ampel erfolgt rein zufällig innerhalb eines fünfminütigen Intervalls, bestehend aus Grün- und Rotphase ?

Zur mathematischen Modellierung der obigen Zufallsexperimente, wird zuerst einmal die **Menge aller möglichen Ergebnisse** (Beobachtungen) festgelegt.

Definition 4.1 *Die Menge $\Omega \neq \emptyset$ aller möglichen Ergebnisse ω des Zufallsexperiments heißt **Grundmenge** (oder **Ergebnisraum**, **Ergebnismenge** oder **Stichprobenraum**). Die Elemente $\omega \in \Omega$ heißen **Elementarereignisse**.*

Für die Wahl des Ergebnisses ω des betrachteten Zufallsexperiments (und damit auch für die Grundmenge Ω) gibt es meistens mehrere verschiedene Möglichkeiten. Z.B. kann man in Beispiel 4.3 den Gewinn (d.h. die Differenz zwischen ausgezahltem Betrag und Einsatz) des Spielers als Ergebnis ω des Zufallsexperimentes wählen. In diesem Fall ist

$$\Omega = \{-1.5, -1, -0.5, 0, 0.5, 1, 1.5\},$$

oder auch eine Obermenge davon, z.B. $\Omega = [-1.5, 1.5]$ oder $\Omega = \mathbb{R}$. Die Modellierung wird aber (wie wir später sehen werden) deutlich einfacher, wenn man als Ergebnis des Zufallsexperiments die Lage der vier Münzen nach dem Werfen wählt. In diesem Fall ist

$$\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4)$$

mit $\omega_i \in \{K, Z\}$. Dabei seien die Münzen von 1 bis 4 durchnummeriert, die Münzen 1 und 2 haben den Wert 1 Euro, die Münzen 3 und 4 den Wert 50 Cent, und $\omega_i = K$ (bzw. $\omega_i = Z$) bedeutet, dass die i -te Münze mit Kopf (bzw. Zahl) nach oben landet. Die Grundmenge ist dann

$$\Omega = \{(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4) : \omega_i \in \{K, Z\}\}$$

Auch in Beispiel 4.4 gibt es mehrere Möglichkeiten für die Wahl des Ergebnisses des Zufallsexperiments. Betrachtet man die Wartezeit an der Ampel als ω , so ist die Grundmenge gegeben durch

$$\Omega = [0, 3]$$

(bzw. durch eine Obermenge davon, z.B. $\Omega = \mathbb{R}_+$). Wie wir später sehen werden, wird die Berechnung der gesuchten Wahrscheinlichkeit aber einfacher, wenn man den Eintreffzeitpunkt in Minuten relativ zu Beginn der letzten Rotphase als ω wählt. In diesem Fall ist

$$\Omega = [0, 5]$$

(bzw. eine Obermenge davon).

Gesucht ist in beiden Beispielen nach der Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis ω des Zufallsexperimentes in einer Menge $A \subseteq \Omega$ zu liegen kommt.

Definition 4.2 *Teilmengen A der Grundmenge Ω heißen **Ereignisse**. Ein Ereignis tritt ein, falls das Ergebnis ω des Zufallsexperiments in A liegt.*

Wählt man in Beispiel 4.3 den Gewinn des Spielers als Ergebnis ω des Zufallsexperiments (und dann z.B. $\Omega = \{-1.5, -1, -0.5, 0, 0.5, 1, 1.5\}$), so ist dort nach der Wahrscheinlichkeit gefragt, dass ω in

$$A = \{0.5, 1, 1.5\}$$

zu liegen kommt. Wählt man dagegen

$$\Omega = \{(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4) : \omega_i \in \{K, Z\}\},$$

d.h., ist die Lage der Münzen das Ergebnis des Zufallsexperimentes, so ist A die Menge aller der $(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4)$, bei denen der Wert der Münzen mit Kopf oben

größer als 1.50 Euro ist. Diese Menge lässt sich am einfachsten durch Betrachtung aller Möglichkeiten für die Lage der Münzen bestimmen.

Zur Bestimmung von A betrachten wir alle 16 Elemente von Ω und bestimmen jeweils den Wert der Münzen mit Kopf oben.

ω_1 1 Euro	ω_2 1 Euro	ω_3 50 Cent	ω_4 50 Cent	Wert der Münzen mit Kopf oben
K	K	K	K	3
K	K	K	Z	2.5
K	K	Z	K	2.5
K	K	Z	Z	2
K	Z	K	K	2
K	Z	K	Z	1.5
K	Z	Z	K	1.5
K	Z	Z	Z	1
Z	K	K	K	2
Z	K	K	Z	1.5
Z	K	Z	K	1.5
Z	K	Z	Z	1
Z	Z	K	K	1
Z	Z	K	Z	0.5
Z	Z	Z	K	0.5
Z	Z	Z	Z	0

Aus der obigen Tabelle liest man ab:

$$A = \{(Z, K, K, K), (K, Z, K, K), (K, K, Z, Z), (K, K, Z, K), (K, K, K, Z), (K, K, K, K)\}.$$

Als nächstes betrachten wir nochmals Beispiel 4.4. Betrachtet man hier den Eintreffzeitpunkt in Minuten relativ zu Beginn der letzten Rotphase als Ergebnis des Zufallsexperiments (und setzt $\Omega = [0, 5]$), so ist die Wartezeit an der Ampel genau dann länger als eine Minute, wenn man weniger als zwei Minuten nach Beginn der letzten Rotphase an der Ampel eintrifft. In diesem Fall ist also nach der Wahrscheinlichkeit gefragt, dass ω in

$$A = [0, 2)$$

zu liegen kommt.

Im Folgenden wollen wir nun Teilmengen A der Grundmenge Ω Wahrscheinlichkeiten, d.h. Zahlen aus dem Intervall $[0, 1]$, zuweisen. Die intuitive Bedeutung

dieser Wahrscheinlichkeiten ist wie folgt: Führt man das Zufallsexperiment viele Male unbeeinflusst voneinander hintereinander durch, so soll die relative Anzahl des Eintretens von A (d.h., des Auftretens eines Ergebnisses ω , welches in A liegt) ungefähr gleich $\mathbf{P}(A)$ sein.

Hier gibt es zuerst einmal eine naive Möglichkeit für die Festlegung der Wahrscheinlichkeiten. Dabei legt man für jedes $\tilde{\omega} \in \Omega$ die Wahrscheinlichkeit $P(\{\tilde{\omega}\})$, dass das Ergebnis des Zufallsexperiments gerade gleich $\tilde{\omega}$ ist, fest, und setzt dann

$$\mathbf{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbf{P}(\{\omega\}),$$

d.h., die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt ist gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Elemente in A .

Dies ist problemlos möglich in Beispiel 4.3. Wählt man hier

$$\Omega = \{(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4) : \omega_i \in \{K, Z\}\},$$

so ist

$$A = \{(Z, K, K, K), (K, Z, K, K), (K, K, Z, Z), (K, K, Z, K), \\ (K, K, K, Z), (K, K, K, K)\}.$$

Jedes Element ω von Ω tritt dann mit gleicher Wahrscheinlichkeit

$$\mathbf{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{16}$$

auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein ω in $A \subseteq \Omega$ auftritt, ist dann

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(A) &= \sum_{\omega \in A} \mathbf{P}(\{\omega\}) = \sum_{\omega \in A} \frac{1}{|\Omega|} = \frac{|A|}{|\Omega|} \\ &= \frac{\text{“Anzahl der für } A \text{ günstigen Fälle”}}{\text{“Anzahl der möglichen Fälle”}}. \end{aligned}$$

Mit $|A| = 6$ berechnet sich die gesuchte Wahrscheinlichkeit zu

$$\mathbf{P}(A) = 6/16 = 3/8.$$

Dieser Zugang ist in Beispiel 4.4 aber nicht möglich. Betrachtet man hier den Eintreffzeitpunkt in Minuten relativ zu Beginn der letzten Rotphase als Ergebnis des Zufallsexperiments (und setzt $\Omega = [0, 5]$), so ist die Wahrscheinlichkeit $\mathbf{P}(\{\omega\})$, genau ω Minuten nach der letzten Rotphase einzutreffen, für alle $\omega \in [0, 5]$ gleich

Null. Denn diese ist sicherlich nicht größer als die Wahrscheinlichkeit, dass der Eintreffzeitpunkt im Intervall $[\omega - \epsilon, \omega + \epsilon]$ liegt ($\epsilon > 0$ beliebig), und da letztere proportional zur Intervalllänge ist, liegt sie für ϵ klein beliebig nahe bei Null.

Als alternativen Zugang in Beispiel 4.4 bietet sich an, die Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen innerhalb eines Intervalls $[a, b) \subseteq [0, 5)$ proportional zur Intervalllänge zu wählen. Genauer setzt man

$$\mathbf{P}([a, b)) = \frac{\text{Länge von } [a, b)}{\text{Länge von } [0, 5)} = \frac{b - a}{5},$$

und erhält die gesuchte Wahrscheinlichkeit zu

$$\mathbf{P}([0, 2)) = \frac{2}{5} = 0,4.$$

Nachteil der obigen Ansätze ist, dass sie ziemlich unsystematisch sind. Insbesondere werden hier die beiden Beispiele auf verschiedene Arten gelöst. Möchte man nun gewisse theoretische Aussagen über die zugrunde liegenden stochastischen Strukturen herleiten, so muss man dies für beide Fälle separat machen. Um dies zu vermeiden, verallgemeinern wir beide Fälle im Folgenden. Dabei fordern wir, motiviert von Eigenschaften relativer Häufigkeiten, dass bei der Zuweisung von Wahrscheinlichkeiten zu Mengen gewisse Eigenschaften vorliegen sollen. Anschließend werden wir separat untersuchen, wie man Abbildungen konstruieren kann, die diese Eigenschaften besitzen, und welche Schlussfolgerungen man hinsichtlich des Ausgangs von Zufallsexperimenten, die durch solche Abbildungen beschrieben werden, ziehen kann.

Ziel im Folgenden ist die Festlegung von Eigenschaften, die die Zuweisung von Wahrscheinlichkeiten (d.h. Zahlen aus dem Intervall $[0, 1]$) zu Teilmengen der Grundmenge Ω , haben soll. Diese Zuweisung kann zusammengefasst werden zu einer Abbildung

$$\mathbf{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1].$$

Hierbei ist $\mathcal{P}(\Omega) = \{A \mid A \subseteq \Omega\}$ die sogenannte *Potenzmenge* von Ω , d.h., die Menge aller Teilmengen von Ω . \mathbf{P} weist jeder Menge $A \subseteq \Omega$ eine Zahl $\mathbf{P}(A) \in [0, 1]$ zu.

Da das Ergebnis unseres Zufallsexperiments niemals in der leeren Menge \emptyset sowie immer in der Grundmenge Ω zu liegen kommt, ist eine naheliegende Forderung an \mathbf{P} :

$$\mathbf{P}(\emptyset) = 0 \quad \text{und} \quad \mathbf{P}(\Omega) = 1.$$

Ist außerdem A eine beliebige Teilmenge von Ω und $A^c = \Omega \setminus A$ das sogenannte *Komplement* von A bestehend aus allen Elementen von Ω , die nicht in A enthalten

sind, so liegt das Ergebnis des Zufallsexperiments genau dann in A^c , wenn es nicht in A liegt. Dies legt die Forderung

$$\mathbf{P}(A^c) = 1 - \mathbf{P}(A)$$

nahe. Sind darüberhinaus A und B zwei *disjunkte* Teilmengen von Ω , d.h. zwei Teilmengen von Ω mit $A \cap B = \emptyset$, so liegt das Ergebnis des Zufallsexperiments genau dann in $A \cup B$, wenn es entweder in A oder in B liegt. Dies motiviert die Forderung

$$\mathbf{P}(A \cup B) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B) \quad \text{falls } A \cap B = \emptyset.$$

Durch wiederholtes Anwenden folgt daraus

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &= \mathbf{P}(A_1) + \mathbf{P}(A_2 \cup \dots \cup A_n) \\ &= \dots \\ &= \mathbf{P}(A_1) + \mathbf{P}(A_2) + \dots + \mathbf{P}(A_n) \end{aligned}$$

für *paarweise disjunkte* Mengen $A_1, \dots, A_n \subseteq \Omega$, d.h. für Mengen mit $A_i \cap A_j = \emptyset$ für alle $i \neq j$. Hinsichtlich der Herleitung von theoretischen Aussagen wird es sich als sehr günstig erweisen, dies auch für Vereinigungen von abzählbar vielen paarweise disjunkten Mengen zu fordern:

$$\mathbf{P}(\cup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}(A_n) \quad \text{für } A_n \subseteq \Omega \text{ mit } A_i \cap A_j = \emptyset \text{ für } i \neq j.$$

Dies führt auf

Definition 4.3 (*Vorläufige Definition des Wahrscheinlichkeitsmaßes*).

Sei Ω eine nichtleere Menge. Eine Abbildung

$$\mathbf{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$$

heißt **Wahrscheinlichkeitsmaß** (kurz: *W-Maß*), falls gilt:

(i) $\mathbf{P}(\emptyset) = 0, \mathbf{P}(\Omega) = 1.$

(ii) Für alle $A \subseteq \Omega$:

$$\mathbf{P}(A^c) = 1 - \mathbf{P}(A).$$

(iii) Für alle $A, B \subseteq \Omega$ mit $A \cap B = \emptyset$:

$$\mathbf{P}(A \cup B) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B).$$

(iv) Für alle $A_1, A_2, \dots \subseteq \Omega$ mit $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $i \neq j$:

$$\mathbf{P} \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}(A_n)$$

(sog. σ -Additivität).

In diesem Falle heißt $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbf{P})$ **Wahrscheinlichkeitsraum** (kurz: *W-Raum*), $\mathbf{P}(A)$ **Wahrscheinlichkeit** des Ereignisses $A \subseteq \Omega$.

Die hier geforderten Eigenschaften sind z.B. im Falle

$$\Omega = \{(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4) : \omega_i \in \{K, Z\}\}$$

für

$$\mathbf{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1], \quad \mathbf{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

erfüllt (vergleiche Beispiel 4.3 und Satz 4.1).

Will man jedoch auch für Beispiel 4.4 einen Wahrscheinlichkeitsraum (mit den Eigenschaften aus der obiger Definition) konstruieren, so stößt man auf das folgende technische Problem: Man kann zeigen, dass keine Abbildung $\mathbf{P} : \mathcal{P}([0, 5]) \rightarrow [0, 1]$ existiert, für die einerseits

$$\mathbf{P}([a, b]) = \frac{b - a}{5} \quad \text{für alle } 0 \leq a < b \leq 5$$

gilt, und die andererseits ein W-Maß ist, d.h. für die die Eigenschaften (i) bis (iv) aus der obigen Definition erfüllt sind.

Um dieses Problem zu umgehen, legt man in solchen Beispielen nicht die Wahrscheinlichkeiten für *alle* Teilmengen von Ω fest, sondern nur für einen möglichst "großen" Teil dieser Mengen. Ohne Probleme kann man die Wahrscheinlichkeiten für die Mengen \emptyset und Ω festlegen. Die leere Menge \emptyset beschreibt das sogenannte unmögliche Ereignis, welches nie eintritt, und dem man daher die Wahrscheinlichkeit Null zuweisen kann. Die gesamte Grundmenge Ω steht für das Ereignis, das immer eintritt, und dem man die Wahrscheinlichkeit Eins zuordnen kann. Außerdem sollte es nach Festlegung der Wahrscheinlichkeiten zweier Ereignisse A und B auch möglich sein, die Wahrscheinlichkeit, dass A oder B (oder beide) eintreten, d.h., dass ein $\omega \in A \cup B$ eintritt, sowie die Wahrscheinlichkeit, dass A und B eintreten, d.h., dass ein $\omega \in A \cap B$ eintritt, und die Wahrscheinlichkeit, dass A nicht eintritt, d.h., dass ein $\omega \in A^c = \Omega \setminus A$ eintritt, festzulegen. Hierbei heißt A^c das *komplementäre Ereignis* zu A .

Dies motiviert, dass die Menge aller Ereignisse, für die man die Wahrscheinlichkeiten festlegt, zumindest \emptyset und Ω enthalten sollte, sowie mit zwei Ereignissen A und B auch $A \cup B$, $A \cap B$ und A^c enthalten sollte. Aus technischen Gründen (hinsichtlich asymptotischen Aussagen) ist es darüberhinaus auch sinnvoll zu fordern, dass die sukzessive Anwendung von abzählbar vielen Mengenoperationen wie Vereinigung, Schnitt und Komplementbildung, auf solche Mengen wieder eine Menge ergibt, für die man die Wahrscheinlichkeit festlegen kann. Dies führt auf den Begriff der sogenannten σ -Algebra:

Definition 4.4 Sei Ω eine nichtleere Menge. Eine Menge \mathcal{A} von Teilmengen von Ω heißt σ -Algebra (über Ω), falls gilt:

- (i) $\emptyset \in \mathcal{A}$ und $\Omega \in \mathcal{A}$.
- (ii) Aus $A \in \mathcal{A}$ folgt $A^c := \Omega \setminus A \in \mathcal{A}$.
- (iii) Aus $A, B \in \mathcal{A}$ folgt $A \cup B \in \mathcal{A}$, $A \cap B \in \mathcal{A}$ und $A \setminus B \in \mathcal{A}$.
- (iv) Sind $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, so ist auch $\cup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$ und $\cap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

Eine σ -Algebra ist also eine Menge von Teilmengen von Ω , die \emptyset und Ω enthält, und bei der man bei Anwendung von endlich oder abzählbar unendlich vielen der üblichen Mengenoperationen auf Mengen aus der σ -Algebra immer wieder eine Menge erhält, die in der σ -Algebra enthalten ist.

Beispiele:

a) Sei $\Omega \neq \emptyset$ beliebig. Dann sind $\{\emptyset, \Omega\}$ und $\mathcal{P}(\Omega)$ σ -Algebren über Ω .

b) Wir betrachten das Werfen eines Würfels. Als Augenzahl kann dabei eine der Zahlen $1, \dots, 6$ auftreten, so dass man $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ setzt. Als σ -Algebren kommen dann Teilmengen der Potenzmenge von Ω in Frage, d.h., Mengen, deren Elemente wieder Mengen sind und zwar Teilmengen von Ω . Hier ist $\mathcal{A} = \{\emptyset, \{1\}, \Omega\}$ keine σ -Algebra über Ω , da

$$\{1\} \in \mathcal{A} \quad \text{aber} \quad \{1\}^c = \{2, 3, 4, 5, 6\} \notin \mathcal{A}.$$

Wie man leicht sieht, ist aber $\mathcal{A} = \{\emptyset, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}, \Omega\}$ eine σ -Algebra über Ω .

Ist die Grundmenge wie im hier vorliegenden Fall endlich oder abzählbar unendlich, so wird in Anwendungen immer die σ -Algebra $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ verwendet.

c) Als nächstes betrachten wir die stochastische Modellierung der Lebensdauer einer Glühbirne. Hier tritt als Resultat des Zufallsexperiments eine Zahl $t \geq$

0 (z.B. Lebensdauer in Sekunden) auf. Der Einfachheit halber wählen wir als Grundmenge sogar die etwas zu große Menge $\Omega = \mathbb{R}$.

Es stellt sich dann die Frage, was eine sinnvolle Wahl für die σ -Algebra über \mathbb{R} ist. $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{R})$ ist zwar eine σ -Algebra über \mathbb{R} , sie ist aber für die Festlegung von Wahrscheinlichkeiten (siehe oben) meist zu groß.

Statt dessen verwendet man:

\mathcal{A} = kleinste σ -Algebra, die alle Intervalle der Form $(a, b] := \{x : a < x \leq b\}$ ($a, b \in \mathbb{R}$) enthält.

Formal kann man diese kleinste σ -Algebra definieren als Menge bestehend aus allen denjenigen Teilmengen von \mathbb{R} , die die Eigenschaft haben, dass sie in allen σ -Algebren, die alle Intervalle der Form $(a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}$) enthalten, enthalten sind. Nach Definition sind Mengen aus dieser σ -Algebra in jeder σ -Algebra enthalten, die alle Intervalle der Form $(a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}$) enthält. Darüberhinaus kann man leicht zeigen, dass es sich bei dieser Menge von Mengen um eine σ -Algebra handelt (z.B. enthält sie die leere Menge, da diese ja nach Definition in jeder der σ -Algebren, die alle Intervalle enthalten, enthalten ist).

Man bezeichnet diese σ -Algebra als **Borelsche σ -Algebra** über \mathbb{R} und verwendet dafür häufig die Abkürzung \mathcal{B} . Man kann zeigen, dass sie alle in der Praxis vorkommenden Teilmengen von \mathbb{R} (wie z.B. Einpunktmengen, abzählbare Mengen, Intervalle, offene Mengen, abgeschlossene Mengen, ...) enthält.

Wir erweitern nun den Begriff des Wahrscheinlichkeitsraums aus Definition 4.3, indem wir die Wahrscheinlichkeiten nicht mehr für alle Teilmengen von Ω festlegen, sondern nur für diejenigen, die in einer vorgegebenen σ -Algebra enthalten sind.

Definition 4.5 (*Endgültige Definition des Wahrscheinlichkeitsmaßes*).

Sei Ω eine nichtleere Menge und \mathcal{A} eine σ -Algebra über Ω . Eine Abbildung

$$\mathbf{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$$

heißt **Wahrscheinlichkeitsmaß** (kurz: *W-Maß*), falls gilt:

(i) $\mathbf{P}(\emptyset) = 0, \mathbf{P}(\Omega) = 1.$

(ii) Für alle $A \in \mathcal{A}$:

$$\mathbf{P}(A^c) = 1 - \mathbf{P}(A).$$

(iii) Für alle $A, B \in \mathcal{A}$ mit $A \cap B = \emptyset$:

$$\mathbf{P}(A \cup B) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B).$$

(iv) Für alle $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ mit $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $i \neq j$:

$$\mathbf{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}(A_n)$$

(sog. σ -Additivität).

In diesem Falle heißt $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ **Wahrscheinlichkeitsraum** (kurz: *W-Raum*), $\mathbf{P}(A)$ **Wahrscheinlichkeit** des Ereignisses $A \in \mathcal{A}$.

Für die Wahl der σ -Algebra ist es im Falle einer endlichen oder abzählbar unendlichen Grundmenge Ω üblich, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ zu setzen. Im Falle von $\Omega = \mathbb{R}$ wählt man meistens $\mathcal{A} = \mathcal{B}$, d.h., man wählt die oben eingeführte Borelsche σ -Algebra. Dies hat den Vorteil, dass man z.B. ein W-Maß $\mathbf{P} : \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$ konstruieren kann mit

$$\mathbf{P}([a, b)) = \frac{b - a}{5} \quad \text{für alle } 0 \leq a < b \leq 5.$$

Dieses kann dann zur Beschreibung der Situation in Beispiel 4.4 verwendet werden.

Zum Nachweis, dass eine Abbildung $\mathbf{P} : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ ein W-Maß ist, muss man nicht alle Forderungen aus Definition 4.5 nachrechnen. Es gilt nämlich

Lemma 4.1 *Sei Ω eine nichtleere Menge und \mathcal{A} eine σ -Algebra über Ω . Dann ist eine Abbildung*

$$\mathbf{P} : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$$

genau dann ein W-Maß, wenn sie die drei folgenden Eigenschaften hat:

1. $\mathbf{P}(A) \geq 0$ für alle $A \in \mathcal{A}$.
2. $\mathbf{P}(\Omega) = 1$.
3. Für alle $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ mit $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $i \neq j$ gilt

$$\mathbf{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}(A_n).$$

Beweis. Es ist klar, dass ein W-Maß die Eigenschaften 1. bis 3. aus Lemma 4.1 hat. Also genügt es im Folgenden zu zeigen, dass bei Gültigkeit von 1. bis 3. die Bedingungen (i) bis (iv) aus Definition 4.5 sowie $\mathbf{P}(A) \leq 1$ für alle $A \in \mathcal{A}$ erfüllt sind.

Aus 3. folgt

$$\mathbf{P}(\emptyset) = \mathbf{P}(\emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots) = \mathbf{P}(\emptyset) + \mathbf{P}(\emptyset) + \mathbf{P}(\emptyset) + \dots$$

Mit $\mathbf{P}(\emptyset) \in \mathbb{R}$ folgt daraus $\mathbf{P}(\emptyset) = 0$.

Damit folgt unter erneuter Verwendung von 3., dass für $A, B \in \mathcal{A}$ mit $A \cap B = \emptyset$ gilt:

$$\mathbf{P}(A \cup B) = \mathbf{P}(A \cup B \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B) + \mathbf{P}(\emptyset) + \mathbf{P}(\emptyset) + \dots = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B) + 0 + 0 + \dots = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B).$$

Mit $A \cup A^c = \Omega$, $A \cap A^c = \emptyset$ und 2. folgt weiter

$$\mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(A^c) = \mathbf{P}(A \cup A^c) = \mathbf{P}(\Omega) = 1,$$

also gilt für $A \in \mathcal{A}$: $\mathbf{P}(A^c) = 1 - \mathbf{P}(A)$. Letzteres impliziert insbesondere

$$\mathbf{P}(A) = 1 - \mathbf{P}(A^c) \leq 1 - 0 = 1.$$

□

Einige weitere nützliche Eigenschaften von W-Maßen sind zusammengefasst in

Lemma 4.2 Sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ ein W-Raum.

a) Sind $A, B \in \mathcal{A}$ mit $A \subseteq B$, so gilt:

$$\mathbf{P}(A) \leq \mathbf{P}(B) \quad \text{und} \quad \mathbf{P}(B \setminus A) = \mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(A).$$

b) Sind $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ so gilt für jedes $n \in \mathbb{N}$

$$\mathbf{P}(\cup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(A_i)$$

sowie

$$\mathbf{P}(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{P}(A_i)$$

c) Sind $A, B \in \mathcal{A}$, so gilt

$$\mathbf{P}(A \cup B) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(A \cap B).$$

d) Sind $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$, so gilt

$$\begin{aligned} & \mathbf{P}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbf{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mathbf{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) - + \dots \\ & \quad + (-1)^{n-1} \mathbf{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n). \end{aligned}$$

Beweis: a) Aus $A \subseteq B$ folgt $B = (B \setminus A) \cup A$, wobei die beiden Mengen auf der rechten Seite leeren Schnitt haben. Dies impliziert

$$\mathbf{P}(B) = \mathbf{P}((B \setminus A) \cup A) = \mathbf{P}(B \setminus A) + \mathbf{P}(A)$$

bzw. $0 \leq \mathbf{P}(B \setminus A) = \mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(A)$.

b) Für $A, B \in \mathcal{A}$ gilt

$$\mathbf{P}(A \cup B) = \mathbf{P}(A \cup (B \setminus A)) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B \setminus A) \leq \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B),$$

wobei die letzte Ungleichung aus a) folgt. Mit Induktion ergibt sich der erste Teil von b).

Für den zweiten Teil von b) schließt man analog:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) &= \mathbf{P}\left(A_1 \cup \bigcup_{i=2}^{\infty} A_i \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_{i-1})\right) \\ &= \mathbf{P}(A_1) + \sum_{i=2}^{\infty} \mathbf{P}(A_i \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_{i-1})) \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{P}(A_i). \end{aligned}$$

c) folgt aus

$$\begin{aligned} & \mathbf{P}(A \cup B) \\ &= \mathbf{P}((A \setminus (A \cap B)) \cup (B \setminus (A \cap B)) \cup (A \cap B)) \\ &= \mathbf{P}(A \setminus (A \cap B)) + \mathbf{P}(B \setminus (A \cap B)) + \mathbf{P}(A \cap B) \\ &\stackrel{a)}{=} \mathbf{P}(A) - \mathbf{P}(A \cap B) + \mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(B \cap A) + \mathbf{P}(A \cap B) \\ &= \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(A \cap B). \end{aligned}$$

Mit (schreibtechnisch etwas aufwendiger) Induktion folgt d) aus c). □

Lemma 4.3 (Erstes Lemma von Borel und Cantelli).

Sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ ein W-Raum und sei $(A_n)_n$ eine Folge von Ereignissen mit

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}(A_n) < \infty.$$

Dann gilt

$$\mathbf{P}(\cap_{n=1}^{\infty} \cup_{k=n}^{\infty} A_k) = 0.$$

Beweis. Für beliebiges $N \in \mathbb{N}$ gilt

$$\cap_{n=1}^{\infty} \cup_{k=n}^{\infty} A_k \subseteq \cup_{k=N}^{\infty} A_k,$$

woraus folgt

$$\mathbf{P}(\cap_{n=1}^{\infty} \cup_{k=n}^{\infty} A_k) \leq \mathbf{P}(\cup_{k=N}^{\infty} A_k) \leq \sum_{k=N}^{\infty} \mathbf{P}(A_k) \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty),$$

da $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}(A_n) < \infty$. □

4.3 Konstruktion von W-Räumen

4.3.1 Laplacesche W-Räume

Als nächstes betrachten wir Zufallsexperimente, bei denen zum einen nur endlich viele Werte auftreten, und bei denen zum anderen jeder einzelne Wert mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftritt. Solche Zufallsexperimente modelliert man durch die im nächsten Satz beschriebenen Laplaceschen Wahrscheinlichkeitsräume.

Satz 4.1 Sei Ω eine (nichtleere) endliche Menge, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ und $\mathbf{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ definiert durch

$$\mathbf{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \quad (A \in \mathcal{A}).$$

Dann ist $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ ein W-Raum. In diesem gilt

$$\mathbf{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|}$$

für alle $\omega \in \Omega$.

Beweis. Offensichtlich ist Ω eine nichtleere Menge und \mathcal{A} eine σ -Algebra über Ω , also genügt es zu zeigen, dass $\mathbf{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ ein W-Maß ist. Es gilt $\mathbf{P}(A) \geq 0$ für alle $A \subseteq \Omega$ und

$$\mathbf{P}(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = 1.$$

Da darüberhinaus die Anzahl der Elemente einer Vereinigung von nicht überlappenden Mengen gleich der Summe der Anzahlen der Elemente in den einzelnen Mengen ist, ist \mathbf{P} auch σ -additiv. Mit Lemma 4.1 folgt daraus die Behauptung. \square

Definition 4.6 Der W-Raum aus Satz 4.1 heißt **Laplacescher W-Raum**.

Bemerkung. In einem Laplaceschen W-Raum gilt für beliebiges $A \subseteq \Omega$:

$$\mathbf{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{“Anzahl der für } A \text{ günstigen Fälle”}}{\text{“Anzahl der möglichen Fälle”}}.$$

Im Folgenden werden drei (einfache) Beispiele für Laplacesche W-Räume betrachtet.

Beispiel 4.5 Viermaliges Werfen einer “echten” Münze.

Dies läßt sich beschreiben durch einen Laplaceschen W-Raum mit Grundmenge

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_4) \quad : \quad \omega_i \in \{0, 1\} \quad (i = 1, \dots, 4)\}.$$

Hierbei steht $\omega_i = 0$ für “ i -te Münze landet mit Kopf nach oben” und $\omega_i = 1$ für “ i -te Münze landet mit Zahl nach oben”. Da hierbei jeder Wert $(\omega_1, \dots, \omega_4)$ mit der gleichen Wahrscheinlichkeit $1/|\Omega|$ auftritt, verwendet man zur stochastischen Modellierung einen Laplaceschen W-Raum, d.h. man setzt $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ und

$$\mathbf{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{2^4} \quad (A \subseteq \Omega).$$

Sei A das Ereignis, dass mindestens einmal Kopf auftritt. Dann gilt:

$$\mathbf{P}(A) = 1 - \mathbf{P}(A^c) = 1 - \mathbf{P}(\{(1, 1, 1, 1)\}) = 1 - \frac{1}{2^4} = \frac{15}{16}.$$

Beispiel 4.6 In einer Fernsehshow wird folgendes Glücksspiel angeboten: Versteckt hinter drei Türen befinden sich ein Auto und zwei Ziegen. Im ersten Schritt deutet der Spieler (in zufälliger Weise) auf eine der drei Türen, die aber geschlossen bleibt. Dann öffnet der Spielleiter eine der beiden anderen Türen, hinter der sich eine Ziege befindet. Im zweiten Schritt wählt der Spieler eine der beiden noch geschlossenen Türen. Befindet sich dahinter das Auto, so hat er dieses gewonnen.

Im Folgenden soll die Wahrscheinlichkeit für den Spieler, das Auto zu gewinnen, bestimmt werden, wenn er im zweiten Schritt

- a) seine im ersten Schritt getroffene Wahl beibehält,
 b) seine im ersten Schritt getroffene Wahl aufgibt und die andere geschlossene Türe wählt.

Dazu werden die Türen von 1 bis 3 durchnummeriert. Der Einfachheit halber wird davon ausgegangen, dass der Spielleiter die Tür mit dem kleineren Index öffnet, sofern er zwei Möglichkeiten zum Öffnen hat.

Zur Bestimmung der beiden Wahrscheinlichkeiten wird das obige Zufallsexperiment beschrieben durch einen W-Raum mit Grundmenge

$$\Omega = \{(\omega_1, \omega_2) : \omega_1, \omega_2 \in \{1, 2, 3\}\}.$$

Hierbei ist ω_1 die Nummer der Tür, hinter der sich das Auto befindet, und ω_2 die Nummer der Tür, auf die der Spieler tippt. Da jeder Wert (ω_1, ω_2) mit der gleichen Wahrscheinlichkeit $1/|\Omega|$ auftritt, wird zur stochastischen Modellierung wieder ein Laplacescher W-Raum verwendet, d.h. es wird gesetzt

$$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$$

und

$$\mathbf{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{9} \quad \text{für } A \in \mathcal{A}.$$

Seien nun A bzw. B die Ereignisse, dass der Spieler bei Strategie a) bzw. b) das Auto gewinnt. Zur Bestimmung von $|A|$ bzw. $|B|$ betrachtet man alle 9 Elemente von Ω und bestimmt jeweils, ob der Spieler das Auto bei Strategie a) bzw. b) gewinnt oder nicht:

ω_1	ω_2	Spielleiter öffnet	Spieler tippt bei a) auf	Gewinn bei a)	Spieler tippt bei b) auf	Gewinn bei b)
1	1	2	1	Ja	3	Nein
1	2	3	2	Nein	1	Ja
1	3	2	3	Nein	1	Ja
2	1	3	1	Nein	2	Ja
2	2	1	2	Ja	3	Nein
2	3	1	3	Nein	2	Ja
3	1	2	1	Nein	3	Ja
3	2	1	2	Nein	3	Ja
3	3	1	3	Ja	2	Nein

Aus der Tabelle liest man ab:

$$A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\} \text{ und } B = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$$

und damit erhält man

$$\mathbf{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \text{ und } \mathbf{P}(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

Beispiel 4.7 *In einer Stadt mit m Längs- und n Querstraßen sollen k Verkehrspolizisten ($k \leq \min\{m, n\}$) auf die $m \cdot n$ Straßenkreuzungen aufgeteilt werden. Aufgrund des Ausbildungsstandes der Polizisten ist klar, dass eine Kreuzung von höchstens einem Polizisten gesichert wird. Wie groß ist bei rein zufälliger Verteilung der Polizisten auf die Kreuzungen die Wahrscheinlichkeit, dass auf jeder Straße höchstens ein Polizist steht ?*

1. Lösung: Reihenfolge bei der Auswahl der Kreuzungen wird beachtet.

Anzahl möglicher Fälle:

$$(m \cdot n) \cdot (m \cdot n - 1) \cdot \dots \cdot (m \cdot n - k + 1)$$

(Aus $m \cdot n$ Kreuzungen k auswählen ohne Zurücklegen und mit Beachten der Reihenfolge.)

Anzahl günstiger Fälle:

$$m \cdot n \cdot (m - 1) \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot (m - k + 1) \cdot (n - k + 1)$$

(Zweite Kreuzung darf nicht in der gleichen Längs- oder Querstraße liegen wie 1. Kreuzung, etc.)

Damit ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit gleich

$$\frac{m \cdot n \cdot (m - 1) \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot (m - k + 1) \cdot (n - k + 1)}{(m \cdot n) \cdot (m \cdot n - 1) \cdot \dots \cdot (m \cdot n - k + 1)} = \frac{\binom{m}{k} \cdot \binom{n}{k} \cdot k!}{\binom{m \cdot n}{k}}.$$

2. Lösung: Reihenfolge bei der Auswahl der Kreuzungen wird nicht beachtet.

Anzahl möglicher Fälle:

$$\binom{m \cdot n}{k}$$

(Aus $m \cdot n$ Kreuzungen k auswählen ohne Zurücklegen und ohne Beachten der Reihenfolge.)

Anzahl günstiger Fälle:

$$\binom{m}{k} \cdot n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1).$$

(Zuerst aus m Längsstraßen k ohne Zurücklegen und ohne Beachtung der Reihenfolge auswählen. Dann noch aus n Querstraßen k ohne Zurücklegen und *mit* (!) Beachtung der Reihenfolge auswählen.)

Damit ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit gleich

$$\frac{\binom{m}{k} \cdot n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{\binom{m \cdot n}{k}} = \frac{\binom{m}{k} \cdot \binom{n}{k} \cdot k!}{\binom{m \cdot n}{k}}.$$

4.3.2 W-Räume mit Zähldichten

Zur Motivierung dient das folgende

Beispiel 4.8 *Mit einem (echten) Würfel wird so lange gewürfelt, bis zum ersten Mal eine 6 erscheint.*

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zufällige Anzahl der Würfe bis (einschließlich) zum ersten Wurf mit 6 oben eine gerade Zahl ist ?

Wir wählen

$$\Omega = \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\},$$

wobei $\omega = k$ bedeutet, dass beim k -ten Wurf der Würfel zum ersten Mal mit 6 oben landet. Gefragt ist dann nach der Wahrscheinlichkeit $\mathbf{P}(A)$, wobei

$$A = \{2, 4, 6, 8, \dots\}.$$

Zur Festlegung der Wahrscheinlichkeit einer Menge legen wir zuerst die Wahrscheinlichkeiten aller Einpunktmengen fest und setzen dann

$$\mathbf{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbf{P}(\{\omega\}) \stackrel{\text{hier}}{=} \sum_{k \in \{2, 4, 6, 8, \dots\}} \mathbf{P}(\{k\}).$$

Um festzustellen, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Würfel beim k -ten Wurf zum ersten Mal mit 6 oben landet, beschreiben wir die ersten k Würfe durch einen Laplaceschen W-Raum mit Grundmenge

$$\{(\omega_1, \dots, \omega_k) : \omega_i \in \{1, \dots, 6\}\}.$$

Diese besteht aus insgesamt 6^k Elementen, davon sind $5^{k-1} \cdot 1$ günstig, so dass folgt

$$\mathbf{P}(\{k\}) = \frac{5^{k-1}}{6^k} = \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1}.$$

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist dann

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(A) &= \sum_{k \in \{2,4,6,8,\dots\}} \mathbf{P}(\{k\}) \\ &= \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^1 + \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^3 + \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^5 + \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^7 + \dots \\ &= \frac{5}{36} \cdot \left(\left(\frac{5}{6}\right)^0 + \left(\frac{5}{6}\right)^2 + \left(\frac{5}{6}\right)^4 + \left(\frac{5}{6}\right)^6 + \dots \right) \\ &= \frac{5}{36} \cdot \left(\left(\frac{25}{36}\right)^0 + \left(\frac{25}{36}\right)^1 + \left(\frac{25}{36}\right)^2 + \left(\frac{25}{36}\right)^3 + \dots \right) \\ &= \frac{5}{36} \cdot \frac{1}{1 - \frac{25}{36}} \\ &\approx 0.455 \end{aligned}$$

Als nächstes betrachten wir eine allgemeine Definitionsmöglichkeit für W-Räume mit endlicher oder abzählbar unendlicher Grundmenge Ω . Hierbei wird sinnvollerweise $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ gewählt. Jede beliebige Menge $A \subseteq \Omega$ lässt sich als endliche oder abzählbar unendliche Vereinigung von Einpunktmengen schreiben:

$$A = \bigcup_{\omega \in A} \{\omega\}.$$

Ist $\mathbf{P} : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ ein W-Maß, so folgt daraus aufgrund der σ -Additivität:

$$\mathbf{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbf{P}(\{\omega\}),$$

d.h., $\mathbf{P} : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ ist bereits durch die Werte $\mathbf{P}(\{\omega\})$ ($\omega \in \Omega$) festgelegt. Wir zeigen in dem folgenden Satz 4.2, dass die obige Beziehung auch zur Definition von W-Maßen ausgehend von den Werten $\mathbf{P}(\{\omega\})$ ($\omega \in \Omega$) verwendet werden kann.

Satz 4.2 Sei $\Omega = \{x_1, x_2, \dots\}$ eine abzählbar unendliche Menge und $(p_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge reeller Zahlen mit

$$0 \leq p_k \leq 1 \quad (k \in \mathbb{N}) \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1.$$

Dann wird durch $\mathcal{A} := \mathcal{P}(\Omega)$ und

$$\mathbf{P}(A) := \sum_{k: x_k \in A} p_k \quad (A \subseteq \Omega)$$

ein W-Raum definiert. Hierbei gilt

$$\mathbf{P}(\{x_k\}) = p_k \quad (k \in \mathbb{N}),$$

d.h. p_k gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass x_k das Ergebnis des Zufallsexperiments ist.

Beweis: Offensichtlich ist Ω eine nichtleere Menge und \mathcal{A} eine σ -Algebra über Ω , also genügt es zu zeigen, dass $\mathbf{P} : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ ein W-Maß ist. Dazu beachtet man zuerst, dass für $|A| = \infty$ die Reihe

$$\sum_{k: x_k \in A} p_k$$

wohldefiniert ist, da die Reihenfolge der Summation bei Reihen mit nichtnegativen Summanden keine Rolle spielt. Dann bleibt noch zu zeigen:

(i) $\mathbf{P}(A) \geq 0$ für alle $A \subseteq \Omega$.

(ii) $\mathbf{P}(\Omega) = 1$.

(iii) \mathbf{P} ist σ -additiv.

Unter Beachtung von $p_k \geq 0$ und $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$ folgen (i) und (ii) unmittelbar aus der Definition von \mathbf{P} .

Zum Nachweis von (iii) betrachten wir Mengen $A_1, A_2, \dots \subseteq \Omega$ mit $A_i \cap A_j = \emptyset$ für alle $i \neq j$. Zu zeigen ist

$$\mathbf{P}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbf{P}(A_j).$$

Mit der Definition von \mathbf{P} folgt

$$\text{linke Seite} = \sum_{k: x_k \in \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j} p_k$$

und

$$\text{rechte Seite} = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k: x_k \in A_j} p_k.$$

Bei beiden Summen summiert man alle p_k auf, für die x_k in einer der Mengen A_j ist. Unterscheiden tun sich die beiden Summen nur hinsichtlich der Reihenfolge, in der die p_k 's aufsummiert werden. Da aber (wie oben bereits erwähnt) bei endlichen oder abzählbar unendlichen Summen mit nichtnegativen Summanden die Reihenfolge der Summation keine Rolle spielt, stimmen beide Werte überein. \square

Gemäß obigem Satz kann also ein W-Raum bereits durch Vorgabe einer Folge von nichtnegativen Zahlen, die zu Eins summieren, eindeutig bestimmt werden. Aus dem Beweis des Satzes ist unmittelbar klar, dass er analog auch für endliche Grundmengen $\Omega = \{x_1, \dots, x_N\}$ und $0 \leq p_k$ ($k = 1, \dots, N$) mit $\sum_{k=1}^N p_k = 1$ gilt.

Definition 4.7 Die Folge $(p_k)_{k \in \mathbb{N}}$ (bzw. $(p_k)_{k=1, \dots, N}$ im Falle einer N -elementigen Grundmenge) heißt **Zähldichte** des W-Maßes \mathbf{P} in Satz 4.2.

Zur Illustration betrachten wir das folgende

Beispiel 4.9 Sonntagsfrage

Bei einer telefonischen Umfrage (mit rein zufällig gewählten Telefonnummern) werden n Personen gefragt, welche Partei sie wählen würden, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Es sei $p \in [0, 1]$ der prozentuale Anteil desjenigen Teils der gesamten Bevölkerung, der SPD wählen würde. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass genau k der Befragten ($k \in \{0, \dots, n\}$ fest) SPD wählen würden ?

Wir betrachten zunächst den Spezialfall $n = k = 1$. Sei N die Anzahl aller Wahlberechtigten. Dann sind davon $N \cdot p$ SPD Wähler, und die Wahrscheinlichkeit, bei rein zufälligem Herausgreifen einer Person aus den N Personen einen der $N \cdot p$ SPD Wähler zu erhalten ist

$$\frac{\text{Anzahl günstiger Fälle}}{\text{Anzahl möglicher Fälle}} = \frac{N \cdot p}{N} = p.$$

Analog ist die Wahrscheinlichkeit, bei rein zufälligem Herausgreifen einer Person aus den N Personen keinen der $N \cdot p$ SPD Wähler zu erhalten, gegeben durch

$$\frac{N - N \cdot p}{N} = 1 - p.$$

Nun betrachten wir den allgemeinen Fall. Zwecks Vereinfachung der Rechnung gehen wir davon aus, dass sich der prozentuale Anteil der SPD Wähler nach

Herausgreifen eines Wählers nicht (bzw. nur unwesentlich) verändert. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau die ersten k Befragten SPD Wähler sind und die restlichen $n - k$ nicht, gegeben durch

$$\frac{(N \cdot p)^k (N \cdot (1 - p))^{n-k}}{N^n} = p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Das gleiche Resultat erhält man auch, wenn man beliebige Positionen für die k SPD Wähler unter den n Wählern vorgibt und danach fragt, mit welcher Wahrscheinlichkeit man auf genau so eine Sequenz von Wählern trifft. Da es für die Wahl der k Positionen der SPD Wähler unter den n Positionen genau $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten gibt, erhält man für die Wahrscheinlichkeit, dass unter den n Befragten genau k SPD Wähler sind:

$$\mathbf{P}(\{k\}) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}.$$

Das dadurch festgelegte W-Maß heißt Binomialverteilung.

Definition 4.8 Das gemäß Satz 4.2 durch $\Omega = \mathbb{N}_0$ und die Zähldichte $(b(n, p, k))_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit

$$b(n, p, k) := \begin{cases} \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k} & \text{für } 0 \leq k \leq n, \\ 0 & \text{für } k > n \end{cases}$$

festgelegte W-Maß heißt **Binomialverteilung** mit Parametern $n \in \mathbb{N}$ und $p \in [0, 1]$.

Gemäß dem binomischen Lehrsatz gilt

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot a^k \cdot b^{n-k}.$$

Wendet man diese Formel mit $a = p$ und $b = 1 - p$ an, so erhält man

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k} = (p + (1 - p))^n = 1,$$

d.h. es handelt es sich hierbei in der Tat um eine Zähldichte.

Beispiel 4.10 Bei der Umfrage im Beispiel 4.9 interessiert man sich nun für die Wahrscheinlichkeit, dass der relative Anteil k/n der SPD Wähler unter den Befragten um nicht mehr als 1% vom Wert p in der gesamten Bevölkerung abweicht. Wegen

$$\left| \frac{k}{n} - p \right| \leq 0.01 \Leftrightarrow n \cdot p - 0.01 \cdot n \leq k \leq n \cdot p + 0.01 \cdot n$$

erhält man dafür

$$\begin{aligned} & \mathbf{P}(\{k \in \mathbb{N}_0 : n \cdot p - 0.01 \cdot n \leq k \leq n \cdot p + 0.01 \cdot n\}) \\ &= \sum_{n \cdot p - 0.01 \cdot n \leq k \leq n \cdot p + 0.01 \cdot n} \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}. \end{aligned}$$

Beispiel 4.11 In einer großen Teigmenge seien $n = 1000$ Rosinen rein zufällig verteilt. Ein Bäcker formt daraus $m = 100$ gleichgroße Brötchen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig herausgegriffenes Brötchen weniger als 8 Rosinen enthält ?

Wir wählen

$$\Omega = \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\},$$

wobei $\omega = k$ bedeutet, dass das Brötchen genau k Rosinen enthält. Gefragt ist dann nach der Wahrscheinlichkeit $\mathbf{P}(A)$, wobei

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}.$$

Zur Festlegung der Wahrscheinlichkeit einer Menge legen wir wieder die Wahrscheinlichkeiten aller Einpunktmengen fest und setzen dann

$$\mathbf{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbf{P}(\{\omega\}) \stackrel{\text{hier}}{=} \sum_{k=0}^7 \mathbf{P}(\{k\}).$$

Dazu bestimmen wir zuerst für festes $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ die Wahrscheinlichkeit, dass das Brötchen genau k Rosinen enthält. Wir denken uns die Rosinen von 1 bis n und die Brötchen von 1 bis m durchnummeriert. Das zufällig herausgegriffene Brötchen sei das Brötchen mit Nummer 1. Jede der Rosinen landet in einem der m Brötchen. Die Zuordnung der Rosinen zu den Brötchen kann daher durch ein n -Tupel mit Einträgen in $\{1, \dots, m\}$ beschrieben werden, wobei die i -te Komponente die Nummer des Brötchens angibt, in das die i -te Rosine kommt. Dabei gibt es m^n Möglichkeiten, von denen jede mit der gleichen Wahrscheinlichkeit $1/m^n$ auftritt. Damit genau k Rosinen in dem Brötchen mit Nummer 1 landen, müssen in dem n -Tupel genau k Komponenten gleich 1 sein, und alle anderen müssen ungleich 1 sein. Für die Wahl der Positionen dieser k Komponenten mit Eintrag 1 gibt es $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten. Damit gibt es insgesamt

$$\binom{n}{k} 1^k (m-1)^{n-k}$$

n -Tupel, bei denen genau k Komponenten 1 sind, und die Wahrscheinlichkeit, dass das Brötchen genau k Rosinen enthält, berechnet sich zu

$$\mathbf{P}(\{k\}) = \frac{\binom{n}{k} 1^k (m-1)^{n-k}}{m^n} = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{m}\right)^k \left(\frac{m-1}{m}\right)^{n-k} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

mit $p = 1/m = 0.01$.

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist dann

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}) &= \sum_{k=0}^7 \mathbf{P}(\{k\}) \\ &= \sum_{k=0}^7 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^7 \binom{1000}{k} 0.01^k 0.99^{1000-k}. \end{aligned}$$

Zur konkreten Berechnung der obigen Summe erweist sich die folgende Approximation als nützlich:

Lemma 4.4 *Seien $\lambda \in \mathbb{R}_+$ und $p_n \in [0, 1]$ ($n \in \mathbb{N}$) derart, dass $n \cdot p_n \rightarrow \lambda$ ($n \rightarrow \infty$). Dann gilt für jedes feste $k \in \mathbb{N}_0$:*

$$b(n, p_n, k) = \binom{n}{k} \cdot p_n^k \cdot (1-p_n)^{n-k} \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} \quad (n \rightarrow \infty).$$

Beweis: Wegen $n \cdot p_n \rightarrow \lambda$ gilt insbesondere $p_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Damit erhält man

$$\begin{aligned} b(n, p_n, k) &= \frac{1}{k!} n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \cdot p_n^k \cdot (1-p_n)^{n-k} \\ &= \frac{1}{k!} \cdot np_n \cdot (np_n - p_n) \cdot \dots \cdot (np_n - (k-1)p_n) \cdot (1-p_n)^{-k} \cdot \left((1-p_n)^{\frac{1}{p_n}}\right)^{n \cdot p_n}. \end{aligned}$$

Mit

$$n \cdot p_n \rightarrow \lambda, (n \cdot p_n - p_n) \rightarrow \lambda, \dots, (n \cdot p_n - (k-1) \cdot p_n) \rightarrow \lambda \quad (n \rightarrow \infty),$$

$$(1-p_n)^{-k} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

und

$$(1-p_n)^{\frac{1}{p_n}} \rightarrow e^{-1} \quad (n \rightarrow \infty)$$

folgt

$$b(n, p_n, k) \rightarrow \frac{1}{k!} \cdot \lambda^k \cdot 1 \cdot (e^{-1})^\lambda \quad (n \rightarrow \infty).$$

□

Mit Hilfe von Lemma 4.4 lässt sich motivieren, die Wahrscheinlichkeit in Beispiel 4.11 approximativ folgendermaßen zu berechnen:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}) &= \sum_{k=0}^7 \binom{1000}{k} 0.01^k 0.99^{1000-k} \\ &\approx \sum_{k=0}^7 \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} \quad \text{mit } \lambda = 1000 \cdot 0.01 = 10 \\ &= \sum_{k=0}^7 \frac{10^k}{k!} \cdot e^{-10} \\ &\approx 0.22 \end{aligned}$$

Definition 4.9 Das gemäß Satz 4.2 durch $\Omega = \mathbb{N}_0$ und die Zähldichte $(\pi(\lambda, k))_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit

$$\pi(\lambda, k) := \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} \quad (k \in \mathbb{N}_0)$$

festgelegte W-Maß heißt **Poisson-Verteilung** mit Parameter $\lambda \in \mathbb{R}_+$.

Wegen

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{+\lambda} = 1$$

handelt es sich hierbei in der Tat um eine Zähldichte.

Eine weitere Approximation der Binomialverteilung wird am Ende dieses Kapitels vorgestellt.

4.3.3 W-Räume mit Dichten

Zur Motivation betrachten wir

Beispiel 4.12 Eine Zahl wird rein zufällig aus dem Intervall $[0, 1]$ ausgewählt.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl zwischen $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{2}$ liegt ?

Wir wählen

$$\Omega = \mathbb{R},$$

wobei $\omega \in \Omega$ die rein zufällig aus $[0, 1]$ gezogene Zahl ist (hierbei treten Zahlen außerhalb von $[0, 1]$ nur mit Wahrscheinlichkeit Null auf). Gefragt ist dann nach der Wahrscheinlichkeit $\mathbf{P}(A)$, wobei

$$A = \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right].$$

Diesmal ist die Definition

$$\mathbf{P}(A) := \sum_{\omega \in A} \mathbf{P}(\{\omega\})$$

nicht sinnvoll, da hier gilt:

$$\mathbf{P}(\{\omega\}) = 0 \text{ für alle } \omega \in \Omega.$$

Eine naheliegende Idee ist jedoch, die Summe oben durch ein Integral anzunähern, d.h. zu setzen

$$\mathbf{P}(A) := \int_A f(x) dx,$$

mit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Damit die obigen Wahrscheinlichkeiten nichtnegativ sind, fordern wir

$$f(x) \geq 0 \text{ für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Da $\mathbf{P}(\mathbb{R})$ darüberhinaus Eins sein soll, fordern wir auch

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1.$$

Berücksichtigt man, dass Zahlen außerhalb von $[0, 1]$ nur mit Wahrscheinlichkeit Null auftreten sollen, sowie jede Zahl aus $[0, 1]$ mit der "gleichen Wahrscheinlichkeit" auftreten soll, so ist es naheliegend, im obigen Beispiel zu wählen:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{für } x < 0 \text{ oder } x > 1. \end{cases}$$

Damit erhält man für die gesuchte Wahrscheinlichkeit:

$$\mathbf{P}\left(\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]\right) = \int_{\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]} f(x) dx = \int_{1/3}^{1/2} 1 dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Im Folgenden wird eine allgemeine Definitionsmöglichkeit für W -Räume mit Grundmenge $\Omega = \mathbb{R}$ vorgestellt. Hierbei ist zwar $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ eine σ -Algebra über Ω , diese ist für die Festlegung von Wahrscheinlichkeiten aber meist zu groß (z.B. kann die Existenz der im unten stehenden Satz verwendeten Integrale nicht für alle Mengen $A \subseteq \mathbb{R}$ nachgewiesen werden). Daher wählen wir als σ -Algebra die Borelsche σ -Algebra \mathcal{B} .

Wie in Beispiel 4.12 ist die Festlegung eines W -Maßes durch

$$\mathbf{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbf{P}(\{\omega\})$$

nicht möglich, da hier meist $\mathbf{P}(\{\omega\}) = 0$ für alle $\omega \in \Omega$ gilt. Eine naheliegende Idee ist jedoch, die Summe oben durch ein Integral anzunähern.

Satz 4.3 Ist $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, für die gilt

$$f(x) \geq 0 \text{ für alle } x \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1$$

(insbesondere sei hier die Existenz des Integrals vorausgesetzt), so wird durch $\Omega := \mathbb{R}$, $\mathcal{A} := \mathcal{B}$ und

$$\mathbf{P}(A) = \int_A f(x) dx \quad (A \in \mathcal{B})$$

ein W -Raum definiert.

Beweis: Wieder genügt es zu zeigen, dass \mathbf{P} ein W -Maß ist. Wegen $f(x) \geq 0$ für alle x gilt $\mathbf{P}(A) \geq 0$ ($A \in \mathcal{A}$). Weiter ist

$$\mathbf{P}(\mathbb{R}) = \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1.$$

Bei geeigneter Definition der auftretenden Integrale kann man auch zeigen, dass \mathbf{P} σ -additiv ist. Mit Lemma 4.1 folgt die Behauptung. \square

Definition 4.10 f heißt **Dichte** (bzgl. des LB -Maßes) von dem in Satz 4.3 definierten W -Maß \mathbf{P} .

Bemerkung: Ist $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ der W -Raum aus Satz 4.3 und sind $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$, so gilt für die Wahrscheinlichkeit, dass beim zugrundeliegenden Zufallsexperiment ein Wert zwischen a und b auftritt:

$$\mathbf{P}((a, b)) = \int_{(a, b)} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Das folgende W -Maß haben wir bereits in Beispiel 4.12 kennengelernt.

Definition 4.11 Die Gleichverteilung $U(a, b)$ mit Parametern $-\infty < a < b < \infty$ ist das durch die Dichte

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{für } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{für } x < a \text{ oder } x > b \end{cases}$$

gemäß Satz 4.3 festgelegte W -Maß.

Wegen

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b 1 dx = 1$$

sind hierbei die Voraussetzungen von Satz 4.3 erfüllt.

Ein weiteres W -Maß mit Dichte führen wir ein in

Beispiel 4.13 Die Lebensdauer einer Glühbirne betrage im Schnitt 24 Monate. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Glühbirne bereits innerhalb von drei Monaten ausfällt ?

Wir wählen

$$\Omega = \mathbb{R}_+,$$

wobei ω die Lebensdauer der Glühbirne in Monaten ist. Gefragt ist dann nach der Wahrscheinlichkeit $\mathbf{P}(A)$, wobei

$$A = [0, 3].$$

Diese Wahrscheinlichkeit lässt sich ohne Zusatzvoraussetzungen an den zugrunde liegenden Zufallsmechanismus nicht berechnen.

Lebensdauern modelliert man häufig mit der sogenannten Exponentialverteilung:

Definition 4.12 Die Exponentialverteilung $\exp(\lambda)$ mit Parameter $\lambda > 0$ ist das durch die Dichte

$$f(x) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} & \text{für } x \geq 0, \\ 0 & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

gemäß Satz 4.3 festgelegte W -Maß.

Wegen

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \int_0^{\infty} \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} dx = -e^{-\lambda \cdot x} \Big|_{x=0}^{\infty} = 1$$

sind hierbei die Voraussetzungen von Satz 4.3 erfüllt.

Bei der Exponentialverteilung ist $1/\lambda$ die "mittlere Lebensdauer" (wird später noch bewiesen). Daher gehen wir im Beispiel 4.13 davon aus, dass gilt

$$\mathbf{P}(A) := \int_A f(x) dx$$

mit

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{24} \cdot e^{-x/24} & \text{für } x \geq 0, \\ 0 & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

und berechnen die gesuchte Wahrscheinlichkeit zu

$$\begin{aligned} \mathbf{P}([0, 3]) &= \int_0^3 \frac{1}{24} \cdot e^{-x/24} dx \\ &= -e^{-x/24} \Big|_{x=0}^3 \\ &= -e^{-3/24} + e^0 \\ &\approx 0.118 \end{aligned}$$

Ein weiteres Beispiel für ein W-Maß mit Dichte ist gegeben in

Definition 4.13 Die Normalverteilung $N(a, \sigma^2)$ mit Parametern $a \in \mathbb{R}, \sigma > 0$ ist das durch die Dichte

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} \quad (x \in \mathbb{R})$$

gemäß Satz 4.3 festgelegte W-Maß.

Wegen

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du = 1$$

sind hierbei wieder die Voraussetzungen von Satz 4.3 erfüllt.

4.3.4 Verallgemeinerung der Begriffe Dichte und Zähldichte

Die Begriffe Dichte und Zähldichte lassen sich verallgemeinern. Dazu dient die folgende Definition:

Definition 4.14 Ω Grundmenge, \mathcal{A} σ -Algebra. Eine Abbildung

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow \bar{\mathbb{R}}_+$$

(mit $\bar{\mathbb{R}}_+ = \mathbb{R}_+ \cup \{\infty\}$) heißt **Maß**, wenn gilt:

(i) $\mu(\emptyset) = 0$,

(ii) $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$ für alle $A, B \in \mathcal{A}$ mit $A \cap B = \emptyset$.

(iii)

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

für alle $A_n \in \mathcal{A}$ ($n \in \mathbb{N}$) mit $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $i \neq j$.

In diesem Fall heißt $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ **Maßraum**.

Unmittelbar aus obiger Definition folgt, dass μ genau dann ein W-Maß ist, wenn μ ein Maß ist und $\mu(\Omega) = 1$ gilt.

Beispiele für Maße:

a) $\Omega = \mathbb{N}_0$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ und

$$\mu(A) = |A| \quad (A \subseteq \mathbb{N}_0).$$

μ heißt **abzählendes Maß**.

b) $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \mathcal{B}$ und

$$\mu : \mathcal{B} \rightarrow \bar{\mathbb{R}}_+$$

dasjenige Maß mit

$$\mu((a, b]) = b - a$$

für alle $-\infty < a \leq b < \infty$.

μ heißt **Lebesgue-Borel-Maß** (kurz: LB-Maß).

Sei nun $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum. Dann kann man durch Vorgabe einer Funktion

$$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+ \text{ mit } \int_{\Omega} f(x) \mu(dx) = 1$$

ein W-Maß $\mathbf{P} : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}_+$ definieren durch

$$\mathbf{P}(A) := \int_A f(x) \mu(dx) \quad (A \in \mathcal{A}). \quad (4.1)$$

Hierbei wird der in Abschnitt 4.6 definierte Integralbegriff verwendet.

Man sagt dann, dass f Dichte von \mathbf{P} bzgl. μ ist.

Man kann nun zeigen: Ist μ das abzählende Maß, so erhält man mittels (4.1) W-Maße mit Zähldichten. Ist dagegen μ das LB-Maß, so besitzt das durch (4.1) definierte Maß eine Dichte bezüglich dem LB-Maß.

4.4 Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit

Im Folgenden untersuchen wir, wie sich das wahrscheinlichkeitstheoretische Verhalten eines Zufallsexperiments ändert, falls Zusatzinformation über den Ausgang bekannt wird. Zur Motivierung betrachten wir

Beispiel 4.14 *Beim sogenannten Down-Syndrom (Mongolismus) ist das Chromosom 21 dreifach – statt wie sonst zweifach – vorhanden, was zu meist schwerer geistiger Behinderung führt. Im Rahmen einer Fruchtwasseruntersuchung kann festgestellt werden, ob ein ungeborenes Kind diesen Defekt hat oder nicht. Dazu wird unter Ultraschallsicht durch die Bauchdecke der Schwangeren etwas Fruchtwasser abgenommen. Dieses enthält kindliche Zellen, die im Labor vermehrt und auf Fehler beim Chromosomensatz des Kindes hin untersucht werden können. Nachteil dieser Untersuchung ist allerdings, dass es in ca. 0.5% der Fälle zu Komplikationen wie Fehlgeburt und Missbildungen beim Kind kommen kann.*

Eine deutlich weniger aufwendige Untersuchung ist der sogenannte Triple Test, bei dem im Rahmen einer Blutuntersuchung in der 15. Schwangerschaftswoche drei Laborwerte des Blutes der Mutter bestimmt werden. Sind zwei dieser Werte erhöht, der dritte hingegen nicht, so sagt man, dass der Triple Test positiv ausfällt.

Im Folgenden soll die Frage untersucht werden, wie sich die Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit Down-Syndrom zu bekommen, ändert, falls der Triple Test positiv ausfällt.

Zur Beantwortung obiger Frage wird zuerst einmal die bedingte Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A unter einer Bedingung B definiert. Zur Motivation der Definition betrachten wir die n -malige Durchführung eines Zufallsexperiments. n_A bzw. n_B bzw. $n_{A \cap B}$ seien die Anzahlen des Eintretens des Ereignisses A bzw. B bzw. $A \cap B$. Eine naheliegende Approximation der bedingten Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B ist dann die relative Häufigkeit des Auftretens von A unter den Ausgängen des Zufallsexperimentes, bei denen auch B eingetreten

ist, d.h.,

$$\frac{n_{A \cap B}}{n_B} = \frac{\frac{n_{A \cap B}}{n}}{\frac{n_B}{n}}.$$

Dies motiviert

Definition 4.15 Sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ ein W-Raum und seien $A, B \in \mathcal{A}$ mit $\mathbf{P}(B) > 0$. Dann heißt

$$\mathbf{P}(A|B) = \frac{\mathbf{P}(A \cap B)}{\mathbf{P}(B)}$$

bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B .

Lemma 4.5 Sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ ein W-Raum und $B \in \mathcal{A}$ mit $\mathbf{P}(B) > 0$. Dann wird durch

$$\tilde{\mathbf{P}}(A) = \mathbf{P}(A|B) \quad (A \in \mathcal{A})$$

ein W-Raum $(\Omega, \mathcal{A}, \tilde{\mathbf{P}})$ definiert. In diesem gilt:

$$\tilde{\mathbf{P}}(B) = \mathbf{P}(B|B) = \frac{\mathbf{P}(B \cap B)}{\mathbf{P}(B)} = 1.$$

(Sprechweise: "Das W-Maß $\tilde{\mathbf{P}}$ ist auf B konzentriert").

Beweis. Offensichtlich gilt $\tilde{\mathbf{P}}(A) \geq 0$ für alle $A \in \mathcal{A}$ und

$$\tilde{\mathbf{P}}(\Omega) = \mathbf{P}(\Omega \cap B) / \mathbf{P}(B) = 1.$$

Sind darüberhinaus $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ mit $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $i \neq j$, so folgt aus \mathbf{P} W-Maß:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{P}}(\cup_{n=1}^{\infty} A_n) &= \mathbf{P}(\cup_{n=1}^{\infty} A_n | B) \\ &= \frac{\mathbf{P}((\cup_{n=1}^{\infty} A_n) \cap B)}{\mathbf{P}(B)} \\ &= \frac{\mathbf{P}(\cup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B))}{\mathbf{P}(B)} \\ &= \frac{\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}(A_n \cap B)}{\mathbf{P}(B)} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbf{P}(A_n \cap B)}{\mathbf{P}(B)} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{\mathbf{P}}(A_n). \end{aligned}$$

Mit Lemma 4.1 folgt die Behauptung. □

Aus obigem Lemma folgt, dass für

$$A \mapsto \mathbf{P}(A|B)$$

die üblichen Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten gelten, z.B. ist

$$\mathbf{P}(A^c|B) = 1 - \mathbf{P}(A|B)$$

und

$$\mathbf{P}(A_1 \cup A_2|B) = \mathbf{P}(A_1|B) + \mathbf{P}(A_2|B) \quad \text{falls } A_1 \cap A_2 = \emptyset.$$

Im Beispiel 4.14 interessieren wir uns für die bedingte Wahrscheinlichkeit

$$\mathbf{P}(A|B),$$

wobei

- $A =$ "Kind mit Down-Syndrom",
- $B =$ "Triple Test positiv".

Bekannt sind die folgenden Näherungswerte:

- $\mathbf{P}(A) = 0.0014$ (ohne Berücksichtigung des Alters der Mutter)
- $\mathbf{P}(B|A) = 0.65$
- $\mathbf{P}(B|A^c) = 0.075$

Der folgende Satz zeigt, wie man daraus $\mathbf{P}(A|B)$ berechnen kann.

Satz 4.4 Sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ ein W -Raum und seien $B_1, \dots, B_N \in \mathcal{A}$ mit

$$\Omega = \cup_{n=1}^N B_n,$$

$$B_i \cap B_j = \emptyset \quad \text{für alle } i \neq j$$

und

$$\mathbf{P}(B_n) > 0 \quad (n = 1, \dots, N).$$

Dann gilt:

a)

$$\mathbf{P}(A) = \sum_{n=1}^N \mathbf{P}(A|B_n) \cdot \mathbf{P}(B_n) \quad \text{für alle } A \in \mathcal{A}.$$

(Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit)

b)

$$\mathbf{P}(B_k|A) = \frac{\mathbf{P}(A|B_k) \cdot \mathbf{P}(B_k)}{\sum_{n=1}^N \mathbf{P}(A|B_n) \cdot \mathbf{P}(B_n)}$$

für alle $k \in \{1, \dots, N\}$ und alle $A \in \mathcal{A}$ mit $\mathbf{P}(A) > 0$.

(Formel von Bayes, 1793)

Beweis: a) Es gilt

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{n=1}^N B_n \right) = \bigcup_{n=1}^N A \cap B_n,$$

wobei die letzte Vereinigung eine endliche Vereinigung von Mengen mit paarweise leerem Schnitt ist. Mit \mathbf{P} W-Maß folgt:

$$\mathbf{P}(A) = \sum_{n=1}^N \mathbf{P}(A \cap B_n) = \sum_{n=1}^N \frac{\mathbf{P}(A \cap B_n)}{\mathbf{P}(B_n)} \cdot \mathbf{P}(B_n) = \sum_{n=1}^N \mathbf{P}(A|B_n) \cdot \mathbf{P}(B_n).$$

b) Nach Definition der bedingten Wk. gilt:

$$\mathbf{P}(B_k|A) = \frac{\mathbf{P}(B_k \cap A)}{\mathbf{P}(A)} = \frac{\frac{\mathbf{P}(B_k \cap A)}{\mathbf{P}(B_k)} \cdot \mathbf{P}(B_k)}{\mathbf{P}(A)} = \frac{\mathbf{P}(A|B_k) \cdot \mathbf{P}(B_k)}{\mathbf{P}(A)}.$$

Mit a) folgt die Behauptung. □

Mit Satz 4.4 erhält man im Beispiel 4.14

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(A|B) &= \frac{\mathbf{P}(B|A) \cdot \mathbf{P}(A)}{\mathbf{P}(B|A) \cdot \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B|A^c) \cdot \mathbf{P}(A^c)} \\ &= \frac{0.65 \cdot 0.0014}{0.65 \cdot 0.0014 + 0.075 \cdot 0.9986} \\ &\approx 0.012, \end{aligned}$$

d.h. selbst wenn der Triple Test positiv ausfällt, so beträgt die Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit Down-Syndrom zu bekommen, gerade mal 1.2% (oder

anders ausgedrückt, mit Wahrscheinlichkeit 98.8% hat das Kind kein Down-Syndrom). Dagegen führt die üblicherweise nach positivem Triple Test empfohlene Fruchtwasseruntersuchung in ca. 0.5% der Fälle zu Komplikationen (Fehlgeburt, Missbildungen, etc.)

Ist der Triple Test dagegen negativ, so sinkt die Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit Down-Syndrom zu bekommen, es gilt nämlich:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(A|B^c) &= \frac{\mathbf{P}(B^c|A) \cdot \mathbf{P}(A)}{\mathbf{P}(B^c|A) \cdot \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B^c|A^c) \cdot \mathbf{P}(A^c)} \\ &= \frac{0.35 \cdot 0.0014}{0.35 \cdot 0.0014 + 0.925 \cdot 0.9986} \\ &\approx 0.0005. \end{aligned}$$

Allerdings ist auch dieser Wert nicht allzu viel kleiner als $\mathbf{P}(A)$.

Andere Resultate bekommt man bei Frauen über 35, da bei diesen der Wert von $\mathbf{P}(A)$ höher ausfällt und damit auch die durch $\mathbf{P}(A|B)$ gegebene Aussagekraft des positiven Testergebnisses steigt.

Bemerkung: Im Beweis von Satz 4.4 wurde verwendet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Vereinigung nicht überlappender Mengen gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten ist. Da dies nicht nur für endliche, sondern auch für abzählbar unendliche Vereinigungen gilt, gelten analoge Aussagen auch für Mengen $B_n \in \mathcal{A}$ ($n \in \mathbb{N}$) mit

$$B_i \cap B_j = \emptyset \text{ für alle } i \neq j, \quad \Omega = \cup_{n=1}^{\infty} B_n \quad \text{und} \quad \mathbf{P}(B_n) > 0 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Z.B. erhält man in diesem Fall für die Formel von Bayes:

$$\mathbf{P}(B_k|A) = \frac{\mathbf{P}(A|B_k) \cdot \mathbf{P}(B_k)}{\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}(A|B_n) \cdot \mathbf{P}(B_n)}$$

für alle $k \in \mathbb{N}$ und beliebige $A \in \mathcal{A}$ mit $\mathbf{P}(A) > 0$.

Im Folgenden möchten wir definieren, wann sich zwei Ereignisse gegenseitig nicht beeinflussen. Naheliegende Forderung dafür ist

$$\mathbf{P}(A|B) = \mathbf{P}(A) \quad \text{und} \quad \mathbf{P}(B|A) = \mathbf{P}(B).$$

Für $\mathbf{P}(B) > 0$ erhält man

$$\mathbf{P}(A|B) = \mathbf{P}(A) \Leftrightarrow \frac{\mathbf{P}(A \cap B)}{\mathbf{P}(B)} = \mathbf{P}(A) \Leftrightarrow \mathbf{P}(A \cap B) = \mathbf{P}(A) \cdot \mathbf{P}(B).$$

Die letzte Bedingung kann auch für $\mathbf{P}(A) = 0$ oder $\mathbf{P}(B) = 0$ betrachtet werden und man definiert:

Definition 4.16 *W-Raum* $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$. Zwei Ereignisse $A, B \in \mathcal{A}$ heißen **unabhängig**, falls gilt:

$$\mathbf{P}(A \cap B) = \mathbf{P}(A) \cdot \mathbf{P}(B).$$

Bemerkung: Gemäß obiger Herleitung gilt im Falle $\mathbf{P}(A) > 0$ und $\mathbf{P}(B) > 0$:

$$A, B \text{ unabhängig} \Leftrightarrow \mathbf{P}(A|B) = \mathbf{P}(A) \quad \text{und} \quad \mathbf{P}(B|A) = \mathbf{P}(B).$$

Bei unabhängigen Ereignissen beeinflusst also das Eintreten eines der Ereignisse nicht die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des anderen.

Beispiel 4.15 *Wir Betrachten das Werfen zweier echter Würfel. Sei A das Ereignis, dass der erste Würfel mit 6 oben landet und sei B das Ereignis, dass der zweite Würfel mit 3 oben landet. Beschreibt man dieses Zufallsexperiment durch einen Laplaceschen W-Raum mit Grundmenge*

$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, \dots, 6\}\},$$

so sieht man

$$\mathbf{P}(A \cap B) = \frac{1}{36} = \frac{6}{36} \cdot \frac{6}{36} = \mathbf{P}(A) \cdot \mathbf{P}(B),$$

also sind A und B unabhängig.

Ist C das Ereignis, dass die Summe der Augenzahlen 12 ist, so gilt

$$\mathbf{P}(B \cap C) = \mathbf{P}(\emptyset) = 0 \neq \frac{6}{36} \cdot \frac{1}{36} = \mathbf{P}(B) \cdot \mathbf{P}(C),$$

also sind B und C nicht unabhängig.

Allgemeiner definiert man:

Definition 4.17 *W-Raum* $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$. Eine Familie $\{A_i : i \in I\}$ von Ereignissen $A_i \in \mathcal{A}$ heißt **unabhängig**, falls für jede endliche Teilmenge J von I gilt:

$$\mathbf{P}(\cap_{j \in J} A_j) = \prod_{j \in J} \mathbf{P}(A_j).$$

Bemerkung: Ist eine Familie $\{A_i : i \in I\}$ von Ereignissen unabhängig, so sind für alle $i, j \in I, i \neq j$ auch die Ereignisse A_i und A_j unabhängig (folgt mit $J = \{i, j\}$). Die Umkehrung gilt aber im allgemeinen nicht:

Sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ ein Laplacescher W-Raum mit $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ und seien

$$A_1 = \{1, 2\}, A_2 = \{1, 3\} \text{ und } A_3 = \{2, 3\}.$$

Dann besteht für alle $i \neq j$ die Menge $A_i \cap A_j$ aus genau einem Element. Daraus folgt:

$$\mathbf{P}(A_i \cap A_j) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{P}(A_i) \cdot \mathbf{P}(A_j).$$

Darüberhinaus gilt aber:

$$\mathbf{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \mathbf{P}(\emptyset) = 0 \neq \mathbf{P}(A_1) \cdot \mathbf{P}(A_2) \cdot \mathbf{P}(A_3).$$

4.5 Zufallsvariablen

Oft interessieren nur Teilaspekte des Ergebnisses eines Zufallsexperimentes. Dies kann man dadurch modellieren, dass man eine Menge Ω' und eine Abbildung $X : \Omega \rightarrow \Omega'$ wählt und $X(\omega)$ anstelle des Ergebnisses ω des Zufallsexperimentes betrachtet.

Beispiel 4.16 *Zufällige Auswahl von Wohnungen zur Erstellung eines Mietspiegels.*

Hier interessiert anstelle einer zufällig ausgewählten Wohnung ω nur Teilaspekte dieser Wohnung wie z.B.

- $X(\omega) = \text{Nettomiete pro Quadratmeter},$
- $Y(\omega) = (\text{Nettomiete}, \text{Größe in Quadratmetern}),$
- $Z(\omega) = \text{Anzahl der Zimmer}.$

Wir untersuchen im Folgenden, wie man einen W-Raum $(\Omega', \mathcal{A}', \mathbf{P}_X)$ konstruieren kann, der das Zufallsexperiment mit Ergebnis $X(\omega)$ beschreibt.

$X(\omega)$ liegt genau dann in A' , wenn das zufällige Ergebnis ω des Zufallsexperiments in der Menge

$$\{\bar{\omega} \in \Omega : X(\bar{\omega}) \in A'\}$$

liegt. Daher ist es naheliegend zu definieren

$$\mathbf{P}_X(A') := \mathbf{P}[X \in A'] := \mathbf{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A'\}). \quad (4.2)$$

Damit diese Wahrscheinlichkeit wohldefiniert ist, muss

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A'\} \in \mathcal{A}$$

erfüllt sein. Abbildungen X , für die das für alle betrachteten Mengen gilt, heißen *Zufallsvariablen*.

Definition 4.18 Ω' Grundmenge, \mathcal{A}' σ -Algebra über Ω' . Dann heißt (Ω', \mathcal{A}') **Messraum**.

Definition 4.19 $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ W -Raum, (Ω', \mathcal{A}') Messraum. Dann heißt jede Abbildung

$$X : \Omega \rightarrow \Omega'$$

mit

$$X^{-1}(A') := \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A'\} \in \mathcal{A} \quad \text{für alle } A' \in \mathcal{A}'$$

Zufallsvariable (kurz: ZV). Im Fall $\Omega' = \mathbb{R}$ und $\mathcal{A} = \mathcal{B}$ heißt X **reelle Zufallsvariable**.

Der Begriff Zufallsvariable ist zunächst einmal nur eine Bezeichnung. Obwohl sich diese sicherlich mit einiger Mühe rechtfertigen lässt, sei darauf hingewiesen, dass es sich bei einer Zufallsvariablen keineswegs um eine Variable, sondern um eine Abbildung handelt. Es ist daher nicht sinnvoll, den Begriff Zufallsvariable zu intensiv zu interpretieren.

Beispiel 4.17 n Personen stimmen bei einer Abstimmung über zwei Vorschläge A und B ab. Dabei entscheidet sich jede Person unabhängig von den anderen mit Wahrscheinlichkeit $p \in [0, 1]$ für Vorschlag A und mit Wahrscheinlichkeit $1 - p$ für B . Gesucht ist eine Möglichkeit zur stochastischen Modellierung des Abstimmungsverhaltens der n Personen.

Als Ergebnis des Zufallsexperiments betrachten wir

$$\omega = (x_1, \dots, x_n) \quad \text{mit } x_1, \dots, x_n \in \{0, 1\},$$

wobei $x_i = 1$ bzw. $x_i = 0$ bedeutet, dass die i -te Person für Vorschlag A bzw. Vorschlag B stimmt.

Der zugehörige Wahrscheinlichkeitsraum ist dann $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ mit

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in \{0, 1\}\}, \quad \mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega) \quad \text{und} \quad \mathbf{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$$

festgelegt durch

$$\mathbf{P}(\{(x_1, \dots, x_n)\}) = \prod_{i=1}^n (p^{x_i} \cdot (1-p)^{1-x_i}) = p^{\sum_{i=1}^n x_i} \cdot (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}$$

für $x_1, \dots, x_n \in \{0, 1\}$.

Interessiert man sich aber nur für die Anzahl der Stimmen für Vorschlag A (und nicht für die Reihenfolge), so ist es naheliegend statt

$$(x_1, \dots, x_n)$$

nur

$$X((x_1, \dots, x_n)) = x_1 + \dots + x_n$$

zu betrachten.

Da hier $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ gewählt wurde, ist die Bedingung

$$X^{-1}(A') \in \mathcal{A}$$

trivialerweise für alle A' erfüllt. Also ist X (unabhängig von der Wahl von \mathcal{A}') eine Zufallsvariable gemäß obiger Definition. Im Folgenden bestimmen wir einen Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega', \mathcal{A}', \mathbf{P}_X)$, der das Zufallsexperiment mit Ausgang $X((x_1, \dots, x_n))$ beschreibt.

Dabei setzen wir $\Omega' = \mathbb{N}_0$ und $\mathcal{A}' = \mathcal{P}(\mathbb{N}_0)$ und bestimmen die Wahrscheinlichkeit $\mathbf{P}_X(\{k\})$, dass $X(\omega)$ den Wert k annimmt, gemäß

$$\mathbf{P}_X(\{k\}) = \mathbf{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = k\}).$$

Für $k > n$ gilt dann

$$\mathbf{P}_X(\{k\}) = \mathbf{P}(\{(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n : x_1 + \dots + x_n = k\}) = \mathbf{P}(\emptyset) = 0,$$

während für $0 \leq k \leq n$ gilt:

$$\mathbf{P}_X(\{k\}) = \mathbf{P}(\{(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n : x_1 + \dots + x_n = k\}).$$

Es gibt $\binom{n}{k}$ n -Tupel $(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n$ mit $x_1 + \dots + x_n = k$, für jedes dieser n -Tupel gilt

$$\mathbf{P}(\{(x_1, \dots, x_n)\}) = p^{\sum_{i=1}^n x_i} \cdot (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i} = p^k \cdot (1-p)^{n-k},$$

womit folgt

$$\mathbf{P}_X(\{k\}) = \sum_{\substack{(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n, \\ x_1 + \dots + x_n = k}} \mathbf{P}(\{(x_1, \dots, x_n)\}) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}.$$

\mathbf{P}_X ist also eine Binomialverteilung mit den Parametern n und p .

Beispiel 4.18 *Um seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren, beschließt Student S., seinen Lebensunterhalt durch Betreiben eines Glücksrads auf dem Cannstatter Volksfest aufzubessern.*

Nach Drehen bleibt dieses rein zufällig auf einem von 64 Feldern stehen. Bleibt es auf einem der fünf braun gefärbten Felder stehen, so erhält der Spieler einen Mohrenkopf (Wert 20 Cent). Bleibt es auf einem der beiden rot gefärbten Felder stehen, so erhält der Spieler eine rote Rose (Wert 3 Euro). Und bleibt es auf dem einzigen schwarzen Feld stehen, so erhält der Spieler das Buch Statistik - Der Weg zur Datenanalyse von Fahrmeir, Künstler, Pigeot und Tutz, Springer 2001 (Wert ca. 25 Euro). Auf den 56 übrigen weißen Feldern wird kein Gewinn ausgegeben.

Gesucht ist eine Möglichkeit zur stochastischen Modellierung des (zufälligen) Wertes des Gewinns.

Der zufällige Gewinn X nimmt nur endlich viele Werte an, nämlich nur die Werte 0, 20, 300 und 2500 (in Cent). Wir bestimmen

$$\mathbf{P}[X = x]$$

für jeden dieser Werte:

Für $x = 300$: X nimmt den Wert 300 an, wenn das Glücksrad auf einem der 2 roten Felder stehenbleibt. Dass genau eines der beiden roten Felder von den insgesamt 64 Feldern auftritt, kommt mit Wk. $2/64$ vor. Daher gilt:

$$\mathbf{P}[X = 300] = \frac{2}{64}.$$

Analog bestimmt man

$$\mathbf{P}[X = 0] = \frac{56}{64}, \mathbf{P}[X = 20] = \frac{5}{64} \text{ und } \mathbf{P}[X = 2500] = \frac{1}{64}.$$

Für alle anderen Werte $x \in \mathbb{R}$ gilt $\mathbf{P}[X = x] = 0$. Wir setzen dann

$$\mathbf{P}[X \in B] = \sum_{k \in \{0, 20, 300, 2500\} \cap B} \mathbf{P}[X = k]$$

für $B \subseteq \mathbb{R}$.

Formal ist X eine *Zufallsvariable*, die definiert werden kann wie folgt:

Wir beschreiben das Drehen am Glücksrad durch einen Laplaceschen W-Raum $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ mit

$$\Omega = \{1, 2, \dots, 64\},$$

$$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$$

und

$$\mathbf{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Hierbei ist $\omega \in \Omega$ die Nummer des Feldes, auf dem das Glücksrad stehenbleibt. Die Felder 1 bis 5 seien braun, die Felder 6 und 7 seien rot, Feld 8 sei schwarz und die Felder 9 bis 64 seien weiß.

Der bei Auftreten von Feld ω ausgezahlte Gewinn ist gegeben durch

$$X(\omega) = \begin{cases} 20 & \text{für } \omega \in \{1, \dots, 5\} \\ 300 & \text{für } \omega \in \{6, 7\} \\ 2500 & \text{für } \omega = 8 \\ 0 & \text{für } \omega \in \{9, 10, \dots, 64\}. \end{cases}$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass $X(\omega)$ in einer Menge $B \subseteq \mathbb{R}$ landet, wird dann festgelegt gemäß

$$\mathbf{P}[X \in B] := \mathbf{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\})$$

Speziell gilt:

$$\mathbf{P}[X = 20] := \mathbf{P}[X \in \{20\}] = \mathbf{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in \{20\}\}) = \mathbf{P}(\{1, 2, 3, 4, 5\}) = \frac{5}{64},$$

Analog erhält man

$$\begin{aligned} \mathbf{P}[X = 300] &= \mathbf{P}(\{6, 7\}) = \frac{2}{64} \\ \mathbf{P}[X = 2500] &= \mathbf{P}(\{8\}) = \frac{1}{64} \\ \mathbf{P}[X = 0] &= \mathbf{P}(\{9, 10, \dots, 64\}) = \frac{56}{64}. \end{aligned}$$

Darüberhinaus gilt für $B \subseteq \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}[X \in B] &= \mathbf{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}) \\ &= \mathbf{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in \{0, 20, 300, 2500\} \cap B\}) \\ &= \sum_{k \in \{0, 20, 300, 2500\} \cap B} \mathbf{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = k\}) \\ &= \sum_{k \in \{0, 20, 300, 2500\} \cap B} \mathbf{P}[X = k]. \end{aligned}$$

Wie der folgende Satz zeigt, hat die Zuweisung (4.2) von Wahrscheinlichkeiten zu Mengen immer die Eigenschaften, die wir für Wahrscheinlichkeitsmaße gefordert haben.

Satz 4.5 Sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ ein W-Raum, (Ω', \mathcal{A}') ein Messraum und $X : \Omega \rightarrow \Omega'$ eine Zufallsvariable. Dann wird durch

$$\mathbf{P}_X(A') := \mathbf{P}(X^{-1}(A')) = \mathbf{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A'\}) \quad (A' \in \mathcal{A}')$$

ein W-Raum $(\Omega', \mathcal{A}', \mathbf{P}_X)$ definiert.

Beweis: Da X Zufallsvariable ist, gilt $X^{-1}(A') \in \mathcal{A}$ für alle $A' \in \mathcal{A}'$, und daher ist \mathbf{P}_X wohldefiniert. Weiter gilt wegen \mathbf{P} W-Maß

$$\mathbf{P}_X(A') = \mathbf{P}(X^{-1}(A')) \geq 0$$

für alle $A' \in \mathcal{A}'$, sowie

$$\mathbf{P}_X(\Omega') = \mathbf{P}(X^{-1}(\Omega')) = \mathbf{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in \Omega'\}) = \mathbf{P}(\Omega) = 1.$$

Sind darüberhinaus $A'_1, A'_2, \dots \in \mathcal{A}'$ paarweise disjunkt (d.h. gilt $A'_i \cap A'_j = \emptyset$ für $i \neq j$), so sind auch $X^{-1}(A'_1), X^{-1}(A'_2), \dots \in \mathcal{A}$ paarweise disjunkt, denn aus

$$\begin{aligned} \omega \in X^{-1}(A'_i) \cap X^{-1}(A'_j) &\Leftrightarrow \omega \in X^{-1}(A'_i) \text{ und } \omega \in X^{-1}(A'_j) \\ &\Leftrightarrow X(\omega) \in A'_i \text{ und } X(\omega) \in A'_j \\ &\Leftrightarrow X(\omega) \in A'_i \cap A'_j \end{aligned}$$

folgt $X^{-1}(A'_i) \cap X^{-1}(A'_j) = \emptyset$ für $i \neq j$. Beachtet man darüberhinaus

$$\begin{aligned} \omega \in X^{-1}(\cup_{n=1}^{\infty} A'_n) &\Leftrightarrow X(\omega) \in \cup_{n=1}^{\infty} A'_n \\ &\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} : X(\omega) \in A'_n \\ &\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} : \omega \in X^{-1}(A'_n) \\ &\Leftrightarrow \omega \in \cup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(A'_n), \end{aligned}$$

woraus

$$X^{-1}(\cup_{n=1}^{\infty} A'_n) = \cup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(A'_n)$$

folgt, so erhält man aufgrund der σ -Additivität des W-Maßes \mathbf{P} :

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_X(\cup_{n=1}^{\infty} A'_n) &= \mathbf{P}(X^{-1}(\cup_{n=1}^{\infty} A'_n)) = \mathbf{P}(\cup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(A'_n)) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}(X^{-1}(A'_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}_X(A'_n). \end{aligned}$$

Mit Lemma 4.1 folgt die Behauptung. □

Für das in Satz 4.5 eingeführte W-Maß ist die folgende Bezeichnung üblich:

Definition 4.20 Das in Satz 4.5 eingeführte W -Maß \mathbf{P}_X heißt **Verteilung** der Zufallsvariablen X .

Bemerkung: Sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ W -Raum. Dann ist \mathbf{P} Verteilung der Zufallsvariablen

$$Y : \Omega \rightarrow \Omega, \quad Y(\omega) = \omega.$$

Jedes W -Maß kann also als Verteilung einer geeigneten Zufallsvariablen aufgefasst werden. Daher ist es üblich, die Begriffe W -Maß und Verteilung synonym zu verwenden.

Im Folgenden werden die bisher eingeführten Bezeichnungen auf Zufallsvariablen übertragen. Dem Begriff W -Maß mit *Zähldichte* entspricht der Begriff *diskrete Zufallsvariable*.

Definition 4.21 Sei X eine reelle Zufallsvariable. Dann heißt X **diskrete Zufallsvariable**, falls für eine endliche oder abzählbar unendliche Menge $A \subseteq \mathbb{R}$ gilt:

$$\mathbf{P}[X \in A] = 1,$$

d.h. falls X mit Wahrscheinlichkeit Eins nur Werte aus einer endlichen oder abzählbar unendlichen Menge annimmt.

Definition 4.22 Sei X eine diskrete Zufallsvariable mit Werten x_1, x_2, \dots bzw. mit Werten x_1, \dots, x_N . Dann heißt

$$(\mathbf{P}[X = x_k])_{k \in \mathbb{N}} \quad \text{bzw.} \quad (\mathbf{P}[X = x_k])_{k=1, \dots, N}$$

Zähldichte von X .

Beispiele für diskrete Zufallsvariablen:

1. Seien $n \in \mathbb{N}$ und $p \in [0, 1]$. Eine reelle Zufallsvariable X mit

$$\mathbf{P}[X = k] = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (k \in \{0, \dots, n\})$$

heißt **binomialverteilt mit Parametern n und p** (kurz: $b(n, p)$ -verteilt).

Hierbei gilt:

$$\mathbf{P}[X \in \{0, \dots, n\}] = \sum_{k=0}^n \mathbf{P}[X = k] = (p + (1-p))^n = 1$$

und

$$\mathbf{P}[X \in \mathbb{R} \setminus \{0, \dots, n\}] = 1 - \mathbf{P}[X \in \{0, \dots, n\}] = 0.$$

2. Sei $\lambda \in \mathbb{R}_+$. Eine reelle Zufallsvariable X mit

$$\mathbf{P}[X = k] = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$$

heißt **Poisson-verteilt mit Parameter λ** (kurz: $\pi(\lambda)$ -verteilt).

Hierbei gilt:

$$\mathbf{P}[X \in \mathbb{N}_0] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{P}[X = k] = e^{-\lambda} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$

und

$$\mathbf{P}[X \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}_0] = 1 - \mathbf{P}[X \in \mathbb{N}_0] = 0.$$

Als nächstes übertragen wir den Begriff *W-Maß mit Dichte* auf Zufallsvariablen.

Definition 4.23 Sei X eine reelle Zufallsvariable und sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ eine Funktion mit $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$. Dann heißt X **stetig verteilte Zufallsvariable mit Dichte f** , falls gilt

$$\mathbf{P}[X \in B] = \int_B f(x) dx \quad (B \in \mathcal{B}).$$

In diesem Fall heißt f **Dichte** von X bzw. von \mathbf{P}_X .

Beispiele für stetig verteilte Zufallsvariablen:

1. Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ und sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ definiert durch

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{für } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{für } x < a \text{ oder } x > b. \end{cases}$$

Eine reelle Zufallsvariable X mit

$$\mathbf{P}[X \in B] = \int_B f(x) dx \quad (B \in \mathcal{B})$$

heißt **gleichverteilt auf $[a, b]$** (kurz: $U([a, b])$ -verteilt).

2. Sei $\lambda \in \mathbb{R}_+$ und sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ definiert durch

$$f(x) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda x} & \text{für } x \geq 0, \\ 0 & \text{für } x < 0. \end{cases}$$

Eine reelle Zufallsvariable X mit

$$\mathbf{P}[X \in B] = \int_B f(x) dx \quad (B \in \mathcal{B}).$$

heißt **exponential-verteilt mit Parameter λ** (kurz: $exp(\lambda)$ -verteilt).

3. Seien $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma \in \mathbb{R}_+$ und sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ definiert durch

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Eine reelle Zufallsvariable X mit

$$\mathbf{P}[X \in B] = \int_B f(x) dx \quad (B \in \mathcal{B})$$

heißt **normalverteilt mit Parametern μ und σ^2** (kurz: $N(\mu, \sigma^2)$ -verteilt).

Als nächstes übertragen wir den Begriff der Unabhängigkeit auf Zufallsvariablen.

Definition 4.24 Sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ ein W -Raum, seien $(\Omega_i, \mathcal{A}_i)$ ($i = 1, \dots, n$) Messräume und seien

$$X_i : \Omega \rightarrow \Omega_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

Zufallsvariablen. Dann heißen X_1, \dots, X_n **unabhängig**, falls für alle $A_i \in \mathcal{A}_i$ ($i = 1, \dots, n$) gilt:

$$\mathbf{P}[X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n] = \mathbf{P}[X_1 \in A_1] \cdots \mathbf{P}[X_n \in A_n].$$

Eine Folge $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ von Zufallsvariablen heißt **unabhängig**, falls X_1, \dots, X_n unabhängig sind für jedes $n \in \mathbb{N}$.

Bemerkung:

a) In der obigen Definition wurden die Schreibweisen

$$\begin{aligned} & \mathbf{P}[X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n] \\ & := \mathbf{P}(\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) \in A_1, \dots, X_n(\omega) \in A_n\}) \\ & = \mathbf{P}(\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) \in A_1\} \cap \cdots \cap \{\omega \in \Omega : X_n(\omega) \in A_n\}) \end{aligned}$$

und

$$\mathbf{P}[X_i \in A_i] := \mathbf{P}(\{\omega \in \Omega : X_i(\omega) \in A_i\})$$

verwendet. Formal sind Ausdrücke wie $X \in A$, wobei X eine Abbildung und A eine Menge von Zahlen ist, natürlich unsinnig. Da sie aber sowohl üblich als auch sehr suggestiv sind, werden sie im Folgenden vielfach verwendet.

b) Sind X_1, \dots, X_n unabhängig, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Zufallsvariablen gleichzeitig gewisse Bedingungen erfüllen, gleich dem Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten.

c) Die obige Definition der Unabhängigkeit ist für n -Tupel von Zufallsvariablen mit $n > 2$ etwas einfacher als die entsprechende Definition für Ereignisse, da oben einige A_i gleich Ω_i gesetzt werden können und damit endliche Teilmengen der Indexmenge automatisch mit erfasst werden.

Definition 4.25 Sei X eine reelle Zufallsvariable. Dann heißt die durch

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) := \mathbf{P}[X \leq x] := \mathbf{P}_X((-\infty, x])$$

definierte Funktion die **Verteilungsfunktion** (kurz: Vf) der Zufallsvariablen X (bzw. des W-Maßes \mathbf{P}_X).

Bemerkung: Durch die Verteilungsfunktion sind die Werte von \mathbf{P}_X für alle Intervalle $(a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$) festgelegt:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_X((a, b]) &= \mathbf{P}_X((-\infty, b] \setminus (-\infty, a]) \\ &= \mathbf{P}_X((-\infty, b]) - \mathbf{P}_X((-\infty, a]) \\ &= F(b) - F(a). \end{aligned}$$

Man kann zeigen, dass dadurch sogar das gesamte W-Maß $\mathbf{P}_X : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}$ festgelegt ist (!)

Beispiel 4.19 Sei X eine $\exp(\lambda)$ -verteilte ZV, d.h.,

$$\mathbf{P}_X(A) = \int_A f(x) dx \quad \text{mit} \quad f(x) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} & \text{für } x \geq 0, \\ 0 & \text{für } x < 0, \end{cases}$$

wobei $\lambda > 0$. Dann gilt für die Verteilungsfunktion F von X :

$$\begin{aligned} F(x) &= \mathbf{P}_X((-\infty, x]) = \int_{(-\infty, x]} f(u) du \\ &= \begin{cases} \int_0^x \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot u} du = 1 - e^{-\lambda \cdot x} & \text{für } x \geq 0, \\ 0 & \text{für } x < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Satz 4.6 (Eigenschaften der Verteilungsfunktion) Sei F die Verteilungsfunktion einer reellen Zufallsvariablen X auf einem W-Raum $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$. Dann gilt:

a) $F(x) \in [0, 1]$ für alle $x \in \mathbb{R}$,

b) F ist monoton nichtfallend, d.h. aus $x_1 \leq x_2$ folgt $F(x_1) \leq F(x_2)$,

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0,$

d) F ist rechtsseitig stetig, d.h.

$$\lim_{\substack{y \rightarrow x \\ y > x}} F(y) = F(x)$$

für alle $x \in \mathbb{R}$.

Zum Beweis von Satz 4.6 benötigen wir das folgende Lemma.

Lemma 4.6 Sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ ein beliebiger W -Raum.a) Für alle $A, A_n \in \mathcal{A}$ ($n \in \mathbb{N}$) mit

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots \quad \text{und} \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A$$

gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}(A_n) = \mathbf{P}(A)$$

(sog. Stetigkeit von unten des W -Maßes \mathbf{P}).b) Für alle $A, A_n \in \mathcal{A}$ ($n \in \mathbb{N}$) mit

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots \quad \text{und} \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A$$

gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}(A_n) = \mathbf{P}(A)$$

(sog. Stetigkeit von oben des W -Maßes \mathbf{P}).**Beweis. a)** Nachweis der Stetigkeit von unten: Wir zeigen,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}(A_n) = \mathbf{P}(A),$$

indem wir beide Seiten separat umformen.

Zur Umformung der linken Seite stellen wir die Menge A_N dar als

$$A_N = A_1 \cup \bigcup_{n=2}^N (A_n \setminus A_{n-1}).$$

Dabei haben die Mengen $A_1, A_2 \setminus A_1, \dots, A_N \setminus A_{N-1}$ paarweise leeren Schnitt.

Mit der σ -Additivität von \mathbf{P} folgt:

$$\mathbf{P}(A_N) = \mathbf{P}\left(A_1 \cup \bigcup_{n=2}^N (A_n \setminus A_{n-1})\right) = \mathbf{P}(A_1) + \sum_{n=2}^N \mathbf{P}(A_n \setminus A_{n-1})$$

und damit

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \mathbf{P}(A_N) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\mathbf{P}(A_1) + \sum_{n=2}^N \mathbf{P}(A_n \setminus A_{n-1}) \right) \\ &= \mathbf{P}(A_1) + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^N \mathbf{P}(A_n \setminus A_{n-1}) \\ &= \mathbf{P}(A_1) + \sum_{n=2}^{\infty} \mathbf{P}(A_n \setminus A_{n-1}) \end{aligned}$$

Zur Umformung der rechten Seite stellen wir die Menge $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ dar als

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \cup \bigcup_{n=2}^{\infty} (A_n \setminus A_{n-1}).$$

Dabei haben die Mengen $A_1, A_2 \setminus A_1, A_3 \setminus A_2, \dots$ wieder paarweise leeren Schnitt.

Mit der σ -Additivität von \mathbf{P} folgt:

$$\mathbf{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mathbf{P}\left(A_1 \cup \bigcup_{n=2}^{\infty} (A_n \setminus A_{n-1})\right) = \mathbf{P}(A_1) + \sum_{n=2}^{\infty} \mathbf{P}(A_n \setminus A_{n-1})$$

Dies impliziert die Behauptung.

b) Nachweis der Stetigkeit von oben:

Es gilt:

$$\Omega \setminus A_1 \subseteq \Omega \setminus A_2 \subseteq \Omega \setminus A_3 \subseteq \dots$$

und

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega \setminus A_n = \Omega \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \Omega \setminus A.$$

Anwendung der Stetigkeit von unten ergibt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}(\Omega \setminus A_n) = \mathbf{P}(\Omega \setminus A).$$

Mit

$$\mathbf{P}(\Omega \setminus A_n) = 1 - \mathbf{P}(A_n) \quad \text{und} \quad \mathbf{P}(\Omega \setminus A) = 1 - \mathbf{P}(A)$$

folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \mathbf{P}(A_n)) = 1 - \mathbf{P}(A),$$

also

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}(A_n) = \mathbf{P}(A).$$

□

Beweis von Satz 4.6.

a) Da \mathbf{P}_X W-Maß ist, gilt

$$F(x) = \mathbf{P}[X \leq x] = \mathbf{P}_X((-\infty, x]) \in [0, 1].$$

b) Für $x_1 \leq x_2$ gilt $(-\infty, x_1] \subseteq (-\infty, x_2]$, und dies wiederum impliziert

$$F(x_1) = \mathbf{P}_X((-\infty, x_1]) \leq \mathbf{P}_X((-\infty, x_2]) = F(x_2).$$

c₁) *Nachweis von $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$:*

Sei $(x_n)_n$ eine beliebige monoton wachsende Folge reeller Zahlen mit $x_n \rightarrow \infty$ ($n \rightarrow \infty$). Dann gilt

$$(-\infty, x_1] \subseteq (-\infty, x_2] \subseteq \dots \quad \text{und} \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} (-\infty, x_n] = \mathbb{R},$$

und mit der Stetigkeit von unten des W-Maßes \mathbf{P}_X folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}_X((-\infty, x_n]) = \mathbf{P}_X(\mathbb{R}) = 1.$$

Aufgrund der Monotonie von F folgt daraus die Behauptung.

c₂) *Nachweis von $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$:*

Sei $(x_n)_n$ eine beliebige monoton fallende Folge reeller Zahlen mit $x_n \rightarrow -\infty$ ($n \rightarrow \infty$). Dann gilt

$$(-\infty, x_1] \supseteq (-\infty, x_2] \supseteq \dots \quad \text{und} \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, x_n] = \emptyset$$

und mit der Stetigkeit von oben des W-Maßes \mathbf{P}_X folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}_X((-\infty, x_n]) = \mathbf{P}_X(\emptyset) = 0.$$

Aufgrund der Monotonie von F folgt daraus die Behauptung.

d) *Nachweis von $\lim_{y \rightarrow x, y > x} F(y) = F(x)$:*

Sei $(x_n)_n$ eine beliebige monoton fallende Folge reeller Zahlen mit $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$). Dann gilt

$$(-\infty, x_1] \supseteq (-\infty, x_2] \supseteq \dots \quad \text{und} \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, x_n] = (-\infty, x]$$

und mit der Stetigkeit von oben des W-Maßes \mathbf{P}_X folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}_X((-\infty, x_n]) = \mathbf{P}_X((-\infty, x]) = F(x).$$

Aufgrund der Monotonie von F folgt daraus die Behauptung. \square

Beispiel 4.20 Die zufällige Lebensdauer X der Batterie eines Computers sei $\exp(\lambda)$ -verteilt. Um die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Ausfalls des Rechners zu verringern wird diese spätestens nach einer festen Zeit $t > 0$ ausgetauscht, d.h., für die Betriebszeit Y der Batterie gilt

$$Y(\omega) = \min\{X(\omega), t\} \quad (\omega \in \Omega).$$

Zu ermitteln ist die Verteilungsfunktion G von Y .

Wegen

$$\min\{X(\omega), t\} \leq y \quad \Leftrightarrow \quad X(\omega) \leq y \quad \text{oder} \quad t \leq y$$

gilt

$$\begin{aligned} G(y) &= \mathbf{P}_Y((-\infty, y]) = \mathbf{P}[\min\{X, t\} \leq y] \\ &= \mathbf{P}(\{\omega \in \Omega : \min\{X(\omega), t\} \leq y\}) \\ &= \begin{cases} \mathbf{P}(\Omega) = 1 & \text{für } y \geq t, \\ \mathbf{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq y\}) = \mathbf{P}[X \leq y] = 1 - e^{-\lambda y} & \text{für } 0 \leq y < t, \\ \mathbf{P}(\emptyset) = 0 & \text{für } y < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

4.6 Erwartungswert

Sei X eine reelle Zufallsvariable. Im Folgenden wird festgelegt, was man unter dem “mittleren Wert” des Ergebnisses $X(\omega)$ des zugehörigen Zufallsexperiments versteht.

Dieser Begriff ist in vielen Anwendungen von zentraler Bedeutung. Z.B. wird oft versucht, einen möglichst hohen (zufälligen) Gewinn zu erzielen, indem man den

“mittleren Gewinn” (bei Versendung von Werbung, Vergabe von Krediten, Kauf von Aktien, etc.) optimiert.

Das weitere Vorgehen wird mit Hilfe der drei folgenden hypothetischen Beispiele illustriert werden:

Beispiel 4.21 *Ein “echter” Würfel wird so lange geworfen, bis er zum ersten Mal mit 6 oben landet.*

Wie oft wird der Würfel dann “im Mittel” geworfen ?

Beispiel 4.21 kann durch eine diskrete Zufallsvariable mit Werten in \mathbb{N} beschrieben werden.

Beispiel 4.22 *Dozent K. fährt nach seiner Statistik Vorlesung immer mit der S-Bahn nach Vaihingen. Diese fährt alle 10 Minuten. Da Dozent K. sich die genauen Abfahrtszeiten nicht merken kann, trifft er rein zufällig innerhalb eines zehnminütigen Intervalls zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abfahrtszeiten am Bahnhof ein.*

Wie lange muss Dozent K. dann “im Mittel” warten ?

Die Wartezeit in Beispiel 4.22 ist rein zufällig im Intervall $[0, 10]$ verteilt und wird daher durch eine auf $[0, 10]$ gleichverteilte Zufallsvariable, d.h. durch eine stetig verteilte Zufallsvariable mit Dichte, beschrieben.

Beispiel 4.23 *Student S. fährt immer mit dem Auto zur Uni. Dabei passiert er eine Ampelanlage, bei der sich eine einminütige Grünphase mit einer zweiminütigen Rotphase abwechselt.*

Wie lange wartet er “im Mittel”, wenn seine Ankunft an der Ampel rein zufällig innerhalb eines dreiminütigen Intervalls, bestehend aus Grün- und Rotphase, erfolgt ?

Die Zufallsvariable X , die die zufällige Wartezeit an der Ampel beschreibt, ist weder diskret verteilt noch stetig verteilt mit Dichte (denn aus letzterem würde folgen:

$$\mathbf{P}[X = 0] \leq \mathbf{P}[X \in (-\epsilon, \epsilon)] = \int_{-\epsilon}^{\epsilon} f(x) dx \rightarrow 0 \quad (\epsilon \rightarrow 0),$$

was im Widerspruch steht zu $\mathbf{P}[X = 0] = 1/3$).

4.6.1 Diskrete Zufallsvariablen

Sei X eine diskrete Zufallsvariable mit Werten $x_1, x_2, \dots \in \mathbb{R}$. Dann ist es nahelegend, als "mittleren Wert" von X das mit $\mathbf{P}[X = x_k]$ gewichtete Mittel der Zahlen x_k zu wählen:

Definition 4.26 Sei X eine diskrete Zufallsvariable mit Werten $x_1, x_2, \dots \in \mathbb{R}$. Dann heißt

$$\mathbf{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \cdot \mathbf{P}[X = x_k]$$

– sofern existent – der **Erwartungswert** von X .

Anwendung im Beispiel 4.21: Für die zufällige Anzahl X der Würfe des Würfels in Beispiel 4.21 gilt

$$\begin{aligned} \mathbf{P}[X = k] &= \mathbf{P}[1. \text{ Augenzahl} \in \{1, \dots, 5\}, \dots, (k-1)\text{te Augenzahl} \in \{1, \dots, 5\}, \\ &\quad k\text{-te Augenzahl} = 6] \\ &= \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Damit erhält man

$$\mathbf{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} = \frac{1}{6} \cdot \frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} x^k \Big|_{x=5/6} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{(1-x)^2} \Big|_{x=5/6} = 6.$$

Beispiel 4.24 Wir betrachten nochmals das Glücksrad aus Beispiel 4.18. Bestimmen möchten wir den "mittlere Gewinn" (Erwartungswert) beim Drehen an diesem Glücksrad.

Der zufällige Gewinn X nimmt hier nur die Werte 0, 20, 300 und 2500 an, und zwar mit den in Beispiel 4.18 bestimmten Wahrscheinlichkeiten $\mathbf{P}[X = 0] = 56/64$, $\mathbf{P}[X = 20] = 5/64$, $\mathbf{P}[X = 300] = 2/64$ und $\mathbf{P}[X = 2500] = 1/64$.

Damit ergibt sich der mittlere Wert (*Erwartungswert*) des zufälligen Gewinns X als

$$\begin{aligned} \mathbf{E}X &= 0 \cdot \mathbf{P}[X = 0] + 20 \cdot \mathbf{P}[X = 20] + 300 \cdot \mathbf{P}[X = 300] + 2500 \cdot \mathbf{P}[X = 2500] \\ &= 0 \cdot \frac{56}{64} + 20 \cdot \frac{5}{64} + 300 \cdot \frac{2}{64} + 2500 \cdot \frac{1}{64} \\ &= 50. \end{aligned}$$

Beispiel 4.25 X sei eine $b(n, p)$ -verteilte Zufallsvariable ($n \in \mathbb{N}, p \in [0, 1]$), d.h.

$$\mathbf{P}[X = k] = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (k \in \{0, \dots, n\}).$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \mathbf{E}X &= \sum_{k=0}^n k \cdot \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= n \cdot p \cdot \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\ &= n \cdot p \cdot (p + (1-p))^{n-1} \\ &= n \cdot p. \end{aligned}$$

Beispiel 4.26 X sei eine $\pi(\lambda)$ -verteilte Zufallsvariable ($\lambda > 0$), d.h.

$$\mathbf{P}[X = k] = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} \quad (k \in \mathbb{N}_0).$$

Dann gilt

$$\mathbf{E}X = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} = \lambda \cdot \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \right) \cdot e^{-\lambda} = \lambda \cdot e^{\lambda} \cdot e^{-\lambda} = \lambda.$$

4.6.2 Stetig verteilte Zufallsvariablen

Im Falle einer stetig verteilten Zufallsvariablen X mit Dichte f ersetzt man die Summe in der obigen Definition durch das entsprechende Integral:

Definition 4.27 Sei X eine stetig verteilte Zufallsvariable mit Dichte f . Dann heißt

$$\mathbf{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

– sofern existent – der **Erwartungswert** von X .

Anwendung im Beispiel 4.22: Die zufällige Wartezeit auf die S-Bahn in Beispiel 4.22 wird durch eine auf $[0, 10]$ gleichverteilte Zufallsvariable X beschrieben, d.h. durch eine stetig verteilte Zufallsvariable mit Dichte

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{10} & \text{für } 0 \leq x \leq 10, \\ 0 & \text{für } x < 0 \text{ oder } x > 10. \end{cases}$$

Damit folgt für die mittlere Wartezeit:

$$\mathbf{E}X = \int_{\mathbb{R}} x \cdot f(x) dx = \int_0^{10} x \cdot \frac{1}{10} dx = \frac{x^2}{20} \Big|_{x=0}^{10} = 5.$$

Beispiel 4.27 X sei eine $\exp(\lambda)$ -verteilte Zufallsvariable, d.h.

$$\mathbf{P}_X(A) = \int_A f(x) dx \quad \text{mit} \quad f(x) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda x} & \text{für } x \geq 0, \\ 0 & \text{für } x < 0, \end{cases}$$

wobei $\lambda > 0$. Dann gilt

$$\begin{aligned} \mathbf{E}X &= \int_0^{\infty} x \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda x} dx = -x \cdot e^{-\lambda x} \Big|_{x=0}^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = 0 - \frac{1}{\lambda} \cdot e^{-\lambda x} \Big|_{x=0}^{\infty} \\ &= \frac{1}{\lambda}. \end{aligned}$$

Beispiel 4.28 X sei eine $N(a, \sigma^2)$ -verteilte Zufallsvariable, d.h.

$$\mathbf{P}_X(A) = \int_A f(x) dx \quad \text{mit} \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-(x-a)^2/(2\sigma^2)}.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \mathbf{E}X &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-(x-a)^2/(2\sigma^2)} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x-a}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-(x-a)^2/(2\sigma^2)} dx + a \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-(x-a)^2/(2\sigma^2)} dx \\ &= 0 + a = a. \end{aligned}$$

Dabei wurde beim dritten Gleichheitszeichen ausgenutzt, dass der erste Integrand punktsymmetrisch bezüglich $x = a$ ist, und dass beim zweiten Integral über eine Dichte integriert wird.

4.6.3 Berechnung allgemeinerer Erwartungswerte

Wie aus Beispiel 4.23 ersichtlich wird, reichen die bisher behandelten Spezialfälle nicht aus. Im nächsten Unterabschnitt wird eine wesentlich allgemeinere (aber auch etwas kompliziertere) Definition des Erwartungswertes gegeben. Die wichtigsten Konsequenzen daraus werden in diesem Unterabschnitt kurz zusammengefasst und an einigen Beispielen illustriert.

Die allgemeine Definition des Erwartungswertes erfolgt durch Definition eines Integrals $\int_{\Omega} X(\omega) dP(\omega)$.

Ist $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine (messbare) reelle Funktion, und ist X eine diskrete Zufallsvariable mit Werten $x_1, x_2, \dots \in \mathbb{R}$, so gilt:

$$\mathbf{E}h(X) = \sum_{k=1}^{\infty} h(x_k) \cdot \mathbf{P}[X = x_k].$$

Ist dagegen X stetig verteilt mit Dichte f , so gilt

$$\mathbf{E}h(X) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x) \cdot f(x) dx.$$

Mit $h(x) = x$ folgen daraus die bisher eingeführten Berechnungsvorschriften für Erwartungswerte.

Anwendung im Beispiel 4.23: Sei X die zufällige Ankunftszeit an der Ampel. Nach Voraussetzung ist diese auf dem Intervall $[0, 3]$ gleichverteilt. Da die Ampel im Intervall $[0, 1)$ grün und im Intervall $[1, 3]$ rot ist, gilt für die zufällige Wartezeit Z an der Ampel:

$$Z = h(X) \quad \text{mit} \quad h(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } 0 \leq x < 1, \\ 3 - x & \text{für } 1 \leq x \leq 3, \end{cases}$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} \mathbf{E}Z &= \mathbf{E}h(X) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x) \cdot f(x) dx = \int_0^3 h(x) \cdot \frac{1}{3} dx \\ &= \int_1^3 (3 - x) \cdot \frac{1}{3} dx = x - \frac{1}{6}x^2 \Big|_{x=1}^3 = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Beispiel 4.29 Die zufällige Zeit, die eine Internet Suchmaschine bis zum Finden der Antwort auf die Anfrage eines Benutzers benötigt, werde durch eine $\exp(\lambda)$ -verteilte reelle Zufallsvariable X angegeben. Um genügend Zeit für die Präsentation von Werbung zu haben, wird dem Benutzer die Antwort aber grundsätzlich nicht vor Ablauf einer festen Zeit $t > 0$ gegeben, d.h. für die zufällige Zeit Y bis zur Beantwortung der Anfrage des Benutzers gilt

$$Y(\omega) = \max\{X(\omega), t\} \quad (\omega \in \Omega).$$

Wie lange muss der Benutzer dann im Mittel auf die Antwort auf seine Anfrage warten ?

Man erhält:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}Y &= \int_0^{\infty} \max\{x, t\} \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} dx \\
 &= \int_0^t \max\{x, t\} \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} dx + \int_t^{\infty} \max\{x, t\} \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} dx \\
 &= \int_0^t t \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} dx + \int_t^{\infty} x \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} dx \\
 &= -t \cdot e^{-\lambda \cdot x} \Big|_{x=0}^t + (-x) \cdot e^{-\lambda \cdot x} \Big|_{x=t}^{\infty} + \int_t^{\infty} e^{-\lambda \cdot x} dx \\
 &= -t \cdot e^{-\lambda \cdot t} + t - 0 + t \cdot e^{-\lambda \cdot t} - \frac{1}{\lambda} \cdot e^{-\lambda \cdot x} \Big|_{x=t}^{\infty} \\
 &= t + \frac{1}{\lambda} \cdot e^{-\lambda \cdot t}.
 \end{aligned}$$

Beispiel 4.30 Nach erfolgreichen Beenden des Cannstatter Volksfestes beschließt Student S., sich geschäftlich weiterzuentwickeln, und eröffnet einen Weihnachtsbaumgroßhandel. Dazu kauft er von einem Förster 10.000 Weihnachtsbäume, deren Größen rein zufällig zwischen 50cm und 300cm schwanken.

Zur Festlegung der Preise betrachtet er die beiden folgenden Möglichkeiten:

Bei Möglichkeit 1 verlangt er für jeden Baum pro Zentimeter Länge 10 Cent.

Bei Möglichkeit 2 legt er den Preis (in Euro) eines Baumes in Abhängigkeit von der Länge x des Baumes in Zentimeter fest gemäß

$$h(x) = \begin{cases} 6 & \text{für } x \leq 100, \\ 6 + (x - 100) \cdot \frac{24}{150} & \text{für } 100 < x < 250, \\ 30 & \text{für } x \geq 250. \end{cases}$$

Bei welcher der beiden Möglichkeiten ist der mittlere Verkaufserlös höher?

Erstes Preissystems in Beispiel 4.30:

Als Ergebnis des Zufallsexperiments (Festlegung des Preises für den zufällig ausgewählten Baum gemäß 10 Cent pro Zentimeter) erhält man einen Wert, der rein zufällig zwischen 5 Euro und 30 Euro schwankt. Dabei kann jeder Wert zwischen 5 und 30 auftreten, daher kann dieses Zufallsexperiment nicht durch eine diskrete Zufallsvariable beschrieben werden.

Statt dessen verwendet man hierbei eine *stetig verteilte Zufallsvariable mit Dichte*, d.h. man setzt

$$\mathbf{P}[X \in B] = \int_B f(x) dx$$

für $B \subseteq \mathbb{R}$, wobei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ eine Funktion mit $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ ist (sogenannte *Dichte*).

Da hier der Wert von X rein zufällig zwischen 5 und 30 schwanken soll, setzt man

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{30-5} = \frac{1}{25} & \text{für } 5 \leq x \leq 30, \\ 0 & \text{für } x < 5 \text{ oder } x > 30. \end{cases}$$

X ist damit eine auf dem Intervall $[5, 30]$ gleichverteilte Zufallsvariable.

Der mittlere Verkaufserlös ist hier gegeben durch

$$\mathbf{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_5^{30} x \cdot \frac{1}{25} dx = \frac{1}{50} x^2 \Big|_{x=5}^{30} = 17.5$$

Beschreibung des zweiten Preissystems in Beispiel 4.30:

Als Ergebnis des Zufallsexperiments (Festlegung des Preises für den zufällig ausgewählten Baum als Funktion h von der Länge x) erhält man einen Wert, der zwischen 6 Euro und 30 Euro liegt. Dabei kann jeder Wert zwischen 6 und 30 auftreten, daher kann dieses Zufallsexperiment nicht durch eine diskrete Zufallsvariable beschrieben werden. Darüberhinaus ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert 6 auftritt, größer Null, woraus folgt, dass das Zufallsexperiment auch nicht durch eine stetig verteilte Zufallsvariable mit Dichte beschrieben werden kann.

Statt dessen beschreiben wir die zufällige Länge X des Baumes durch eine auf dem Intervall $[50, 300]$ gleichverteilte Zufallsvariable, d.h.

$$\mathbf{P}[X \in B] = \int_B f(x) dx$$

für $B \subseteq \mathbb{R}$, wobei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ gegeben ist gemäß

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{300-50} = \frac{1}{250} & \text{für } 50 \leq x \leq 300, \\ 0 & \text{für } x < 50 \text{ oder } x > 300, \end{cases}$$

und beschreiben dann den Preis eines zufällig ausgewählten Baumes durch $h(X)$, d.h. bei Länge $X(\omega)$ beträgt der Preis $h(X(\omega))$ mit

$$h(x) = \begin{cases} 6 & \text{für } x \leq 100, \\ 6 + (x - 100) \cdot \frac{24}{150} & \text{für } 100 < x < 250, \\ 30 & \text{für } x \geq 250. \end{cases}$$

Für den mittleren Verkaufserlös erhält man hier:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}h(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(x) \cdot f(x) dx \\
 &= \int_{50}^{300} h(x) \cdot \frac{1}{250} dx \\
 &= \int_{50}^{100} 6 \cdot \frac{1}{250} dx + \int_{100}^{250} \left(6 + (x - 100) \cdot \frac{24}{150}\right) \cdot \frac{1}{250} dx + \int_{250}^{300} 30 \cdot \frac{1}{250} dx \\
 &= \frac{6}{250} \cdot x \Big|_{x=50}^{100} + \left(6 \cdot x + \frac{1}{2}(x - 100)^2 \frac{24}{150}\right) \cdot \frac{1}{250} \Big|_{x=100}^{250} + \frac{30}{250} \cdot x \Big|_{x=250}^{300} \\
 &= 18.
 \end{aligned}$$

Also ist der mittlere Verkaufserlös beim zweiten Preissystem höher als beim ersten Preissystem.

Aus der allgemeinen Definition des Erwartungswertes als Integral folgt aufgrund der Linearität des Integrals auch

- $\mathbf{E}(X + Y) = \mathbf{E}X + \mathbf{E}Y$, für beliebige reelle Zufallsvariablen X und Y , sowie
- $\mathbf{E}(\alpha \cdot X) = \alpha \cdot \mathbf{E}X$, für beliebige $\alpha \in \mathbb{R}$ und beliebige reelle Zufallsvariablen X .

Beispiel 4.31 *Zehn perfekten Schützen stehen zehn unschuldige Enten gegenüber. Jeder Schütze wählt zufällig und unbeeinflusst von den anderen Schützen eine Ente aus, auf die er schießt. Wieviele Enten überleben im Mittel ?*

Sei X die zufällige Anzahl der überlebenden Enten. Dann ist X eine diskrete Zufallsvariable die nur Werte in $\{0, \dots, 9\}$ annimmt. Damit erhält man den Erwartungswert von X zu

$$\mathbf{E}X = \sum_{i=0}^9 i \cdot \mathbf{P}[X = i].$$

Problematisch daran ist, dass die Wahrscheinlichkeiten $\mathbf{P}[X = i]$ schwierig bestimmbar sind. Als Ausweg bietet sich die folgende Darstellung von X an:

$$X = \sum_{i=1}^{10} X_i,$$

wobei

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{falls Ente } i \text{ überlebt,} \\ 0 & \text{falls Ente } i \text{ nicht überlebt.} \end{cases}$$

Mit

$$\mathbf{P}[X_i = 1] = \prod_{j=1}^{10} \mathbf{P}[\text{Schütze } j \text{ zieht nicht auf Ente } i] = \left(\frac{9}{10}\right)^{10}$$

folgt

$$\mathbf{E}X_i = 1 \cdot \mathbf{P}[X_i = 1] = \left(\frac{9}{10}\right)^{10},$$

und daraus wiederum

$$\mathbf{E}X = \mathbf{E}\left\{\sum_{i=1}^{10} X_i\right\} = \sum_{i=1}^{10} \mathbf{E}\{X_i\} = 10 \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{10} \approx 3.49.$$

4.6.4 Mathematisch exakte Definition des Erwartungswertes

Im Folgenden wird definiert:

$$\mathbf{E}X = \int_{\Omega} X(\omega) d\mathbf{P}(\omega) \approx \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot \mathbf{P}(\{\omega\}),$$

d.h. der Erwartungswert wird als (geeignet definiertes) Integral eingeführt, das anschaulich der mit den Wahrscheinlichkeiten $\mathbf{P}(\{\omega\})$ gewichteten Summe der Ergebnisse $X(\omega)$ des Zufallsexperiments entspricht.

Zur exakten Definition des obigen Integrals werden die folgenden Begriffe benötigt:

Definition 4.28 (Ω, \mathcal{A}) sei Messraum.

a) Eine Funktion $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ heißt \mathcal{A} - \mathcal{B} -**messbar** (kurz: *messbar*), falls gilt:

$$f^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : f(\omega) \in B\} \in \mathcal{A} \quad \text{für alle } B \in \mathcal{B}.$$

b) Jede Funktion $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot 1_{A_i},$$

wobei $n \in \mathbb{N}$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$, $\{A_1, \dots, A_n\}$ Partition von Ω , heißt **einfache Funktion**.

c) Eine Folge von Funktionen $f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ konvergiert von unten gegen $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, falls gilt:

$$f_1(\omega) \leq f_2(\omega) \leq \dots \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(\omega) = f(\omega) \quad \text{für alle } \omega \in \Omega.$$

Schreibweise dafür: $f_n \uparrow f$.

Definition 4.29 Allgemeine Definition des Maßintegrals.

$(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ sei Maßraum, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ sei messbar.

a) Ist $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot 1_{A_i}$ eine nichtnegative einfache Funktion, so wird definiert:

$$\int f \, d\mu = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \mu(A_i).$$

b) Ist f nichtnegativ einfach, so wird definiert:

$$\int f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu,$$

wobei $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine beliebige Folge nichtnegativer einfacher Funktionen ist mit $f_n \uparrow f$.

Eine solche Folge existiert immer, z.B. kann man wählen:

$$f_n = n \cdot 1_{\{\omega \in \Omega : f(\omega) \geq n\}} + \sum_{k=0}^{n \cdot 2^n - 1} \frac{k}{n} \cdot 1_{\{\omega \in \Omega : \frac{k}{2^n} \leq f(\omega) < \frac{k+1}{2^n}\}}.$$

c) Nimmt f auch negative Werte an, so wird

$$\begin{aligned} f^+(\omega) &= \max\{f(\omega), 0\}, \\ f^-(\omega) &= \max\{-f(\omega), 0\} \end{aligned}$$

gesetzt (so dass gilt: $f(\omega) = f^+(\omega) - f^-(\omega)$, wobei $f^+(\omega) \geq 0$, $f^-(\omega) \geq 0$), und im Falle

$$\int f^+ \, d\mu < \infty \quad \text{oder} \quad \int f^- \, d\mu < \infty$$

wird definiert:

$$\int f \, d\mu = \int f^+ \, d\mu - \int f^- \, d\mu.$$

Schreibweisen:

$$\int f d\mu = \int_{\Omega} f d\mu = \int f(\omega) d\mu(\omega) = \int_{\Omega} f(\omega) d\mu(\omega) = \int f(\omega)\mu(d\omega) = \int_{\Omega} f(\omega)\mu(d\omega)$$

Bemerkung: Das obige Integral ist wohldefiniert, da gilt

(i) Ist

$$f = \sum_{i=1}^n \alpha_i 1_{A_i} = \sum_{j=1}^m \beta_j 1_{B_j}$$

mit $\alpha_i, \beta_j \in \mathbb{R}$, $A_i, B_j \in \mathcal{A}$, $\{A_i : i = 1, \dots, n\}$ und $\{B_j : j = 1, \dots, m\}$ Partitionen von Ω , so gilt

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i) = \sum_{j=1}^m \beta_j \mu(B_j).$$

Begründung: Da $\{B_j : j = 1, \dots, m\}$ Partition von Ω ist, gilt

$$A_i = A_i \cap \Omega = A_i \cap \left(\bigcup_{j=1}^m B_j\right) = \bigcup_{j=1}^m A_i \cap B_j,$$

wobei die Mengen in der letzten Vereinigung paarweise leeren Schnitt haben. Aufgrund der σ -Additivität von \mathbf{P} folgt daraus

$$l.S. = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu\left(\bigcup_{j=1}^m A_i \cap B_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \alpha_i \mu(A_i \cap B_j).$$

Analog erhält man

$$r.S. = \sum_{j=1}^m \beta_j \mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \cap B_j\right) = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \beta_j \mu(A_i \cap B_j).$$

Ist nun $A_i \cap B_j \neq \emptyset$, so folgt durch Wahl von $\omega \in A_i \cap B_j$:

$$f(\omega) = \sum_{k=1}^n \alpha_k 1_{A_k}(\omega) = \alpha_i \quad \text{sowie} \quad f(\omega) = \sum_{k=1}^m \beta_k 1_{B_k}(\omega) = \beta_j,$$

also gilt in diesem Fall $\alpha_i = \beta_j$. Dies impliziert $l.S.=r.S.$, w.z.z.w.

(ii) Man kann darüberhinaus (mit Hilfe eines etwas technischen Beweises) zeigen, dass der Grenzwert in b) existiert und unabhängig von der Wahl der f_n mit $f_n \uparrow f$ ist.

Definition 4.30 *W-Raum* $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ reelle ZV. Dann heißt

$$\mathbf{E}X := \int_{\Omega} X(\omega) d\mathbf{P}(\omega)$$

– sofern existent – der **Erwartungswert** der Zufallsvariablen X .

Einige nützliche Eigenschaften des Integrals werden beschrieben in

Satz 4.7 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ Maßraum, $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ messbar, $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

a)

$$\int (f + g) d\mu = \int f d\mu + \int g d\mu.$$

b)

$$\int (\alpha \cdot f) d\mu = \alpha \cdot \int f d\mu.$$

c)

$$f(\omega) \leq g(\omega) \text{ für alle } \omega \in \Omega \quad \Rightarrow \quad \int f d\mu \leq \int g d\mu.$$

Folgerung: $\mathbf{E}(X_1 + X_2) = \mathbf{E}(X_1) + \mathbf{E}(X_2)$ und $\mathbf{E}(\alpha \cdot X) = \alpha \cdot \mathbf{E}(X)$, wobei $X_1 + X_2$ bzw. $\alpha \cdot X$ die Zufallsvariablen mit Werten $X_1(\omega) + X_2(\omega)$ bzw. $\alpha \cdot X(\omega)$ sind.

Beweis von Satz 4.7:

a) Gemäß der schrittweisen Definition des Integrals erfolgt der Beweis schrittweise für nichtnegative einfache Funktionen, nichtnegative Funktionen und beliebige messbare Funktionen.

Fall 1: f, g nichtnegativ einfach

Sei $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i 1_{A_i}$ und $g = \sum_{j=1}^m \beta_j 1_{B_j}$, mit $A_i, B_j \in \mathcal{A}$ und $\{A_1, \dots, A_n\}$ bzw. $\{B_1, \dots, B_m\}$ seien Partitionen von Ω . Wegen

$$A_i = A_i \cap \Omega = A_i \cap (\cup_{j=1}^m B_j) = \cup_{j=1}^m A_i \cap B_j$$

und $A_i \cap B_1, \dots, A_i \cap B_m$ paarweise disjunkt gilt dann

$$1_{A_i} = \sum_{j=1}^m 1_{A_i \cap B_j},$$

woraus folgt

$$f = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \alpha_i 1_{A_i \cap B_j}.$$

Analog erhält man

$$g = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \beta_j 1_{A_i \cap B_j}.$$

Damit

$$f + g = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\alpha_i + \beta_j) \cdot 1_{A_i \cap B_j}, \quad (4.3)$$

und aus der Definition des Integrals folgt

$$\begin{aligned} \int (f + g) d\mu &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\alpha_i + \beta_j) \cdot \mu(A_i \cap B_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \alpha_i \cdot \mu(A_i \cap B_j) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \beta_j \cdot \mu(A_i \cap B_j) \\ &= \int f d\mu + \int g d\mu. \end{aligned}$$

Fall 2: f, g nichtnegativ

Wähle nichtnegative einfache Funktionen f_n und g_n mit $f_n \uparrow f$ und $g_n \uparrow g$. Dann sind $f_n + g_n$ einfache Funktionen (vgl. (4.3)) mit $f_n + g_n \uparrow f + g$, und aus der Definition des Integrals bzw. des ersten Falles folgt

$$\begin{aligned} \int (f + g) d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int (f_n + g_n) d\mu \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int f_n d\mu + \int g_n d\mu \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu + \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\mu \\ &= \int f d\mu + \int g d\mu. \end{aligned}$$

Fall 3: f, g beliebig

Aus

$$f + g = (f + g)^+ - (f + g)^-$$

und

$$f + g = (f^+ - f^-) + (g^+ - g^-)$$

folgt

$$(f^+ + g^+) + f^- + g^- = f^+ + g^+ + (f + g)^-.$$

Anwendung des Integrals auf beiden Seiten dieser Gleichung und Verwendung des Resultats von Fall 2 ergibt

$$\int (f + g)^+ d\mu + \int f^- d\mu + \int g^- d\mu = \int f^+ d\mu + \int g^+ d\mu + \int (f + g)^- d\mu,$$

woraus folgt

$$\begin{aligned} \int (f + g) d\mu &= \int (f + g)^+ d\mu - \int (f + g)^- d\mu \\ &= \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu + \int g^+ d\mu - \int g^- d\mu \\ &= \int f d\mu + \int g d\mu. \end{aligned}$$

b) Für $\alpha > 0$ folgt die Behauptung analog zu a), für $\alpha = 0$ ist sie trivial. Für $\alpha < 0$ gilt

$$(\alpha \cdot f)^+ = (-\alpha) \cdot f^- \quad \text{und} \quad (\alpha \cdot f)^- = (-\alpha) \cdot f^+.$$

Unter Benutzung des Resultates für den Fall $\alpha > 0$ und der Definition des Integrals folgt daraus

$$\begin{aligned} \int (\alpha \cdot f) d\mu &= \int (\alpha \cdot f)^+ d\mu - \int (\alpha \cdot f)^- d\mu \\ &= (-\alpha) \cdot \left(\int f^- d\mu - \int f^+ d\mu \right) \\ &= \alpha \cdot \int f d\mu. \end{aligned}$$

c) Aus $f(\omega) \leq g(\omega)$ für alle $\omega \in \Omega$ folgt $g(\omega) - f(\omega) \geq 0$ für alle $\omega \in \Omega$. Nach Definition des Integrals ist das Integral im Falle nichtnegativer Funktionen nichtnegativ, was impliziert

$$\int (g - f) d\mu \geq 0.$$

Mit a) und b) folgt

$$\int g d\mu - \int f d\mu = \int (g - f) d\mu \geq 0.$$

□

Die nächsten beiden Sätze bilden die Grundlage zur Berechnung von Erwartungswerten.

Satz 4.8 (*Transformationssatz für Integrale*)

$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ sei ein W-Raum, X sei eine reelle ZV und $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sei messbar. Dann gilt

$$\int_{\Omega} h(X(\omega)) d\mathbf{P}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} h(x) d\mathbf{P}_X(x),$$

wobei \mathbf{P}_X die Verteilung von X ist, d.h.,

$$\mathbf{P}_X(B) = \mathbf{P}(X^{-1}(B)) \quad (B \in \mathcal{B}).$$

Beweis: Gemäß der schrittweisen Definition des Integrals erfolgt der Beweis wieder schrittweise für nichtnegative einfache Funktionen, nichtnegative Funktionen und beliebige messbare Funktionen. Im Folgenden wird die Behauptung nur im Falle h nichtnegativ einfach gezeigt. Der allgemeine Fall folgt daraus analog zum Beweis von Satz 4.7, Teil a).

Sei also $h = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot 1_{A_i}$ nichtnegativ und einfach. Dann gilt

$$\begin{aligned} h(X(\omega)) &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot 1_{A_i}(X(\omega)) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot 1_{X^{-1}(A_i)}(\omega), \end{aligned}$$

und aus der Definition des Integrals und der Verteilung von X folgt:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} h(X(\omega)) d\mathbf{P}(\omega) &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \mathbf{P}(X^{-1}(A_i)) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \mathbf{P}_X(A_i) \\ &= \int_{\mathbb{R}} h(x) d\mathbf{P}_X(x). \end{aligned}$$

□

Satz 4.9 $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ sei W -Raum, X sei reelle Zufallsvariable und $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sei messbar.

a) Ist X eine diskrete Zufallsvariable mit Werten x_1, x_2, \dots , so gilt

$$\int_{\mathbb{R}} g(\omega) d\mathbf{P}_X(\omega) = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) \cdot \mathbf{P}[X = k].$$

b) Ist X eine stetig verteilte Zufallsvariable mit Dichte f , so gilt

$$\int_{\mathbb{R}} g(\omega) d\mathbf{P}_X(\omega) = \int_{\mathbb{R}} g(x) \cdot f(x) dx.$$

Beweis: Gemäß der schrittweisen Definition des Integrals erfolgt der Beweis wieder schrittweise für nichtnegative einfache Funktionen, nichtnegative Funktionen und beliebige messbare Funktionen. Im Folgenden wird die Behauptung nur im Falle $g = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot 1_{A_i}$ gezeigt, der allgemeine Fall folgt daraus analog zum Beweis von Satz 4.7, Teil a).

a) Aus der Definition des Integrals und der Wahl von X folgt:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} g(\omega) d\mathbf{P}_X(\omega) &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \mathbf{P}_X(A_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \sum_{k: x_k \in A_i} \mathbf{P}[X = x_k] \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k: x_k \in A_i} \alpha_i \cdot \mathbf{P}[X = x_k] \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k: x_k \in A_i} g(x_k) \cdot \mathbf{P}[X = x_k] \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) \cdot \mathbf{P}[X = x_k], \end{aligned}$$

wobei für die letzte Gleichheit benutzt wurde, dass $\{A_1, \dots, A_n\}$ eine Partition von \mathbb{R} ist.

b) Aus der Definition des Integrals bzw. der Wahl von X folgt:

$$\begin{aligned}
 \int_{\mathbb{R}} g(\omega) d\mathbf{P}_X(\omega) &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \mathbf{P}_X(A_i) \\
 &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \int_{A_i} f(x) dx \\
 &= \sum_{i=1}^n \int_{A_i} \alpha_i \cdot f(x) dx \\
 &= \sum_{i=1}^n \int_{A_i} g(x) \cdot f(x) dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}} g(x) \cdot f(x) dx
 \end{aligned}$$

wobei für die letzte Gleichheit benutzt wurde, dass $\{A_1, \dots, A_n\}$ eine Partition von \mathbb{R} ist. \square

Korollar 4.1 Sei X eine reelle Zufallsvariable und $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ messbar.

a) Ist X diskrete Zufallsvariable mit Werten x_1, x_2, \dots , so gilt:

$$\mathbf{E}h(X) = \sum_{k=1}^{\infty} h(x_k) \cdot \mathbf{P}[X = x_k],$$

insbesondere (mit $h(x) = x$)

$$\mathbf{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \cdot \mathbf{P}[X = x_k].$$

b) Ist X stetig verteilte Zufallsvariable mit Dichte f , so gilt

$$\mathbf{E}h(X) = \int_{\mathbb{R}} h(x) \cdot f(x) dx,$$

insbesondere (mit $h(x) = x$)

$$\mathbf{E}X = \int_{\mathbb{R}} x \cdot f(x) dx.$$

Beweis: Gemäß der Definition des Erwartungswertes und Satz 4.8 gilt

$$\mathbf{E}h(X) = \int_{\Omega} h(X(\omega)) d\mathbf{P}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} h(x) d\mathbf{P}_X(x).$$

Mit Satz 4.9 folgt daraus die Behauptung. \square

4.7 Varianz

Der Erwartungswert beschreibt den Wert, den man “im Mittel” bei Durchführung eines Zufallsexperiments erhält. In vielen Anwendungen reicht diese Information aber keineswegs aus. Interessiert man sich z.B. für den Kauf einer Aktie, so möchte man nicht nur wissen, was man im Mittel daran verdient. Vielmehr möchte man im Hinblick auf die Beurteilung des Risikos, das man eingeht, unter anderem auch wissen, wie stark der zukünftige Erlös um diesen mittleren Wert schwankt. Ein Kriterium zur Beurteilung der zufälligen Schwankung des Resultats eines Zufallsexperiments ist die sogenannte Varianz, die die mittlere quadratische Abweichung zwischen einem zufälligen Wert und seinem Mittelwert beschreibt:

Definition 4.31 Sei X eine reelle ZV für die $\mathbf{E}X$ existiert. Dann heißt

$$V(X) = \mathbf{E}(|X - \mathbf{E}X|^2)$$

die **Varianz** von X .

Wir illustrieren diesen neu eingeführten Begriff zunächst anhand zweier Beispiele.

Beispiel 4.32 Wir betrachten nochmals das Glücksrad aus Beispiel 4.18. Wie wir in Beispiel 4.32 gezeigt haben, beträgt der Wert des Gewinnes dabei im Mittel 50 Cent. Im Folgenden möchten wir wissen, wie stark der zufällige Gewinn um diesen Wert schwankt. Dazu bestimmen wir die mittlere quadratische Abweichung zwischen zufälligem Gewinn und dem mittleren Gewinn von 50 Cent.

Der mittlere Wert ist hier $\mathbf{E}X = 50$, die tatsächlich auftretenden Werte sind 0, 20, 300 und 2500, damit sind die quadratischen Abweichungen gleich

$$(0 - 50)^2 = 50^2, (20 - 50)^2 = 30^2, (300 - 50)^2 = 250^2, (2500 - 50)^2 = 2450^2.$$

Diese treten mit den Wahrscheinlichkeiten

$$\mathbf{P}[X = 0] = \frac{56}{64}, \mathbf{P}[X = 20] = \frac{5}{64}, \mathbf{P}[X = 300] = \frac{2}{64} \text{ und } \mathbf{P}[X = 2500] = \frac{1}{64}.$$

Als mittlere quadratische Abweichung erhält man damit

$$V(X) = 50^2 \cdot \frac{56}{64} + 30^2 \cdot \frac{5}{64} + 250^2 \cdot \frac{2}{64} + 2450^2 \cdot \frac{1}{64} \approx 98.000$$

(Rechnung in Euro ergibt $\approx 9,8$ Euro²).

Beispiel 4.33 Sei $X \sim N(a, \sigma^2)$ verteilt. Dann gilt $\mathbf{E}X = a$ (vgl. Beispiel 4.28) und

$$V(X) = \mathbf{E}(|X - a|^2) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - a)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx.$$

Mit der Substitution $u = (x - a)/\sigma$ und partieller Integration folgt

$$\begin{aligned} V(X) &= \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} u^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} du \\ &= \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} u \cdot \left(u \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} \right) du \\ &= \sigma^2 \left(u \cdot \frac{-1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} \Big|_{u=-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} du \right) \\ &= \sigma^2(0 + 1) = \sigma^2. \end{aligned}$$

Als nächstes leiten wir einige nützliche Rechenregeln für die Berechnung von Varianzen her:

Satz 4.10 Sei X eine reelle ZV für die $\mathbf{E}X$ existiert. Dann gilt:

a)

$$V(X) = \mathbf{E}(X^2) - (\mathbf{E}X)^2.$$

b) Für alle $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$V(\alpha \cdot X) = \alpha^2 \cdot V(X).$$

c) Für alle $\beta \in \mathbb{R}$:

$$V(X + \beta) = V(X).$$

Beweis:

a) Aufgrund der Linearität des Erwartungswertes gilt:

$$\begin{aligned} V(X) &= \mathbf{E}(|X - \mathbf{E}X|^2) = \mathbf{E}(X^2 - 2 \cdot X \cdot \mathbf{E}(X) + (\mathbf{E}X)^2) \\ &= \mathbf{E}(X^2) - 2 \cdot \mathbf{E}(X) \cdot \mathbf{E}(X) + (\mathbf{E}X)^2 = \mathbf{E}(X^2) - (\mathbf{E}X)^2. \end{aligned}$$

b)

$$V(\alpha \cdot X) = \mathbf{E}(|\alpha \cdot X - \mathbf{E}(\alpha \cdot X)|^2) = \mathbf{E}(\alpha^2 \cdot |X - \mathbf{E}(X)|^2) = \alpha^2 \cdot V(X).$$

c)

$$\begin{aligned}
V(X + \beta) &= \mathbf{E} (|(X + \beta) - \mathbf{E}(X + \beta)|^2) \\
&= \mathbf{E} (|X + \beta - (\mathbf{E}(X) + \beta)|^2) \\
&= \mathbf{E} (|X - \mathbf{E}(X)|^2) = V(X).
\end{aligned}$$

□

Beispiel 4.34 Sei X $\pi(\lambda)$ -verteilt, d.h.

$$\mathbf{P}[X = k] = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} \quad (k \in \mathbb{N}_0).$$

Dann gilt $\mathbf{E}X = \lambda$ (siehe Beispiel 4.26) und

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}(X^2) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot (k-1) \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} + \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} \\
&= \lambda^2 \cdot \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} \cdot e^{-\lambda} + \lambda \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \cdot e^{-\lambda} \\
&= \lambda^2 + \lambda
\end{aligned}$$

und damit

$$V(X) = \mathbf{E}(X^2) - (\mathbf{E}X)^2 = (\lambda^2 + \lambda) - \lambda^2 = \lambda.$$

Der folgende Satz zeigt, dass die Varianz wirklich zur Abschätzung der Abweichung zwischen $X(\omega)$ und $\mathbf{E}X$ verwendet werden kann:**Satz 4.11** Sei X eine reelle ZV für die $\mathbf{E}X$ existiert und sei $\epsilon > 0$ beliebig. Dann gilt:

a)

$$\mathbf{P}[|X| > \epsilon] \leq \frac{\mathbf{E}(|X|^r)}{\epsilon^r} \quad \text{für alle } r \geq 0.$$

(Markovsche Ungleichung)

b)

$$\mathbf{P}[|X - \mathbf{E}X| > \epsilon] \leq \frac{V(X)}{\epsilon^2}.$$

(Tschebyscheffsche Ungleichung)

Beweis:

a) Wir definieren zusätzliche Zufallsvariablen Y und Z wie folgt: $Y(\omega)$ sei 1 falls $|X(\omega)| > \epsilon$ und andernfalls 0,

$$Z(\omega) = \frac{|X(\omega)|^r}{\epsilon^r}.$$

Ist dann $Y(\omega) = 1$, so folgt $Z(\omega) \geq 1 = Y(\omega)$, und ist $Y(\omega) = 0$ so ist $Z(\omega) \geq 0 = Y(\omega)$. Also gilt $Y(\omega) \leq Z(\omega)$ für alle ω , was impliziert $\mathbf{E}Y \leq \mathbf{E}Z$. Mit der Definition des Erwartungswertes folgt:

$$\mathbf{P}[|X| > \epsilon] = \mathbf{E}Y \leq \mathbf{E}Z = \frac{\mathbf{E}(|X|^r)}{\epsilon^r}.$$

b) Setze $Y = (X - \mathbf{E}X)$. Dann folgt aus a) mit $r = 2$:

$$\mathbf{P}[|X - \mathbf{E}X| > \epsilon] = \mathbf{P}[|Y| > \epsilon] \leq \frac{\mathbf{E}(Y^2)}{\epsilon^2} = \frac{V(X)}{\epsilon^2}.$$

□

Als nächstes überlegen wir uns, wie die Varianz einer Summe von Zufallsvariablen mit den Varianzen der einzelnen Zufallsvariablen zusammenhängt. Im Falle von Unabhängigkeit zeigen wir, dass die Varianz der Summe gleich der Summe der Varianzen ist. Ein wichtiges Hilfsmittel dazu ist:

Satz 4.12 Sind X_1, X_2 unabhängige reelle ZVen für die $\mathbf{E}(X_1)$, $\mathbf{E}(X_2)$ und $\mathbf{E}(X_1 \cdot X_2)$ existieren, so gilt:

$$\mathbf{E}(X_1 \cdot X_2) = \mathbf{E}(X_1) \cdot \mathbf{E}(X_2)$$

(ohne Beweis)

Damit können wir zeigen:

Satz 4.13 Sind X_1, X_2 unabhängige reelle ZVen für die $\mathbf{E}(X_1)$, $\mathbf{E}(X_2)$ und $\mathbf{E}(X_1 \cdot X_2)$ existieren, so gilt:

$$V(X_1 + X_2) = V(X_1) + V(X_2)$$

Beweis:

$$\begin{aligned}
 & V(X_1 + X_2) \\
 &= \mathbf{E} \left(|(X_1 - \mathbf{E}X_1) + (X_2 - \mathbf{E}X_2)|^2 \right) \\
 &= \mathbf{E} \left(|X_1 - \mathbf{E}X_1|^2 + |X_2 - \mathbf{E}X_2|^2 + 2 \cdot (X_1 - \mathbf{E}X_1) \cdot (X_2 - \mathbf{E}X_2) \right) \\
 &= \mathbf{E} \left(|X_1 - \mathbf{E}X_1|^2 \right) + \mathbf{E} \left(|X_2 - \mathbf{E}X_2|^2 \right) + 2 \cdot \mathbf{E} \left((X_1 - \mathbf{E}X_1) \cdot (X_2 - \mathbf{E}X_2) \right).
 \end{aligned}$$

Die Behauptung folgt aus

$$\begin{aligned}
 & \mathbf{E} \left((X_1 - \mathbf{E}X_1) \cdot (X_2 - \mathbf{E}X_2) \right) \\
 &= \mathbf{E} \left(X_1 X_2 - X_1 \mathbf{E}(X_2) - X_2 \mathbf{E}(X_1) + \mathbf{E}(X_1) \cdot \mathbf{E}(X_2) \right) \\
 &= \mathbf{E}(X_1 \cdot X_2) - \mathbf{E}(X_1) \cdot \mathbf{E}(X_2) - \mathbf{E}(X_2) \mathbf{E}(X_1) + \mathbf{E}(X_1) \cdot \mathbf{E}(X_2) \\
 &= \mathbf{E}(X_1 \cdot X_2) - \mathbf{E}(X_1) \cdot \mathbf{E}(X_2) \\
 &= 0,
 \end{aligned}$$

wobei bei der letzten Gleichheit Satz 4.12 verwendet wurde. \square

Bemerkung: Der letzte Satz gilt analog auch für beliebige endliche Summen unabhängiger Zufallsvariablen. Sind nämlich X_1, \dots, X_n unabhängige reelle Zufallsvariablen, für die $\mathbf{E}X_i$ und $\mathbf{E}(X_i \cdot X_j)$ existieren, so gilt:

$$\begin{aligned}
 V \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) &= \mathbf{E} \left(\left| \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbf{E}X_i) \right|^2 \right) \\
 &= \mathbf{E} \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbf{E}X_i)^2 + \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} (X_i - \mathbf{E}X_i) \cdot (X_j - \mathbf{E}X_j) \right) \\
 &= \sum_{i=1}^n \mathbf{E} \left((X_i - \mathbf{E}X_i)^2 \right) + \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} \mathbf{E} \left((X_i - \mathbf{E}X_i) \cdot (X_j - \mathbf{E}X_j) \right) \\
 &= \sum_{i=1}^n V(X_i) + \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} 0 \\
 &= \sum_{i=1}^n V(X_i).
 \end{aligned}$$

4.8 Gesetze der großen Zahlen

Beispiel 4.35 *Wir betrachten das wiederholte Drehen am Glücksrad aus Beispiel 4.18.*

Ist der im Durchschnitt ausgezahlte Gewinn wirklich durch $\mathbf{E}X$ gegeben ?

Es sei X_i der beim i -ten mal ausgezahlte Gewinn. Dann wird bei n -maligem Drehen im Durchschnitt der Gewinn

$$\frac{1}{n} \cdot (X_1 + \dots + X_n)$$

ausgezahlt. Dieser beträgt im Mittel

$$\mathbf{E} \left\{ \frac{1}{n} \cdot (X_1 + \dots + X_n) \right\} = \frac{1}{n} \cdot (\mathbf{E}X_1 + \dots + \mathbf{E}X_n) = \mathbf{E}X_1 = 50,$$

die mittlere quadratische Abweichung ist (da die einzelnen Auszahlungen unbeeinflusst voneinander erfolgen) gegeben durch

$$\begin{aligned} V \left(\frac{1}{n} \cdot (X_1 + \dots + X_n) \right) &= \frac{1}{n^2} V(X_1 + \dots + X_n) \\ &= \frac{1}{n^2} (V(X_1) + \dots + V(X_n)) \\ &= \frac{1}{n} V(X_1). \end{aligned}$$

Mit der Ungleichung von Tschebyscheff folgt daraus:

$$\begin{aligned} \mathbf{P} \left\{ \left| \frac{1}{n} \cdot (X_1 + \dots + X_n) - 50 \right| > \epsilon \right\} &\leq \frac{V \left(\frac{1}{n} \cdot (X_1 + \dots + X_n) \right)}{\epsilon^2} \\ &= \frac{\frac{1}{n} V(X_1)}{\epsilon^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

Es folgt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass im Durchschnitt etwas mehr oder etwas weniger als 50 Cent ausgezahlt wird, für n (=Anzahl Drehen) groß beliebig klein wird.

Im Folgenden interessieren wir uns für asymptotische Aussagen über Summen $\sum_{i=1}^n X_i$ unabhängiger Zufallsvariablen für große Werte von n . Zur Abkürzung der Schreibweise ist dabei die folgende Definition nützlich:

Definition 4.32 Zufallsvariablen X_1, \dots, X_n heißen **identisch verteilt**, falls gilt:

$$\mathbf{P}_{X_1} = \dots = \mathbf{P}_{X_n}.$$

Eine Folge $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$ von Zufallsvariablen heißt **identisch verteilt**, falls gilt: $\mathbf{P}_{X_1} = \mathbf{P}_{X_2} = \dots$

Der nächste Satz verallgemeinert Beispiel 4.35.

Satz 4.14 (Schwaches Gesetz der großen Zahlen).

X_1, X_2, \dots seien unabhängige identisch verteilte reelle Zufallsvariablen mit existierendem Erwartungswert $\mu = \mathbf{E}X_1$. Dann gilt für jedes $\epsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P} \left[\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| > \epsilon \right] = 0,$$

d.h.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P} \left(\left\{ \omega \in \Omega : \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i(\omega) - \mu \right| > \epsilon \right\} \right) = 0.$$

Beweis im Spezialfall $V(X_1) < \infty$:

Mit der Ungleichung von Tschebyscheff folgt:

$$\mathbf{P} \left[\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| > \epsilon \right] \leq \frac{\mathbf{E}(X^2)}{\epsilon^2},$$

wobei

$$X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu.$$

Wegen $\mathbf{E}X = 0$, der Unabhängigkeit von X_1, \dots, X_n und der identischen Verteiltheit von X_1, \dots, X_n gilt:

$$\mathbf{E}(X^2) = V(X) = \frac{1}{n^2} V \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(X_i) = \frac{V(X_1)}{n}.$$

Damit erhält man

$$\mathbf{P} \left[\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| > \epsilon \right] \leq \frac{V(X_1)}{n \cdot \epsilon^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

□

Darüberhinaus gilt:

Satz 4.15 (Starkes Gesetz der großen Zahlen von Kolmogoroff).

X_1, X_2, \dots seien unabhängige identisch verteilte reelle Zufallsvariablen mit existierendem Erwartungswert $\mu = \mathbf{E}X_1$. Dann gilt

$$\mathbf{P} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \mu \right] = 1,$$

d.h.

$$\mathbf{P} \left(\left\{ \omega \in \Omega : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i(\omega) = \mu \right\} \right) = 1.$$

(ohne Beweis)

Bemerkung: Die Behauptung des obigen Satzes läßt sich umformulieren zu

$$\mathbf{P} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \not\rightarrow \mu (n \rightarrow \infty) \right] := \mathbf{P} \left(\left\{ \omega \in \Omega : \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i(\omega) \not\rightarrow \mu (n \rightarrow \infty) \right\} \right) = 0.$$

Man sagt, dass eine Folge von Zufallsvariablen Y_n *fast sicher gegen eine ZV Y konvergiert* (Schreibweise: $Y_n \rightarrow Y$ f.s.), falls gilt:

$$\mathbf{P} [Y_n \not\rightarrow Y (n \rightarrow \infty)] := \mathbf{P} (\{\omega \in \Omega : Y_n(\omega) \not\rightarrow Y(\omega) (n \rightarrow \infty)\}) = 0.$$

In diesem Sinne konvergiert also im obigen Satz $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ fast sicher gegen μ .

Mit der Konvergenz fast sicher kann man rechnen wie mit der Konvergenz von Zahlenfolgen. Z.B. folgt aus $X_n \rightarrow X$ f.s. und $Y_n \rightarrow Y$ f.s., dass für beliebige $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt

$$\alpha \cdot X_n + \beta \cdot Y_n \rightarrow \alpha \cdot X + \beta \cdot Y \quad f.s.$$

Zum Beweis beachte man

$$\begin{aligned} & \mathbf{P} [\alpha \cdot X_n + \beta \cdot Y_n \not\rightarrow \alpha \cdot X + \beta \cdot Y (n \rightarrow \infty)] \\ & \leq \mathbf{P} [X_n \not\rightarrow X (n \rightarrow \infty)] + \mathbf{P} [Y_n \not\rightarrow Y (n \rightarrow \infty)] \\ & = 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

4.9 Der zentrale Grenzwertsatz

Beispiel 4.36 Bei einer Abstimmung über zwei Vorschläge A und B stimmt eine resolute Gruppe von $r = 3.000$ Personen für A , während sich weitere $n = 1.000.000$ Personen unabhängig voneinander rein zufällig entscheiden. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit p , dass A angenommen wird ?

Zur Modellierung des Abstimmungsverhalten im obigen Beispiel betrachten wir unabhängige Zufallsvariablen X_1, \dots, X_n mit

$$\mathbf{P}[X_i = 0] = \mathbf{P}[X_i = 1] = \frac{1}{2} \quad (i = 1, \dots, n).$$

Hierbei bedeutet $X_i = 1$, dass die i -te Person für A stimmt, während $X_i = 0$ bedeutet, dass die i -te Person für B stimmt. Dann ist die Anzahl der Stimmen für A gleich

$$\sum_{i=1}^n X_i + r,$$

während die Anzahl der Stimmen für B gegeben ist durch

$$\sum_{i=1}^n (1 - X_i) = n - \sum_{i=1}^n X_i,$$

und gefragt ist nach der Wahrscheinlichkeit

$$p = \mathbf{P} \left[\sum_{i=1}^n X_i + r > n - \sum_{i=1}^n X_i \right].$$

Diese lässt sich wie folgt umformen:

$$\begin{aligned} p &= \mathbf{P} \left[\sum_{i=1}^n X_i + r > n - \sum_{i=1}^n X_i \right] \\ &= \mathbf{P} \left[2 \sum_{i=1}^n X_i > n - r \right] \\ &= \mathbf{P} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{2} > -\frac{r}{2n} \right]. \end{aligned}$$

Die obige Wahrscheinlichkeit kann approximativ bestimmt werden mit

Satz 4.16 (Zentraler Grenzwertsatz von Lindeberg–Lévy).

Seien X_1, X_2, \dots unabhängige identisch verteilte reelle Zufallsvariablen mit $\mathbf{E}(X_1^2) < \infty$. Setze

$$\mu = \mathbf{E}X_1 \quad \text{und} \quad \sigma^2 = V(X_1).$$

Dann gilt, dass die Verteilungsfunktion von

$$\frac{1}{\sqrt{V(\sum_{i=1}^n X_i)}} \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbf{E}X_i) = \frac{1}{\sqrt{n}\sigma} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)$$

punktweise gegen die Verteilungsfunktion Φ einer $N(0, 1)$ -verteilten ZV konvergiert, d.h., dass für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P} \left[\frac{1}{\sqrt{n}\sigma} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) \leq x \right] = \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt.$$

(ohne Beweis)

Sprechweise: $\frac{1}{\sqrt{n}\sigma} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)$ konvergiert nach Verteilung gegen eine $N(0, 1)$ -verteilte ZV.

Bemerkungen:

a) Die Aussage des obigen Satzes lässt sich wie folgt leicht merken: Betrachtet wird eine Summe unabhängiger identisch verteilter Zufallsvariablen. Gemäß obigem Satz lässt sich diese asymptotisch durch eine Normalverteilung approximieren. Dazu renormalisiert man diese Summe so, dass sie Erwartungswert Null und Varianz Eins hat, d.h., man ersetzt $\sum_{i=1}^n X_i$ durch

$$\frac{1}{\sqrt{V(\sum_{i=1}^n X_i)}} \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbf{E}X_i).$$

Anschließend kann man die Werte der Verteilungsfunktion der obigen normalisierten Summe durch die einer $N(0, 1)$ -Verteilung approximativ berechnen.

b) Aus obigem Satz folgt für $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$:

$$\begin{aligned} & \mathbf{P} \left[\alpha < \frac{1}{\sqrt{n}\sigma} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) \leq \beta \right] \\ &= \mathbf{P} \left[\frac{1}{\sqrt{n}\sigma} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) \leq \beta \right] - \mathbf{P} \left[\frac{1}{\sqrt{n}\sigma} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) \leq \alpha \right] \\ &\stackrel{(n \rightarrow \infty)}{\rightarrow} \Phi(\beta) - \Phi(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\alpha}^{\beta} e^{-t^2/2} dt. \end{aligned}$$

Anwendung im Beispiel 4.36:

Seien X_1, \dots, X_n unabhängige Zufallsvariablen mit

$$\mathbf{P}[X_i = 0] = \mathbf{P}[X_i = 1] = \frac{1}{2} \quad (i = 1, \dots, n).$$

Dann gilt

$$\mathbf{E}X_1 = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$\mathbf{E}(X_1^2) = 0^2 \cdot \frac{1}{2} + 1^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

und

$$V(X_1) = \mathbf{E}(X_1^2) - (\mathbf{E}X_1)^2 = \frac{1}{4}.$$

Damit

$$\begin{aligned}
 p &= \mathbf{P} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{2} > -\frac{r}{2n} \right] \\
 &= \mathbf{P} \left[\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{V(X_1)}} \sum_{i=1}^n \left(X_i - \frac{1}{2} \right) > -\frac{r}{2\sqrt{n}\sqrt{V(X_1)}} \right] \\
 &= 1 - \mathbf{P} \left[\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{V(X_1)}} \sum_{i=1}^n \left(X_i - \frac{1}{2} \right) \leq -\frac{r}{2\sqrt{n}\sqrt{V(X_1)}} \right] \\
 &\approx 1 - \Phi \left(-\frac{r}{2\sqrt{n}\sqrt{V(X_1)}} \right) \\
 &= 1 - \Phi \left(-\frac{3000}{2 \cdot 1000 \cdot \frac{1}{2}} \right) \\
 &= 1 - \Phi(-3) = \Phi(3) \approx 0,9986.
 \end{aligned}$$

Beispiel 4.37 Ein Flugunternehmen weiß aus Erfahrung, dass im Mittel 7% derjenigen Personen, die ein Flugticket erworben haben, nicht bzw. zu spät zum Abflug erscheinen. Um die Zahl der somit ungenutzten Plätze nicht zu groß werden zu lassen, werden daher für einen Flug, bei dem 240 Plätze zu Verfügung stehen, mehr als 240 Flugtickets verkauft.

Wieviele Flugscheine dürfen höchstens verkauft werden, dass mit Wahrscheinlichkeit mindestens 0.99 alle zum Abflug erschienenen Personen, die ein Flugticket haben, auch einen Platz im Flugzeug bekommen ?

Zur stochastischen Modellierung des obigen Beispiels betrachten wir unabhängige $b(1, p)$ -verteilte Zufallsvariablen X_1, \dots, X_n . Dabei gelte $X_i = 1$ genau dann, falls die Person, die das i -te Flugticket gekauft hat, (rechtzeitig) zum Abflug erscheint. $p = 1 - 0.07 = 0.93$ ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Käufer des i -ten Flugtickets (rechtzeitig) zum Abflug erscheint, und n ist die Anzahl der verkauften Flugtickets.

Dann gibt $\sum_{i=1}^n X_i$ die Anzahl der zum Abflug erschienenen Personen, die ein Flugticket haben, an, und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle zum Abflug erschienenen Personen, die ein Flugticket haben, auch einen Platz im Flugzeug

bekommen, gegeben gemäß:

$$\mathbf{P} \left[\sum_{i=1}^n X_i \leq 240 \right].$$

Gesucht ist das größte $n \in \mathbb{N}$ mit

$$\mathbf{P} \left[\sum_{i=1}^n X_i \leq 240 \right] \geq 0.99.$$

Es gilt:

$$\begin{aligned} & \mathbf{P} \left[\sum_{i=1}^n X_i \leq 240 \right] \\ &= \mathbf{P} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbf{E}X_1) \leq 240 - n \cdot \mathbf{E}X_1 \right] \\ &= \mathbf{P} \left[\frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{\sqrt{V(X_1)}} \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbf{E}X_1) \leq \frac{240 - n \cdot \mathbf{E}X_1}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{V(X_1)}} \right]. \end{aligned}$$

Nach dem Zentralen Grenzwertsatz stimmt die letzte Wahrscheinlichkeit approximativ mit

$$\Phi \left(\frac{240 - n \cdot \mathbf{E}X_1}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{V(X_1)}} \right)$$

überein, wobei Φ die Verteilungsfunktion der $N(0, 1)$ -Verteilung ist.

Mit

$$\mathbf{E}X_1 = p, \quad V(X_1) = p(1-p) \quad \text{und} \quad p = 0.93$$

folgt, dass die obige Bedingung approximativ äquivalent ist zu

$$\Phi \left(\frac{240 - n \cdot p}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{p \cdot (1-p)}} \right) \geq 0.99.$$

Wegen $\Phi(2.4) \approx 0.99$ ist die äquivalent zu

$$\frac{240 - n \cdot p}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{p \cdot (1-p)}} \geq 2.4$$

Quadrieren der letzten Gleichung liefert die notwendige Bedingung

$$\frac{(240 - n \cdot p)^2}{n \cdot p \cdot (1-p)} \geq 2.4^2$$

Diese impliziert aber nur dann die vorige Bedingung, wenn gleichzeitig

$$240 - n \cdot p \geq 0, \text{ d.h. } n \leq \frac{240}{p} = \frac{240}{0.93} \approx 258.1 \quad (4.4)$$

gilt.

Gilt dies, so führt die obige Bedingung auf

$$(240 - n \cdot p)^2 \geq 2.4^2 n \cdot p \cdot (1 - p)$$

bzw. auf

$$240^2 - (480p + 2.4^2 p \cdot (1 - p)) \cdot n + p^2 n^2 \geq 0.$$

Bestimmt man die Nullstellen des quadratischen Polynoms auf der linken Seite, so erhält man

$$n_1 \approx 247.7 \text{ und } n_2 \approx 268.8$$

Also ist die obige Ungleichung erfüllt für $n \leq 247$ oder $n \geq 269$.

Unter Berücksichtigung von $n \leq 258.1$ (vgl. (4.4)) erhält man als Resultat:

Es dürfen höchstens 247 Flugtickets verkauft werden, damit mit Wahrscheinlichkeit ≥ 0.99 nicht zu viele Passagiere beim Abflug erscheinen.

Kapitel 5

Induktive Statistik

5.1 Einführung

Aufgabenstellung der *induktiven* (oder auch *schließenden*) *Statistik* ist es, aufgrund von Beobachtungen eines zufälligen Vorgangs Rückschlüsse auf die zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeiten, d.h. auf Eigenschaften des zugrundeliegenden W -Raumes, zu ziehen. Die verschiedenen Arten der dabei auftretenden Fragestellungen werden anhand des folgenden Beispiels erläutert.

Beispiel 5.1 *Ein Produzent stellt Sicherungen her. Beim Produktionsprozess lässt es sich nicht vermeiden, dass einige der produzierten Sicherungen defekt sind. Wie kann man feststellen, wie groß der Ausschussanteil $p \in [0, 1]$ ist ?*

Im Prinzip ist das keine stochastische Fragestellung. Man kann z.B. soviele Sicherungen herstellen, wie man insgesamt herstellen möchte, dann alle testen, ob sie defekt sind oder nicht, und kann daraus den relativen Anteil der defekten Sicherungen genau bestimmen. Dies ist aber aus zweierlei Gründen nicht sinnvoll: Zum einen ist das Testen aller Sicherungen sehr aufwendig, zum anderen könnte das Ergebnis sein, dass sehr viele defekt sind, so dass man eine große Zahl defekter Sicherungen hergestellt hätte. Wünschenswert wäre, das schon früher festzustellen, um dann noch Einfluss auf den Produktionsprozess nehmen zu können.

Eine naheliegende Idee ist, nur eine kleine Menge von Sicherungen zu testen, und daraus Rückschlüsse zu ziehen auf den Ausschussanteil in einer großen Menge von Sicherungen, die später nach der gleichen Methode hergestellt werden. Dazu

entnimmt man der laufenden Produktion n Sicherungen und setzt

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{falls die } i\text{-te Sicherung defekt ist,} \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases}$$

für $i = 1, \dots, n$. Man versucht dann, ausgehend von $(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n$ Rückschlüsse auf p zu ziehen.

Der gesamte Vorgang kann stochastisch wie folgt modelliert werden: Man fasst die x_1, \dots, x_n als Realisierungen (d.h. als beobachtete Werte) von Zufallsvariablen X_1, \dots, X_n mit

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{falls die } i\text{-te Sicherung defekt ist,} \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases}$$

auf, wobei diese ZVen unabhängig identisch verteilt sind mit

$$\mathbf{P}[X_1 = 1] = p, \quad \mathbf{P}[X_1 = 0] = 1 - p. \quad (5.1)$$

x_1, \dots, x_n wird dann als *Stichprobe* der Verteilung von X_1 bezeichnet.

In diesem Modell beschäftigt man sich mit den folgenden drei Fragestellungen:

Fragestellung 1: *Wie kann man ausgehend von $(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n$ den Wert von p schätzen?*

Gesucht ist hier eine Funktion $T_n : \{0, 1\}^n \rightarrow [0, 1]$, für die $T_n(x_1, \dots, x_n)$ eine "möglichst gute" Schätzung von p ist. Hierbei wird $T_n : \{0, 1\}^n \rightarrow [0, 1]$ als *Schätzfunktion* und $T_n(X_1, \dots, X_n)$ als *Schätzstatistik* bezeichnet.

Beachtet man, dass $p = \mathbf{E}X_1$ gilt, so ist

$$T_n(x_1, \dots, x_n) = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

eine naheliegende Schätzung von p . Diese hat die folgenden beiden Eigenschaften:

- Nach dem starken Gesetz der großen Zahlen gilt

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \rightarrow \mathbf{E}X_1 = p \quad (n \rightarrow \infty) \quad f.s.,$$

d.h. für großen Stichprobenumfang n nähert sich der geschätzte Wert mit Wahrscheinlichkeit Eins immer mehr dem "richtigen" Wert an.

Man bezeichnet T_n daher als *stark konsistente Schätzung für p* .

- Weiter gilt

$$\mathbf{E}T_n(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{E}X_i = \mathbf{E}X_1 = p,$$

d.h. für festen Stichprobenumfang n ergibt sich im Mittel der “richtige” Wert, so dass der “richtige” Wert durch $T_n(x_1, \dots, x_n)$ weder systematisch über- noch unterschätzt wird. Schätzfunktionen mit dieser Eigenschaft werden als *erwartungstreue* Schätzfunktionen bezeichnet.

Fragestellung 2: *Wie kann man ausgehend von $(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n$ ein (möglichst kleines) Intervall angeben, in dem p mit (möglichst großer) Wahrscheinlichkeit liegt ?*

Hierbei möchte man x_1, \dots, x_n zur Konstruktion eines Intervalls

$$[U(x_1, \dots, x_n), O(x_1, \dots, x_n)] \subseteq \mathbb{R}$$

verwenden, in dem der wahre Wert p mit möglichst großer Wahrscheinlichkeit liegt.

$[U(X_1, \dots, X_n), O(X_1, \dots, X_n)]$ heißt *Konfidenzintervall* zum *Konfidenzniveau* $1 - \alpha$, falls gilt

$$\mathbf{P}[p \in [U(X_1, \dots, X_n), O(X_1, \dots, X_n)]] \geq 1 - \alpha$$

für alle $p \in [0, 1]$. Aufgrund von (5.1) hängen die bei der Berechnung der obigen Wahrscheinlichkeit verwendeten Zufallsvariablen von p ab.

Häufig wird hier $\alpha = 0.05$ bzw. $\alpha = 0.01$ gewählt, d.h. man fordert, dass der wahre Wert p mit Wahrscheinlichkeit $1 - \alpha = 0.95$ bzw. $1 - \alpha = 0.99$ im Konfidenzintervall liegt.

Fragestellung 3: *Wie kann man ausgehend von $(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n$ feststellen, ob der wahre Ausschussanteil p einen gewissen Wert p_0 überschreitet ?*

Hierbei möchte man zwischen zwei *Hypothesen*

$$H_0 : p \leq p_0 \quad \text{und} \quad H_1 : p > p_0$$

entscheiden. Ein *statistischer Test* dazu wird festgelegt durch Angabe eines *Ablehnungsbereichs* $K \subseteq \{0, 1\}^n$ für H_0 : Man lehnt H_0 ab, falls $(x_1, \dots, x_n) \in K$, und man lehnt H_0 nicht ab, falls $(x_1, \dots, x_n) \notin K$.

5.2 Punktschätzverfahren

Im Folgenden werden Verfahren vorgestellt, mit deren Hilfe man ausgehend von einer Stichprobe einer unbekanntem Verteilung Kennzahlen (wie z.B. Erwartungswert oder Varianz) sowie Parameter eines angenommenen Verteilungsmodells (wie z.B. den Parameter λ der Exponentialverteilung) schätzen kann.

Ausgangspunkt sind Realisierungen $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ von unabhängigen identisch verteilten reellen ZVen X_1, \dots, X_n . x_1, \dots, x_n wird als *Stichprobe* der Verteilung von X_1 bezeichnet. Die Verteilung \mathbf{P}_{X_1} von X_1 sei unbekannt, es sei aber bekannt, dass diese aus einer vorgegebenen Klasse

$$\{w_\theta : \theta \in \Theta\}$$

von Verteilungen stammt.

Beispiel 5.2 Gegeben sei eine Stichprobe einer Normalverteilung mit unbekanntem Erwartungswert und unbekannter Varianz. In diesem Fall ist $\Theta = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$, und für $\theta = (\mu, \sigma) \in \Theta$ ist w_θ die Normalverteilung mit Erwartungswert μ und Varianz σ^2 .

Es sei g eine Funktion $g : \Theta \rightarrow \mathbb{R}$. Gesucht ist eine **Schätzfunktion** $T_n : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, mit deren Hilfe man ausgehend von der Stichprobe x_1, \dots, x_n den unbekanntem Wert $g(\theta)$ durch $T_n(x_1, \dots, x_n)$ schätzen kann.

Fortsetzung von Beispiel 5.2: Interessiert man sich in Beispiel 5.2 für die Varianz der unbekanntem Verteilung, so ist $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $g(\mu, \sigma) = \sigma^2$.

Definition 5.1 a) T_n heißt **erwartungstreue Schätzung** von $g(\theta)$, falls für alle $\theta \in \Theta$ gilt:

$$\mathbf{E}_\theta T_n(X_1, \dots, X_n) = g(\theta).$$

Dabei seien bei der Bildung des Erwartungswertes \mathbf{E}_θ die ZVen X_1, \dots, X_n unabhängig identisch verteilt mit $\mathbf{P}_{X_1} = w_\theta$.

b) Eine Folge von Schätzfunktionen T_n heißt **stark konsistente Schätzung** von $g(\theta)$, falls für alle $\theta \in \Theta$ gilt:

$$\mathbf{P}_\theta \left[\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(X_1, \dots, X_n) \neq g(\theta) \right] = 0.$$

Dabei seien bei der Bildung der Wahrscheinlichkeit \mathbf{P}_θ die ZVen X_1, X_2, \dots wieder unabhängig identisch verteilt mit $\mathbf{P}_{X_1} = w_\theta$.

Wir betrachten nun zunächst die Schätzung von Kennzahlen der zugrunde liegenden Verteilung wie z.B. Erwartungswert und Varianz.

Beispiel 5.3 *Wie schätzt man den Erwartungswert einer unbekanntem Verteilung ?*

Die Schätzung

$$T_n(x_1, \dots, x_n) = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

ist erwartungstreu, da

$$\mathbf{E}T_n(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{E}X_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{E}X_1 = \mathbf{E}X_1.$$

Sie ist stark konsistent, da nach dem starken Gesetz der großen Zahlen gilt

$$T_n(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \rightarrow \mathbf{E}X_1 \quad (n \rightarrow \infty) \quad f.s.$$

Beispiel 5.4 *Wie schätzt man die Varianz einer unbekanntem Verteilung ?*

Die Idee bei der Konstruktion einer Schätzung von

$$V(X_1) = \mathbf{E}[(X_1 - \mathbf{E}X_1)^2]$$

ist zunächst den Erwartungswert von $(X_1 - \mathbf{E}X_1)^2$ wie oben durch

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbf{E}X_1)^2$$

zu schätzen, und dann für den darin auftretenden Wert $\mathbf{E}X_1$ die Schätzung von oben zu verwenden. Dies führt auf

$$\bar{T}_n(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{mit} \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

\bar{T}_n ist stark konsistent, da nach dem starken Gesetz der großen Zahlen gilt

$$\begin{aligned}
 \bar{T}_n(X_1, \dots, X_n) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2 \cdot \bar{X} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \bar{X}^2 \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2 \cdot \bar{X} \cdot \bar{X} + \bar{X}^2 \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right)^2 \\
 &\rightarrow \mathbf{E}(X_1^2) - (\mathbf{E}X_1)^2 = V(X_1) \quad (n \rightarrow \infty) \quad f.s.
 \end{aligned}$$

\bar{T}_n ist aber nicht erwartungstreu, da

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}\bar{T}_n(X_1, \dots, X_n) &= \mathbf{E} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right)^2 \right) \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{E}X_i^2 - \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbf{E}(X_i X_j) \\
 &= \mathbf{E}X_1^2 - \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \mathbf{E}(X_i X_i) - \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, \dots, n, j \neq i} \mathbf{E}(X_i X_j) \\
 &= \mathbf{E}X_1^2 - \frac{n}{n^2} \mathbf{E}(X_1^2) - \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, \dots, n, j \neq i} \mathbf{E}(X_i) \cdot \mathbf{E}(X_j) \\
 &\hspace{15em} (\text{vergleiche Satz 4.12}) \\
 &= \left(1 - \frac{1}{n} \right) \mathbf{E}X_1^2 - \left(1 - \frac{1}{n} \right) (\mathbf{E}X_1)^2 \\
 &= \frac{n-1}{n} \cdot V(X_1).
 \end{aligned}$$

Aus obigem folgt aber, dass die Schätzung

$$\tilde{T}_n(x_1, \dots, x_n) = \frac{n}{n-1} \cdot \bar{T}_n(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{mit} \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

stark konsistent und erwartungstreu ist.

Als nächstes wird eine systematische Methode zur Konstruktion von Schätzfunktionen spezifischer Parameter eines angenommenen Verteilungsmodells vorgestellt.

X_1, \dots, X_n seien unabhängige identisch verteilte reelle ZVen.

Fall 1: X_1 sei eine diskrete Zufallsvariable mit Werten z_1, z_2, \dots . Die Verteilung von X_1 sei w_θ , wobei $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^l$ gelte.

Geschätzt werden soll θ aufgrund einer Realisierung x_1, \dots, x_n von X_1, \dots, X_n .

Beispiel 5.5 Eine Supermarktkette interessiert sich für die (zufällige) Zahl der Kunden, die in einer Niederlassung während der Mittagszeit (d.h. zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr) einkaufen.

Geht man davon aus, dass im Einzugsbereich des Supermarktes insgesamt n Kunden leben, die sich unbeeinflusst voneinander mit Wahrscheinlichkeit $p \in (0, 1)$ entscheiden, um die Mittagszeit einzukaufen, so ist es naheliegend, die zufällige Zahl von Kunden durch eine Binomialverteilung mit Parametern n und p zu modellieren. Da n hier eher groß sein wird, bietet es sich an, diese Binomialverteilung durch eine Poisson-Verteilung mit Parameter $\theta = n \cdot p$ zu approximieren (vgl. Lemma 4.4). Daher wird im Folgenden angenommen, dass die zufällige Zahl X von Kunden während der Mittagszeit $\pi(\theta)$ -verteilt ist, d.h. dass gilt

$$\mathbf{P}[X = k] = \frac{\theta^k}{k!} \cdot e^{-\theta} \quad (k \in \mathbb{N}_0).$$

In den vergangenen $n = 5$ Tagen kamen während der Mittagszeit $x_1 = 10$, $x_2 = 25$, $x_3 = 3$, $x_4 = 15$ und $x_5 = 7$ Kunden.

Wie schätzt man ausgehend von dieser Stichprobe den Wert von θ ?

In Beispiel 5.5 ist X_1 eine diskrete Zufallsvariable mit Werten $0, 1, 2, \dots$, für $\theta \in \Theta$ ist die Verteilung von X_1 eine $\pi(\theta)$ -Verteilung, d.h.,

$$\mathbf{P}[X_1 = k] = w_\theta(\{k\}) = \frac{\theta^k}{k!} \cdot e^{-\theta}.$$

Geschätzt werden soll θ ausgehend von x_1, \dots, x_n .

Für jeden festen Wert von θ kann man die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass gerade x_1, \dots, x_n als Realisierungen von X_1, \dots, X_n auftreten, falls diese Zufalls-

variablen wirklich die Verteilung haben. Die Idee beim **Maximum-Likelihood-Prinzip** ist, als Schätzer für θ denjenigen Wert zu nehmen, bei dem die Wahrscheinlichkeit, dass gerade die beobachteten x_1, \dots, x_n als Realisierung der Zufallsvariablen X_1, \dots, X_n auftreten, maximal ist, d.h. bei dem

$$\mathbf{P}_\theta [X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n]$$

maximal ist.

Unter Ausnützung der Unabhängigkeit der ZVen X_1, \dots, X_n lässt sich die obige Wahrscheinlichkeit umschreiben zu

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_\theta [X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n] &= \mathbf{P}_\theta [X_1 = x_1] \cdot \dots \cdot \mathbf{P}_\theta [X_n = x_n] \\ &= \prod_{i=1}^n w_\theta(\{x_i\}) \\ &=: L(\theta; x_1, \dots, x_n). \end{aligned}$$

$L(\theta; x_1, \dots, x_n)$ ist die sogenannte *Likelihood-Funktion*.

Bei der **Maximum-Likelihood-Methode** verwendet man als Schätzer

$$\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) = \arg \max_{\theta \in \Theta} L(\theta; x_1, \dots, x_n),$$

d.h., man verwendet als Schätzung dasjenige

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) \in \Theta,$$

für das gilt:

$$L(\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n); x_1, \dots, x_n) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta; x_1, \dots, x_n).$$

Fortsetzung von Beispiel 5.5: In Beispiel 5.5 sind X_1, \dots, X_n unabhängig identisch $\pi(\theta)$ -verteilt, d.h. es gilt

$$\mathbf{P}[X_1 = k] = \frac{\theta^k}{k!} \cdot e^{-\theta} \quad (k \in \mathbb{N}_0).$$

Bestimmt werden soll der Maximum-Likelihood Schätzer (kurz: ML Schätzer) für θ .

Dazu muss die Likelihood-Funktion

$$L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \frac{\theta^{x_i}}{x_i!} \cdot e^{-\theta} = e^{-n\theta} \cdot \frac{\theta^{x_1 + \dots + x_n}}{x_1! \cdot \dots \cdot x_n!}$$

bezüglich $\theta \in \mathbb{R}_+$ maximiert werden.

Beachtet man, dass für $x > 0$ die Funktion $\ln(x)$ streng monoton wachsend ist, so sieht man, dass

$$L(\theta; x_1, \dots, x_n)$$

genau dann maximal wird, wenn

$$\ln L(\theta; x_1, \dots, x_n)$$

maximal wird. Die Anwendung des Logarithmus führt hier zu einer Vereinfachung der Rechnung, da das Produkt

$$\prod_{i=1}^n w_\theta(\{x_i\})$$

in die Summe

$$\ln \left(\prod_{i=1}^n w_\theta(\{x_i\}) \right) = \sum_{i=1}^n \ln w_\theta(\{x_i\})$$

umgewandelt wird. Sie ist aber nur möglich, sofern $L(\theta; x_1, \dots, x_n)$ für alle θ ungleich Null ist.

Es genügt also im Folgenden,

$$\ln L(\theta; x_1, \dots, x_n) = -n \cdot \theta + (x_1 + \dots + x_n) \cdot \ln(\theta) - \ln(x_1! \cdot \dots \cdot x_n!)$$

bezüglich θ zu maximieren.

Da diese Funktion im hier vorliegenden Beispiel differenzierbar ist, ist eine notwendige Bedingung dafür

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(\theta; x_1, \dots, x_n) = 0.$$

Mit

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(\theta; x_1, \dots, x_n) = -n + \frac{x_1 + \dots + x_n}{\theta} - 0$$

folgt unter Beachtung von

$$L(\theta; x_1, \dots, x_n) \rightarrow -\infty \quad \text{für} \quad \theta \rightarrow 0 \quad \text{oder} \quad \theta \rightarrow \infty,$$

dass der ML Schätzer gegeben ist durch

$$\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

Für die Daten aus Beispiel 5.5 ergibt sich damit

$$\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) = \frac{10 + 25 + 3 + 15 + 7}{5} = 12$$

als Schätzung für θ .

Fall 2: X_1 habe Dichte $f_\theta : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^l$.

In diesem Fall ist es nicht sinnvoll, θ durch Maximierung der Wahrscheinlichkeit

$$\mathbf{P}_\theta [X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n] = \prod_{i=1}^n \mathbf{P}_\theta [X_i = x_i]$$

zu bestimmen, da diese Wahrscheinlichkeit für alle Werte x_1, \dots, x_n Null ist. Statt dessen definiert man die Likelihood-Funktion durch

$$L(\theta; x_1, \dots, x_n) := \prod_{i=1}^n f_\theta(x_i),$$

d.h. anstelle des Produktes der Wahrscheinlichkeiten betrachtet man das Produkt der Werte der Dichten an den Stellen x_1, \dots, x_n , und wählt den Maximum-Likelihood-Schätzer wieder durch Maximierung der Likelihood-Funktion bzgl. θ .

Beispiel 5.6 *Student S. fährt immer mit dem Auto zur Universität. Auf dem Weg dorthin passiert er eine Ampelanlage. In der Vergangenheit war diese mehrfach rot, wobei die letzten $n = 6$ Wartezeiten $x_1 = 10$, $x_2 = 60$, $x_3 = 45$, $x_4 = 50$, $x_5 = 5$ und $x_6 = 30$ Sekunden betragen. Da das Eintreffen von Student S. an der Ampel als rein zufällig innerhalb der Rotphase der Ampel (vorausgesetzt die Ampel ist nicht grün!) betrachtet werden kann, ist es naheliegend, die zufällige Wartezeit X von Student S. an der roten Ampel durch eine auf einem Intervall $[0, a]$ gleichverteilte Zufallsvariable X zu modellieren, d.h. durch eine stetig verteilte Zufallsvariable X mit Dichte*

$$f_a(x) = \begin{cases} \frac{1}{a} & \text{für } 0 \leq x \leq a, \\ 0 & \text{für } x < 0 \text{ oder } x > a. \end{cases}$$

Wie schätzt man ausgehend von den obigen Daten die Dauer a der Rotphase ?

Anwendung des Maximum-Likelihood Prinzips erfordert hier Maximierung von

$$L(a) = \prod_{i=1}^n f_a(x_i).$$

Zur Bestimmung der Werte von $L(a)$ bietet sich die folgende Überlegung an: $L(a)$ ist Null, falls einer der Faktoren Null ist. Ist dies nicht der Fall, sind alle $f_a(x_i)$ gleich $1/a$ und damit ist $L(a) = 1/a^n$.

Da $f_a(x_i)$ für $x_i \geq 0$ genau dann Null ist, falls $a < x_i$ gilt, folgt, dass $L(a)$ genau dann Null ist, falls $a < \max\{x_1, \dots, x_n\}$ ist.

Insgesamt ist damit gezeigt:

$$L(a) = \begin{cases} \frac{1}{a^n} & \text{für } a \geq \max\{x_1, \dots, x_n\}, \\ 0 & \text{für } a < \max\{x_1, \dots, x_n\}. \end{cases}$$

Damit wird $L(a)$ maximal für

$$\hat{a} = \max\{x_1, \dots, x_n\},$$

und im Falle der Daten aus Beispiel 5.6 liefert das Maximum-Likelihood Prinzip die Schätzung

$$\hat{a} = \max\{10, 60, 45, 50, 5, 30\} = 60.$$

Beispiel 5.7 X_1, \dots, X_n seien unabhängig identisch $N(a, \sigma^2)$ -verteilt, d.h. X_1 hat die Dichte

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}.$$

Hierbei sei $a \in \mathbb{R}$ bekannt und $\sigma > 0$ unbekannt. Geschätzt werden soll $\theta = \sigma^2$.

In diesem Fall ist die Likelihood-Funktion gegeben durch

$$L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot \theta}} \cdot e^{-\frac{(x_i-a)^2}{2\theta}} = (2\pi)^{-n/2} \theta^{-n/2} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i-a)^2}{2\theta}}.$$

Maximierung von $\ln L(\theta; x_1, \dots, x_n)$ bzgl. θ führt auf

$$\begin{aligned} 0 &\stackrel{!}{=} \frac{\partial}{\partial \theta} [\ln L(\theta; x_1, \dots, x_n)] \\ &= \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\ln((2\pi)^{-n/2}) - \frac{n}{2} \cdot \ln(\theta) - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - a)^2}{2\theta} \right] \\ &= -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - a)^2}{2\theta^2}. \end{aligned}$$

Unter Beachtung von

$$L(\theta; x_1, \dots, x_n) \rightarrow 0 \quad \text{für } \theta \rightarrow 0 \quad \text{oder } \theta \rightarrow \infty$$

ergibt sich damit der Maximum-Likelihood-Schätzer zu

$$\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2.$$

Beispiel 5.8 Wir betrachten nochmals Beispiel 5.7, d.h., X_1, \dots, X_n seien wieder unabhängig identisch $N(\mu, \sigma^2)$ verteilt, aber diesmal seien sowohl $\mu \in \mathbb{R}$ als auch $\sigma > 0$ unbekannt. Geschätzt werden soll $\theta = (\mu, \sigma^2)$.

Die Likelihood-Funktion ist hier gegeben durch

$$\begin{aligned} L(\theta; x_1, \dots, x_n) &= L((\mu, \sigma^2); x_1, \dots, x_n) \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot \sigma^2}} \cdot e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \\ &= (2\pi)^{-n/2} (\sigma^2)^{-n/2} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}. \end{aligned}$$

Maximierung von

$$\ln L((\mu, \sigma^2); x_1, \dots, x_n) = \ln((2\pi)^{-n/2}) - \frac{n}{2} \cdot \ln(\sigma^2) - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}$$

führt auf

$$0 \stackrel{!}{=} \frac{\partial \ln(L((\mu, \sigma^2); x_1, \dots, x_n))}{\partial \mu} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)}{\sigma^2},$$

was äquivalent ist zu

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i,$$

sowie auf

$$0 \stackrel{!}{=} \frac{\partial \ln(L((\mu, \sigma^2); x_1, \dots, x_n))}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2(\sigma^2)^2},$$

woraus folgt

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2.$$

Damit ergibt sich der Maximum-Likelihood-Schätzer zu

$$(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(x_i - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j \right)^2 \right).$$

5.3 Statistische Testverfahren

Statistische Testverfahren werden anhand der folgenden Fragestellung eingeführt.

Beispiel 5.9 *Wie kann man feststellen, ob eine geplante Vereinfachung des Steuerrechts zu Mindereinnahmen des Staates führt oder nicht ?*

Eine naheliegende Idee ist, für n zufällig ausgewählte Steuererklärungen des vergangenen Jahres die Differenzen

$$x_i = \begin{array}{l} \text{Steuer im Fall } i \text{ bei neuem Steuerrecht} \\ - \text{Steuer im Fall } i \text{ bei altem Steuerrecht} \end{array}$$

($i = 1, \dots, n$) zu berechnen. Ist hierbei $x_i > 0$, so erhält der Staat bei der i -ten Steuererklärung nach dem neuen Recht mehr Geld; im Falle $x_i < 0$ erhält er weniger Geld.

Ein naiver Zugang ist nun,

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

zu betrachten und im Falle $\bar{x} < 0$ zu schließen, dass die Steuerreform die Einnahmen des Staates verringern wird, und im Fall $\bar{x} \geq 0$ zu schließen, dass dies nicht der Fall ist. Es stellt sich aber sofort die Frage, ob das Ergebnis hier nicht aufgrund der zufälligen Auswahl der n betrachteten Steuererklärungen (statt aufgrund des Einflusses der Steuerreform) entstanden ist. Diese zufällige Auswahl hat vor allem dann einen großen Einfluss, wenn \bar{x} "nahe bei" Null ist, n "klein" ist (für große n würden sich zufällige Schwankungen bei den Werten der x_i bei der Bildung des arithmetischen Mittels \bar{x} "herausmitteln") und wenn die Differenzen der zu zahlenden Steuern in der Menge aller Steuerpflichtigen stark schwanken. Letzteres kann durch Betrachtung der Streuung

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

beurteilt werden, die (aufgrund der zufälligen Auswahl der n Steuerpflichtigen) eine Schätzung für die Streuung der Differenzen der zu zahlenden Steuern in der Menge aller Steuerpflichtigen darstellt.

Man steht dann vor dem Problem, ausgehend von der Größe von \bar{x} , s^2 und vom Stichprobenumfang n zu entscheiden, ob die Steuerreform die Einnahmen des Staates vermindert oder nicht.

Zahlenbeispiel zu Beispiel 5.9: $n = 100$, $\bar{x} = 120$ und $s = 725$. Was folgt daraus ?

Wir modellieren die Fragestellung stochastisch wie folgt: Wir fassen die x_1, \dots, x_n als Realisierungen von unabhängigen identisch verteilten reellen ZVen X_1, \dots, X_n auf. Aufgrund dieser Realisierungen möchten wir entscheiden, ob $\mathbf{E}X_1$ kleiner als Null ist oder nicht.

Zwecks Vereinfachung der Problemstellung schränken wir die Klasse der betrachteten Verteilungen ein. Wir nehmen an, dass die Verteilung \mathbf{P}_{X_1} von X_1 aus einer gegebenen Klasse

$$\{w_\theta : \theta \in \Theta\}$$

von Verteilungen stammt.

Im Beispiel 5.9 könnte man z.B. annehmen, dass X_1 normalverteilt ist mit unbekanntem Erwartungswert μ und bekannter Varianz $\sigma^2 = s^2$, oder dass X_1 normalverteilt ist mit unbekanntem Erwartungswert μ und unbekannter Varianz σ^2 .

Wir betrachten eine Aufteilung der Parametermenge Θ in zwei Teile:

$$\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1 \quad \text{wobei } \Theta_0 \neq \emptyset, \Theta_1 \neq \emptyset \text{ und } \Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset.$$

Die Aufgabe ist, aufgrund von x_1, \dots, x_n zu entscheiden ("testen"), ob die sogenannte *Nullhypothese*

$$H_0 : \theta \in \Theta_0$$

abgelehnt, d.h. die sogenannte *Alternativhypothese*

$$H_1 : \theta \in \Theta_1$$

angenommen werden kann, oder nicht.

In Beispiel 5.9 wollen wir uns zwischen den *Hypothesen*

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

mit $\mu_0 = 0$ entscheiden. Dabei bedeutet $\mu \leq 0$, dass die Steuerreform die Steuereinnahmen vermindert, während $\mu > 0$ bedeutet, dass dies nicht der Fall ist.

Andere häufig auftretende Beispiele für das Aufteilen der Parametermenge Θ in zwei Mengen Θ_0 und Θ_1 sind

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \quad \text{und} \quad H_1 : \mu < \mu_0$$

oder

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{und} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

Bei Letzterem interessieren sowohl Abweichungen von μ_0 nach oben als auch Abweichungen nach unten und man spricht daher von einem *zweiseitigen Testproblem*. Bei den anderen beiden Beispielen handelt es sich um sogenannte *einseitige Testprobleme*. Hier möchte man entweder eine Abweichung von μ_0 nach oben oder eine Abweichung nach unten feststellen.

Durch Angabe eines *Ablehnungsbereichs* (oder *kritischen Bereichs*) $K \subseteq \mathbb{R}^n$ ist ein **statistischer Test** festgelegt:

H_0 wird abgelehnt, falls $(x_1, \dots, x_n) \in K$. Ist dagegen $(x_1, \dots, x_n) \notin K$, so wird H_0 nicht abgelehnt.

Bei einem solchen Test können zwei Arten von Fehlern auftreten:

Ein *Fehler 1. Art* ist die Entscheidung für H_1 , obwohl H_0 richtig ist. Ein *Fehler 2. Art* ist die Entscheidung für H_0 , obwohl H_1 richtig ist.

In Beispiel 5.9 bedeutet das Auftreten eines Fehlers 1. Art, dass wir zu dem Schluss kommen, dass die Steuerreform die Steuereinnahmen nicht vermindert, obwohl sie das in Wahrheit tut. Dagegen bedeutet ein Fehler 2. Art, dass wir bei Vorliegen einer Steuerreform, die die Steuereinnahmen nicht vermindert, zum Schluss kommen, dass die Steuerreform die Steuereinnahmen verringert.

Die Funktion $g : \Theta \rightarrow [0, 1]$ mit

$$g(\theta) = \mathbf{P}_\theta [(X_1, \dots, X_n) \in K]$$

heißt *Gütefunktion* des Tests. Hierbei gibt $\mathbf{P}_\theta [(X_1, \dots, X_n) \in K]$ die Wahrscheinlichkeit an, dass H_0 abgelehnt wird; die obige Wahrscheinlichkeit wird berechnet für unabhängig identisch verteilte ZVen X_1, \dots, X_n mit $\mathbf{P}_{X_1} = w_\theta$.

Im Fall $\theta \in \Theta_0$ gilt:

$$\begin{aligned} g(\theta) &= \text{Wahrscheinlichkeit, } H_0 \text{ abzulehnen obwohl } H_0 \text{ richtig ist} \\ &=: \text{Fehlerwahrscheinlichkeit 1. Art.} \end{aligned}$$

Im Fall $\theta \in \Theta_1$ gilt:

$$\begin{aligned} 1 - g(\theta) &= \mathbf{P}_\theta [(X_1, \dots, X_n) \notin K] \\ &= \text{Wahrscheinlichkeit, } H_0 \text{ nicht abzulehnen obwohl } H_1 \text{ richtig ist} \\ &=: \text{Fehlerwahrscheinlichkeit 2. Art.} \end{aligned}$$

Die ideale Gütefunktion ist gegeben durch

$$g(\theta) = \begin{cases} 0, & \text{falls } \theta \in \Theta_0, \\ 1, & \text{falls } \theta \in \Theta_1. \end{cases}$$

Leider existieren nur in trivialen Fällen Tests mit dieser Gütefunktion. Darüberhinaus existieren im allgemeinen auch keine Tests, die die Fehlerwahrscheinlichkeiten 1. und 2. Art gleichmäßig bzgl. $\theta \in \Theta$ minimieren.

Als Ausweg bietet sich eine asymmetrische Betrachtungsweise der Fehler erster und zweiter Art an. In vielen Anwendungen ist eine der beiden Fehlerarten als schwerwiegender zu betrachten als die andere. Z.B. führt in Beispiel 5.9 ein Fehler erster Art (Entscheidung für $\mu > 0$ obwohl $\mu \leq 0$ gilt) zur Durchführung einer Steuerreform, die die Steuereinnahmen vermindert. Aus Sicht des Finanzministers ist dies ein deutlich schwerwiegender Fehler als ein Fehler zweiter Art, der dazu führt, dass eine Steuerreform, die die Einnahmen des Staates nicht vermindert, nicht durchgeführt wird.

Was man daher macht, ist eine Schranke für eine der beiden Arten von Fehlerwahrscheinlichkeiten vorzugeben und unter dieser Nebenbedingung die andere Art von Fehlerwahrscheinlichkeiten zu minimieren. OBdA gibt man hierbei eine Schranke für die Fehlerwahrscheinlichkeit erster Art vor.

Dazu gibt man ein $\alpha \in (0, 1)$ vor (sog. *Niveau*, meist wählt man $\alpha = 0.05$ oder $\alpha = 0.01$) und betrachtet nur noch Tests mit Fehlerwahrscheinlichkeiten 1. Art $\leq \alpha$, d.h. mit

$$g(\theta) \leq \alpha \quad \text{für alle } \theta \in \Theta_0$$

(sog. *Tests zum Niveau* α).

Unter allen Tests zum Niveau α sucht man dann denjenigen Test, für den für *alle* $\theta \in \Theta_1$ die zugehörige Fehlerwahrscheinlichkeit 2. Art $1 - g(\theta)$ am kleinsten ist.

Der Ablehnungsbereich solcher Tests hat häufig die Form

$$K = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : T(x_1, \dots, x_n) > c\}$$

(evt. mit $> c$ ersetzt durch $< c$) für eine Funktion $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ und ein $c \in \mathbb{R}$. Die Zufallsvariable $T(X_1, \dots, X_n)$ heißt in diesem Fall *Testgröße* oder *Teststatistik*, c heißt *kritischer Wert*.

Bemerkungen:

a) Bei den obigen Tests werden die Fehlerwahrscheinlichkeiten 1. und 2. Art unsymmetrisch behandelt. Als Konsequenz sollte man die Hypothesen so wählen, dass der Fehler erster Art als schlimmer angesehen wird als der Fehler zweiter Art, bzw. dass das statistisch zu sichernde Resultat als Alternativhypothese formuliert wird.

b) Aufgrund der Konstruktion der obigen Tests wird bei einem Test zum Niveau $\alpha = 5\%$ bei wiederholtem Durchführen des Tests für unabhängige Daten bei Gültigkeit von H_0 in bis zu 5% der Fälle H_0 fälschlicherweise abgelehnt.

c) Führt man mehrere verschiedene Tests zum Niveau α hintereinander aus, und gelten jeweils die Nullhypothesen, so ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens bei einem dieser Tests die Nullhypothese abzulehnen, im allgemeinen größer als α . Sind z.B. die Prüfgrößen der einzelnen Tests unabhängig und ist der Fehler erster Art bei jedem der Tests genau $\alpha = 0.05$, so ist beim Durchführen von $n = 3$ solchen Tests die Wahrscheinlichkeit, kein einziges Mal die Nullhypothese abzulehnen, gegeben durch

$$(1 - \alpha)^n,$$

d.h., die Wahrscheinlichkeit, bei mindestens einen der Tests die Nullhypothese abzulehnen, beträgt

$$1 - (1 - \alpha)^n = 1 - 0.95^3 \approx 0.14$$

(sog. *Problem des multiplen Testens*).

d) Betrachtet man erst die Daten, und wählt dann einen zu diesen Daten passenden Test aus, so führt dies analog zu b) eventuell zu einem Verfälschen des Niveaus.

e) Häufig betrachtet man den sogenannten *p-Wert*

$$p = \max_{\theta \in \Theta_0} \mathbf{P}[T(X_1, \dots, X_n) > T(x_1, \dots, x_n)]$$

eines Tests. Dieser gibt dasjenige Niveau an, bei dem die Nullhypothese H_0 bei den gegebenen Daten gerade noch abgelehnt werden kann. Ist das vorgegebene Niveau α größer oder gleich dem *p-Wert*, so kann H_0 zum Niveau α abgelehnt werden, andernfalls kann H_0 nicht abgelehnt werden.

Man beachte, dass der *p-Wert* *nicht* die Wahrscheinlichkeit angibt, dass die Nullhypothese falsch ist. Denn in dem oben beschriebenen Modell für statistische Tests ist diese entweder richtig oder falsch, daher gibt es keine Wahrscheinlichkeit zwischen Null und Eins, mit der diese richtig ist.

Beispiele:**a) Einseitiger Gauß-Test**

Hier wird davon ausgegangen, dass die ZVen X_1, \dots, X_n unabhängig identisch $N(\mu, \sigma_0^2)$ -verteilt sind, wobei $\mu \in \mathbb{R}$ unbekannt ist und $\sigma_0 > 0$ bekannt ist.

Zu testen sei

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu > \mu_0.$$

Als Testgröße wird verwendet

$$T(X_1, \dots, X_n) = \frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} (\bar{X}_n - \mu_0)$$

mit

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Da \bar{X}_n ein Schätzer für μ ist, werden die Werte von $T(X_1, \dots, X_n)$ (mit großer Wk.) umso größer sein, je größer μ ist. Sinnvollerweise entscheidet man sich daher vor allem dann für eine Ablehnung von $H_0 : \mu \leq \mu_0$, wenn der Wert von $T(X_1, \dots, X_n)$ groß ist.

Beim einseitigen Gauß-Test wird H_0 abgelehnt, falls (x_1, \dots, x_n) im Ablehnungsbereich

$$K = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : T(x_1, \dots, x_n) > c\}$$

enthalten ist.

Zur Bestimmung von c wird wie folgt vorgegangen:

Man kann zeigen, dass Linearkombinationen von unabhängigen normalverteilten ZVen normalverteilt sind. Daher ist für $\mu = \mu_0$ die Testgröße $T(X_1, \dots, X_n)$ $N(0, 1)$ -verteilt, da

$$\mathbf{E}_{\mu_0} T(X_1, \dots, X_n) = \frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{E}_{\mu_0} X_i - \mu_0 \right) = \frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_0 - \mu_0 \right) = 0$$

und

$$V_{\mu_0} (T(X_1, \dots, X_n)) = \left(\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} \right)^2 \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma_0^2 = 1.$$

Sei $\alpha \in (0, 1)$ das vorgegebene Niveau. Dann wählt man c so, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit erster Art des Tests im Falle $\mu = \mu_0$ gerade gleich α ist, d.h., dass gilt:

$$\mathbf{P}_{\mu_0} [(X_1, \dots, X_n) \in K] = \alpha,$$

bzw.

$$\mathbf{P}_{\mu_0} \left[\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} (\bar{X}_n - \mu_0) > c \right] = \alpha.$$

Die linke Seite oben ist gleich $1 - \Phi(c)$, wobei Φ die Verteilungsfunktion zur $N(0, 1)$ -Verteilung ist. Also ist die obige Forderung äquivalent zu

$$1 - \Phi(c) = \alpha \text{ bzw. } \Phi(c) = 1 - \alpha$$

(d.h. c ist das sogenannte α -Fraktile der $N(0, 1)$ -Verteilung).

Aus dieser Beziehung kann man c z.B. unter Zuhilfenahme von Tabellen für die Verteilungsfunktion bzw. die Fraktile der $N(0, 1)$ -Verteilung bestimmen.

Für diese Wahl von c gilt, dass der resultierende Test ein Test zum Niveau α ist. Ist nämlich $\mu = \bar{\mu}$ für ein $\bar{\mu} \in \mathbb{R}$, so ist

$$\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} (\bar{X}_n - \bar{\mu})$$

$N(0, 1)$ -verteilt, und daher gilt für die Gütefunktion des obigen Tests:

$$\begin{aligned} g(\bar{\mu}) &= \mathbf{P}_{\bar{\mu}} \left[\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} (\bar{X}_n - \mu_0) > c \right] \\ &= \mathbf{P}_{\bar{\mu}} \left[\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} (\bar{X}_n - \bar{\mu}) + \frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} (\bar{\mu} - \mu_0) > c \right] \\ &= \mathbf{P}_{\bar{\mu}} \left[\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} (\bar{X}_n - \bar{\mu}) > c + \frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} (\mu_0 - \bar{\mu}) \right] \\ &= 1 - \Phi \left(c + \frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} (\mu_0 - \bar{\mu}) \right). \end{aligned}$$

Also ist für $\bar{\mu} \leq \mu_0$ die Fehlerwahrscheinlichkeit erster Art des einseitigen Gauß-Tests wegen

$$c + \frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} (\mu_0 - \bar{\mu}) \geq c$$

und Φ monoton wachsend gegeben durch

$$g(\bar{\mu}) = 1 - \Phi \left(c + \frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} (\mu_0 - \bar{\mu}) \right) \leq 1 - \Phi(c) = \alpha,$$

d.h. alle Fehlerwahrscheinlichkeiten erster Art sind kleiner oder gleich α .

Aus der obigen Überlegung sieht man auch, dass für $\bar{\mu} > \mu_0$ die Fehlerwahrscheinlichkeit zweiter Art gleich

$$1 - g(\bar{\mu}) = \Phi\left(c + \frac{\sqrt{n}}{\sigma_0}(\mu_0 - \bar{\mu})\right)$$

ist, d.h. für $\bar{\mu}$ nahe bei μ_0 nahe bei

$$\Phi(c) = 1 - \alpha$$

sowie für $\bar{\mu}$ sehr groß nahe bei

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \Phi(x) = 0$$

ist.

Anwendung in Beispiel 5.9 mit $\mu_0 = 0$ und $\alpha = 5\%$ ergibt $1 - \Phi(c) = 0.05$ bzw. $\Phi(c) = 0.95$, woraus $c \approx 1.645$ folgt. In Beispiel 5.9 war $n = 100$, $\bar{x} = 120$ und $\sigma_0 = s = 725$. Wegen

$$\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0}(\bar{x} - \mu_0) = \frac{\sqrt{100}}{725}(120 - 0) \approx 1.655 > c$$

kann hier H_0 abgelehnt werden, d.h. man kommt zur Schlussfolgerung, dass die Steuerreform die Steuereinnahmen vermutlich nicht vermindert.

Der obige einseitige Gauß-Test kann nach naheliegender Modifikation auch zum Testen der Hypothesen

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu < \mu_0$$

verwendet werden. Dazu beachte man, dass bei der obigen Testgröße große (bzw. kleine) Werte eine Entscheidung für große (bzw. kleine) Werte von μ nahelegen. Daher entscheidet man sich jetzt für Ablehnung von $H_0 : \mu \geq \mu_0$, falls (x_1, \dots, x_n) im Ablehnungsbereich

$$K = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : T(x_1, \dots, x_n) < c\}$$

enthalten ist. c wird dabei wieder so gewählt, dass für $\mu = \mu_0$ die Fehlerwahrscheinlichkeit erster Art gleich α ist, d.h. dass gilt:

$$\mathbf{P}_{\mu_0} \left[\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} (\bar{X}_n - \mu_0) < c \right] = \alpha.$$

Analog zu oben folgt daraus

$$\Phi(c) = \alpha,$$

d.h. c wird hier als $(1 - \alpha)$ -Fraktile der $N(0, 1)$ -Verteilung gewählt.

Problematisch bei Anwendung des Gauß-Tests in Beispiel 5.9 ist, dass die Varianz eigentlich unbekannt war und aus den Daten geschätzt wurde und damit die Voraussetzungen des Gauß-Tests nicht erfüllt waren.

Daher ist eigentlich eine Anwendung des sogenannten t -Tests nötig, der als nächstes behandelt wird.

b) Einseitiger t -Test

Hier wird davon ausgegangen, dass die ZVen X_1, \dots, X_n unabhängig identisch $N(\mu, \sigma)$ -verteilt sind, wobei $\mu \in \mathbb{R}$ und $\sigma > 0$ **beide** unbekannt sind.

Zu testen sei wieder

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu > \mu_0.$$

Als Testgröße wird

$$T(X_1, \dots, X_n) = \sqrt{n} \cdot \frac{(\bar{X}_n - \mu_0)}{S_n}$$

verwendet, wobei

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{und} \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n |X_i - \bar{X}|^2.$$

Die Testgröße wird also analog zum Gauß-Test bestimmt, nur dass jetzt anstelle der Varianz σ_0 eine Schätzung derselbigen verwendet wird.

Wie bei der Testgröße des einseitigen Gauß-Tests gilt auch hier, dass die Werte von $T(X_1, \dots, X_n)$ (mit großer Wk.) umso größer sind, je größer μ ist.

H_0 wird wieder abgelehnt, falls (x_1, \dots, x_n) im Ablehnungsbereich

$$K = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : T(x_1, \dots, x_n) > c\}$$

enthalten ist.

Ausgangspunkt zur Bestimmung des Wertes von c ist, dass für $\mu = \mu_0$ die Testgröße

$$\sqrt{n} \cdot \frac{(\bar{X}_n - \mu_0)}{S_n}$$

t_{n-1} -verteilt ist, wobei man eine t -verteilte Zufallsvariable mit $n-1$ Freiheitsgraden (kurz: eine t_{n-1} -verteilte ZV) erhält, indem man ausgehend von unabhängig identisch $N(0, 1)$ -verteilten ZVen Y_1, \dots, Y_n die ZV

$$\frac{Y_n}{\sqrt{(Y_1^2 + \dots + Y_{n-1}^2)/(n-1)}}$$

bildet. Die Verteilungsfunktion der t_{n-1} -Verteilung ist tabelliert.

Man wählt nun c so, dass

$$\mathbf{P}_{\mu_0} \left[\frac{\sqrt{n}}{S_n} (\bar{X}_n - \mu_0) > c \right] = \alpha$$

gilt.

Anwendung in Beispiel 5.9 mit $\mu_0 = 0$ und $\alpha = 5\%$ ergibt $c = 1.660$. Mit $n = 100$, $\bar{x} = 120$ und $s = 725$ folgt

$$\sqrt{n} \frac{(\bar{x} - \mu_0)}{s} = \sqrt{100} \frac{(120 - 0)}{725} \approx 1.655 < c,$$

d.h. H_0 kann nicht abgelehnt werden und man kommt nun zur Schlussfolgerung, dass die Steuerreform die Steuereinnahmen vermutlich vermindert.

Im Vergleich mit der Anwendung des einseitigen Gauß-Test fällt auf, dass der kritische Wert c jetzt größer ist und daher die Nullhypothese seltener abgelehnt wird. Dies liegt daran, dass beim t -Test die Varianz als unbekannt vorausgesetzt wird, damit weniger Informationen über die zugrundeliegende Verteilung bekannt sind und man sich daher seltener für die Ablehnung der Nullhypothese entscheiden muss, um sicherzustellen, dass eine fälschliche Ablehnung der Nullhypothese nur mit Wahrscheinlichkeit α erfolgt.

Der einseitige t -Test kann analog zum einseitigen Gauß-Test auch zum Testen der Hypothesen

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \quad \text{und} \quad H_1 : \mu \leq \mu_0.$$

verwendet werden.

c) Zweiseitiger Gauß- bzw. t -Test.

Zu testen ist hier

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0,$$

wobei die Stichprobe wieder normalverteilt mit unbekanntem Erwartungswert μ und bekannter bzw. unbekannter Varianz σ_0^2 bzw. σ^2 ist. Die Teststatistik T

wird wie beim einseitigen Gauß- bzw. t -Test gebildet. H_0 wird abgelehnt, falls (x_1, \dots, x_n) im Ablehnungsbereich

$$K = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : |T(x_1, \dots, x_n)| > c\}$$

enthalten ist, wobei c durch die Forderung

$$\mathbf{P}_{\mu_0} \left[\left| \frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} (\bar{X}_n - \mu_0) \right| > c \right] = \alpha.$$

bestimmt wird. Da hier $T(X_1, \dots, X_n)$ die gleiche Verteilung hat wie $(-1) \cdot T(X_1, \dots, X_n)$, ist dies äquivalent zu

$$\mathbf{P}_{\mu_0} \left[\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} (\bar{X}_n - \mu_0) > c \right] = \frac{\alpha}{2},$$

und c ergibt sich im Falle des zweiseitigen Gauß-Test, bei dem die Varianz als bekannt vorausgesetzt wird, als $\alpha/2$ -Fraktile der $N(0, 1)$ -Verteilung, und im Falle des zweiseitigen t -Tests, bei dem die Varianz unbekannt ist, als $\alpha/2$ -Fraktile der t_{n-1} -Verteilung.

Eine Übersicht über die bisher eingeführten Tests findet man in Tabelle 5.1.

Hypothesen	Varianz	$T(x_1, \dots, x_n)$	Ablehnung von H_0 , falls
$H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$	bekannt	$\sqrt{n} \cdot \frac{x_n - \mu_0}{\sigma_0}$	$T(x_1, \dots, x_n) > u_\alpha$
$H_0 : \mu \geq \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$	bekannt	$\sqrt{n} \cdot \frac{x_n - \mu_0}{\sigma_0}$	$T(x_1, \dots, x_n) < u_{1-\alpha}$
$H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$	bekannt	$\sqrt{n} \cdot \frac{x_n - \mu_0}{\sigma_0}$	$ T(x_1, \dots, x_n) > u_{\alpha/2}$
$H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$	unbekannt	$\sqrt{n} \cdot \frac{x_n - \mu_0}{s_n}$	$T(x_1, \dots, x_n) > t_{n-1, \alpha}$
$H_0 : \mu \geq \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$	unbekannt	$\sqrt{n} \cdot \frac{x_n - \mu_0}{s_n}$	$T(x_1, \dots, x_n) < t_{n-1, 1-\alpha}$
$H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$	unbekannt	$\sqrt{n} \cdot \frac{x_n - \mu_0}{s_n}$	$ T(x_1, \dots, x_n) > t_{n-1, \alpha/2}$

Tabelle 5.1: Gauß- und t -Test für eine Stichprobe. Vorausgesetzt ist jeweils, dass x_1, \dots, x_n eine Stichprobe einer Normalverteilung mit unbekanntem Erwartungswert μ und bekannter Varianz σ_0^2 bzw. unbekannter Varianz σ^2 sind. u_α bzw. $t_{n-1, \alpha}$ ist das α -Fraktile der $N(0, 1)$ - bzw. der t_{n-1} -Verteilung. Es werden die Abkürzungen $\bar{x}_n = 1/n \sum_{i=1}^n x_i$ und $s_n^2 = 1/(n-1) \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2$ verwendet.

Bei den obigen Test wurde der Erwartungswert mit einem festen Wert verglichen. Manchmal ist allerdings kein solcher Wert vorgegeben, statt dessen hat man Stichproben zweier unterschiedlicher Verteilungen gegeben und möchte deren (unbekannte) Erwartungswerte vergleichen. Die zugehörigen Tests bezeichnet man als *Tests für zwei Stichproben* (im Gegensatz zu den oben vorgestellten *Tests für eine Stichprobe*).

Beispiel 5.10 *Im Rahmen einer prospektiv kontrollierten Studie mit Randomisierung soll die Wirksamkeit eines Medikamentes überprüft werden. Dazu werden die Überlebenszeiten x_1, \dots, x_n der Studiengruppe (die mit dem neuen Medikament behandelt wurde) sowie die Überlebenszeiten y_1, \dots, y_m der Kontrollgruppe (die aus Personen besteht, die nicht mit dem neuen Medikament behandelt wurden) ermittelt. Durch Vergleich dieser Überlebenszeiten möchte man feststellen, ob die Einnahme des neuen Medikaments eine Wirkung auf die Überlebenszeit hat oder nicht.*

Zur stochastischen Modellierung fassen wir x_1, \dots, x_n bzw. y_1, \dots, y_m als Realisierungen von Zufallsvariablen X_1, \dots, X_n bzw. Y_1, \dots, Y_m auf. Hierbei seien die Zufallsvariablen

$$X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m$$

unabhängig, wobei X_1, \dots, X_n identisch verteilt seien mit Erwartungswert μ_X und Y_1, \dots, Y_m identisch verteilt seien mit Erwartungswert μ_Y .

Aufgrund der obigen Stichprobe wollen wir uns zwischen der Nullhypothese

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y$$

und der Alternativhypothese

$$H_1 : \mu_X \neq \mu_Y.$$

Eine Möglichkeit dafür ist der sogenannte *zweiseitige Gauß-Test für zwei Stichproben*. Bei diesem geht man davon aus, dass die X_1, \dots, X_n unabhängig identisch $N(\mu_X, \sigma_0^2)$ -verteilt sind, und dass die Y_1, \dots, Y_m unabhängig identisch $N(\mu_Y, \sigma_0^2)$ -verteilt sind. Hierbei sind μ_X, μ_Y unbekannt, die Varianz σ_0^2 wird aber als bekannt vorausgesetzt. Man beachte, dass hier insbesondere vorausgesetzt wird, dass die X_1, \dots, X_n die gleiche Varianz wie die Y_1, \dots, Y_m haben.

Betrachtet wird hier die Testgröße

$$T(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sigma_0 \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}$$

wobei

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{und} \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m y_j.$$

Ist die Differenz von μ_X und μ_Y betragsmäßig groß, so wird, da \bar{x} und \bar{y} Schätzungen von μ_X bzw. μ_Y sind, auch $T(x_1, \dots, y_m)$ betragsmäßig groß sein. Dies legt nahe, H_0 abzulehnen, sofern $T(x_1, \dots, y_m)$ betragsmäßig einen kritischen Wert c übersteigt.

Ausgangspunkt zur Bestimmung von c ist, dass bei Gültigkeit von H_0 (d.h. für $\mu_X = \mu_Y$)

$$T(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m) = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Y_j}{\sigma_0 \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}$$

$N(0, 1)$ -verteilt ist. Dazu beachte man, dass $T(X_1, \dots, Y_m)$ normalverteilt ist, da Linearkombinationen unabhängiger normalverteilter Zufallsvariablen immer normalverteilt sind. Desweiteren gilt

$$\mathbf{E}T(X_1, \dots, Y_m) = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{E}X_i - \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \mathbf{E}Y_j}{\sigma_0 \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} = \frac{\mu_X - \mu_Y}{\sigma_0 \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} = 0$$

für $\mu_X = \mu_Y$, sowie

$$\begin{aligned} V(T(X_1, \dots, Y_m)) &= \frac{V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Y_j\right)}{\sigma_0^2 \cdot \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)} \\ &= \frac{V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) + V\left(\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Y_j\right)}{\sigma_0^2 \cdot \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)} \\ &= \frac{\frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(X_i) + \frac{1}{m^2} \sum_{j=1}^m V(Y_j)}{\sigma_0^2 \cdot \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)} \\ &= \frac{\frac{\sigma_0^2}{n} + \frac{\sigma_0^2}{m}}{\sigma_0^2 \cdot \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)} = 1. \end{aligned}$$

Man wählt nun c als $\alpha/2$ -Fraktile der $N(0, 1)$ -Verteilung. Es gilt dann bei Gültigkeit von H_0 : Die Wahrscheinlichkeit, H_0 fälschlicherweise abzulehnen, ist gegeben durch

$$\mathbf{P}[|T(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m)| > c] = 2 \cdot \mathbf{P}[T(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m) > c] = \alpha.$$

Damit erhält man als Vorschrift für den zweiseitigen Gauß-Test für zwei Stichproben: Lehne H_0 ab, falls

$$\left| \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sigma_0 \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \right| > c,$$

wobei $c \in \mathbb{R}$ so gewählt ist, dass für eine $N(0, 1)$ verteilte Zufallsvariable Z gilt:

$$\mathbf{P}[Z > c] = \frac{\alpha}{2},$$

d.h. man wählt c als $\alpha/2$ -Fraktile der $N(0, 1)$ -Verteilung.

Beim zweiseitigen Gauß-Test für zwei Stichproben wird vorausgesetzt, dass die Varianz σ_0^2 bekannt ist. In Anwendungen ist diese aber üblicherweise unbekannt und muss aus den Daten geschätzt werden.

Beim *zweiseitigen t-Test für zwei Stichproben* geht man davon aus, dass die $X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m$ unabhängig sind, wobei die X_1, \dots, X_n $N(\mu_X, \sigma^2)$ -verteilt und die Y_1, \dots, Y_m $N(\mu_Y, \sigma^2)$ -verteilt sind. Hierbei sind μ_X, μ_Y und σ^2 unbekannt. Man beachte, dass wieder vorausgesetzt wird, dass die Varianz der X_i mit der der Y_j übereinstimmt.

Zu testen ist wieder

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu_X \neq \mu_Y.$$

In einem ersten Schritt schätzt man σ^2 durch die sogenannte *gepoolte Stichprobenvarianz*

$$S_p^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 + \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y}_m)^2}{m + n - 2}.$$

Wegen

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[S_p^2] &= \frac{1}{m + n - 2} \left((n - 1) \cdot \mathbf{E} \left[\frac{1}{n - 1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 \right] \right. \\ &\quad \left. + (m - 1) \cdot \mathbf{E} \left[\frac{1}{m - 1} \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y}_m)^2 \right] \right) \\ &= \frac{1}{m + n - 2} \left((n - 1) \cdot \sigma^2 + (m - 1) \cdot \sigma^2 \right) = \sigma^2 \end{aligned}$$

(vgl. Beispiel 5.4) handelt es sich hierbei um eine erwartungstreue Schätzung der Varianz.

Man bildet dann analog zum zweiseitigen Gauß-Test für zwei Stichproben die Teststatistik

$$T = \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{S_p^2} \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}.$$

Man kann zeigen, dass bei Gültigkeit von $\mu_X = \mu_Y$ diese Teststatistik t -verteilt ist mit $m + n - 2$ -Freiheitsgraden. Daher lehnt man beim *zweiseitigen Gauß-Test für zwei Stichproben* $H_0 : \mu_X = \mu_Y$ genau dann ab, falls

$$|T| > t_{m+n-2, \alpha},$$

wobei $t_{m+n-2, \alpha}$ das $\alpha/2$ -Fraktil der t -Verteilung mit $m + n - 2$ -Freiheitsgraden ist.

Index

Symbols

$N(\mu, \sigma^2)$ -verteilt	98
$U([a, b])$ -verteilt	97
$\pi(\lambda)$ -verteilt	97
σ -Additivität	61
σ -Algebra	62
$b(n, p)$ -verteilt	96
$exp(\lambda)$ -verteilt	97
p -Wert	151
t -Test	155, 157
t -Testeinseitiger t -Test	155
t -Testzweiseitiger t -Test	156

A

Ablehnungsbereich	137, 149
abzählendes Maß	83
Alternativhypothese	148
arithmetisches Mittel	33

B

Bandbreite	31, 46
bedingte Wahrscheinlichkeit	85
Beobachtungsstudien	18
beschreibende Statistik	24
Binomialkoeffizient	51
Binomialverteilung	75, 96
Binomischer Lehrsatz	51
Borelsche σ -Algebra	63
Boxplot	35

D

Datensatz	24
deskriptive Statistik	24
Dichte	29, 80, 84, 97

5. INDUKTIVE STATISTIK <u>29.09.2006</u>	163
Dichteschätzung	28
disjunkt	60
E	
einfache Funktion	112
einseitige Testprobleme	149
Eintreten eines Ereignisses	56
Elementarereignisse	55
empirische Korrelation	45
empirische Kovarianz	44
empirische Standardabweichung	35
empirische Varianz	34
Epanechnikov-Kern	30
Ereignis	56
Ergebnismenge	55
Ergebnisraum	55
erwartungstreue Schätzung	137, 138
Erwartungswert: Berechnung	108, 120
... Definition	105, 106, 115
... Eigenschaften	111, 115
explorative Statistik	24
Exponentialverteilung	81, 97
F	
Fakultät	50
Fehler 1. Art	149
Fehler 2. Art	149
Fehlerwahrscheinlichkeit 1. Art	149
Fehlerwahrscheinlichkeit 2. Art	150
Formel von Bayes	87
Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit	87
Fraktil	153
G	
Gütefunktion	149
Gauß-Test	152, 157, 158
... einseitiger Gauß-Test	152
... zweiseitiger Gauß-Test	156

5. INDUKTIVE STATISTIK <u>29.09.2006</u>	164
Gauss-Kern	30, 46
gepoolte Stichprobenvarianz	160
Gesetze der großen Zahlen	127, 128
Gleichverteilung	81, 97
gleitendes Histogramm	29
Grundmenge	55
H	
Häufigkeitstabelle	26
Histogramm	27
Hypothese	137, 148
I	
identisch verteilt	127
induktive Statistik	135
Interquartilabstand	35
K	
Kern-Dichteschätzer	31
Kernfunktion	31
Kernschätzer	46
Kombinatorik	49
Komplement	59
komplementäres Ereignis	61
Konfidenzintervall	137
Konfidenzniveau	137
konfundierter Faktor	14, 18
Kontrollgruppe	13
Konvergenz fast sicher	128
Konvergenz nach Verteilung	130
Konvergenz von unten	113
kritischer Bereich	149
kritischer Wert	150
L	
Lagemaßzahlen	33
Laplacescher W-Raum	68

5. INDUKTIVE STATISTIK <u>29.09.2006</u>	165
LB-Maß	83
Lebesgue-Borel-Maß	83
Likelihood-Funktion	142, 144
lineare Regression	39
lokale Mittelung	46
M	
Maß	82
Maßintegral	113
Maßraum	83
Markovsche Ungleichung	123
Maximum-Likelihood-Methode	142, 144
Maximum-Likelihood-Prinzip	142, 144
Median	34
Merkmal	25
messbar	112
Messgröße	25
... diskrete	25
... nominale	25
... ordinale	25
... reelle	25
... stetige	25
... zirkuläre	25
Messraum	91
Messreihe	24
multiple Testen	151
N	
naiver Kern	46
nichtparametrische Regressionsschätzung	46
nichtparametrische Verfahren	46
Niveau eines Tests	150
non-response bias	23
Normalverteilung	82, 98
Nullhypothese	148
P	
parametrische Verfahren	46
Placebo-Effekt	15

5. INDUKTIVE STATISTIK <u>29.09.2006</u>	166
Poisson-Verteilung	78, 97
Potenzmenge	59
Prinzip der Kleinsten-Quadrate	39, 46
R	
Regressionsrechnung	37
S	
Säulendiagramm	26
sampling bias	22
Scatterplot	38
Schätzfunktion	138
schließende Statistik	135
Schwaches Gesetz der großen Zahlen	127
Sonntagsfrage	20
Spannweite	34
stark konsistente Schätzung	136, 138
Starkes Gesetz der großen Zahlen	128
statistische Maßzahlen	33
statistischer Test	137, 149
stetig verteilt	97
Stetigkeit von oben	100
Stetigkeit von unten	100
Stichprobe	21, 24, 136, 138
Stichprobenraum	55
Streudiagramm	38
Streuung	35
Streuungsmaßzahlen	33
Studie	11, 13
... doppelblinde Studie	15
... prospektiv kontrollierte Studie	13
... prospektiv kontrollierte Studie mit Randomisierung	13, 14
... prospektiv kontrollierte Studie ohne Randomisierung	13
... retrospektiv kontrollierte Studie	13
Studiengruppe	13
T	
Test	137
... für eine Stichprobe	158

5. INDUKTIVE STATISTIK <u>29.09.2006</u>	167
...für zwei Stichproben	158
Testgröße	150
Teststatistik	150
Tschebyscheffsche Ungleichung	123
U	
Umfrage	20
Unabhängigkeit	98
Unabhängigkeit von Ereignissen	89
Ungleichung von Markov	123
Ungleichung von Tschebyscheff	123
Urnenmodell	54
V	
Variable	25
Varianz: Definition	121
...Eigenschaften	122, 124, 125
Variationsbreite	34
Variationskoeffizient	35
Verteilung	96
Verteilungsfunktion: Definition	99
...Eigenschaften	99
Verzerrung durch Auswahl	22
Verzerrung durch Nicht-Antworten	23
W	
W-Raum	63
...Laplacescher W-Raum	68
...mit Dichte	80
...mit Zähldichte	74
Wahrscheinlichkeit	64
Wahrscheinlichkeitsmaß	63
Z	
Zähldichte	74, 96
Zentraler Grenzwertsatz	130
Ziehen: mit Berücksichtigung der Reihenfolge	50, 53

...mit Zurücklegen	50, 51, 53
...ohne Berücksichtigung der Reihenfolge	50, 51, 53
...ohne Zurücklegen	50, 53
Zufallsexperiment	55
Zufallsvariable	91
...binomialverteilte Zufallsvariable	96
...diskrete Zufallsvariable	96
...exponential-verteilte Zufallsvariable	97
...gleichverteilte Zufallsvariable	97
...normalverteilte Zufallsvariable	98
...Poisson-verteilte Zufallsvariable	97
...reelle Zufallsvariable	91
...stetig verteilte Zufallsvariable	97
zweiseitige Testprobleme	149