



14.05.2007

### 3. Übung

#### Splineapproximation SS 2007

**Aufgabe 10:** [M] a) Was ist falsch an der folgenden Argumentation? Sei  $Q$  ein Quasi-Interpolant der Ordnung  $n$ , dann gilt

$$(\cdot - \tau)^{n-1} = Q(\cdot - \tau)^{n-1} = \sum_j (Qb_j^n) \psi_j^n(\tau) = \sum_j b_j^n \psi_j^n(\tau).$$

Also erfüllen die Funktionen  $\{Qb_j^n\}_j$  die Marsdenidentität und stimmen deshalb mit den B-Splines  $\{b_j^n\}_j$  überein,

$$Qb_j^n = b_j^n.$$

Damit ist jeder Quasi-Interpolant maximaler Ordnung ein Projektor.

**Aufgabe 11:** [M] Gegeben sei die uniforme Knotenfolge  $\tau_j = jh$  für Splines der Ordnung 2.

a) Bestimmen Sie die Schar der Gewichte  $\alpha, \beta, \gamma$ , für die der Quasiinterpolant

$$Qg := \sum_j b_j^2 (\alpha g(jh) + \beta g((j+1)h) + \gamma g((j+2)h))$$

maximale Ordnung hat.

b) Bestimmen Sie unter allen Gewichten gemäß Teil a) diejenigen, die  $\max_j \|Q_j\|_\infty$  minimieren. Wie lautet die Fehlerabschätzung für  $|g(t) - (Qg)(t)|$  in diesem Fall?

c) Bestimmen Sie unter allen Gewichten gemäß Teil a) diejenigen, für die der Fehler

$$\|p - Qp\|_\infty$$

bei Approximation eines quadratischen Polynoms  $p \in \mathbb{P}_3$  minimal wird.

**Aufgabe 12:** [M] a) Gegeben sei die uniforme Knotenfolge  $\tau_j = j$  mit Greville-Abszissen  $\mu_j$  für Splines der Ordnung 3. Bestimmen Sie die Schar der Quasiinterpolanten der Form

$$Qg = \sum_j b_j^3 (\alpha g(\mu_j + a) + \beta g(\mu_j + b))$$

mit maximaler Ordnung und diskutieren Sie das Ergebnis.

b) Untersuchen Sie den Grenzübergang  $a \rightarrow b$ .

**Aufgabe 13:** [P] a) Schreiben Sie ein Matlab-Programm

$$[P, T] = \text{LinQuasiInt}(g, \alpha, \beta, \gamma, N),$$

das den linearen Quasiinterpolant  $Qg = B^2P$  mit Knoten

$$T = -h : h : 1 + h, \quad h := 1/N,$$

auf dem Intervall  $[0, 1]$  gemäß Aufgabe 11 berechnet. Dabei ist  $g$  ein String mit dem Namen einer Funktion, die mit Hilfe des Befehls `feval` ausgewertet werden kann.

b) Untersuchen Sie die Varianten gemäß 11b) und 11c) anhand der Funktion  $g(t) = \sin(\pi t)$  und diskutieren Sie das Ergebnis.