

Partielle Differentialgleichungen I

Matthias Geißert, Robert Haller-Dintelmann, Horst
Heck

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1. Einführung in die Problematik	0
1. Physikalische Motivation	0
2. Mathematische Problemstellung	0
Kapitel 2. Sobolevräume	3
1. L_p Räume (Erinnerung)	3
2. L_p Räume II	8
3. Sobolev Räume I.	15
4. Sobolev Räume II. – Einbettungssätze	19
5. Sobolev Räume III. - Gebiete	24
6. Sobolev Räume IV. Spurooperatoren	29
Kapitel 3. Elliptische Randwertproblem in L^2	32
1. Elliptische Randwertprobleme	32
2. L^2 -Regularitätstheorie	34
Kapitel 4. Temperierte Distributionen und die Fouriertransformation	40
1. Temperierte Distributionen	40
2. Die Fouriertransformation	42
Kapitel 5. Singuläre Integraloperatoren	50
1. Interpolation von Operatoren	50
2. Calderón-Zygmund-Theorie	54
3. Fouriermultiplikationsoperatoren	58
Kapitel 6. L^p -Theorie Elliptischer Randwertprobleme	62
1. Lösungstheorie in \mathbb{R}^d	62
2. Lösungstheorie in \mathbb{R}_+^d	64
3. Lösungstheorie in beschränkten Gebieten	66
4. Ausblick: Eine weitere Anwendung der Fouriertransformation	68
Kapitel 7. Evolutionsgleichungen – Das abstrakte Cauchy- Problem	69
1. Stark-stetige Operatorhalbgruppen	70
2. Der Satz von Hille-Yosida	79
3. Holomorphe C_0 -Halbgruppen	84
4. Das inhomogene Cauchy-Problem	90
Index	94

Einführung in die Problematik

1. Physikalische Motivation

Betrachte einen Stab aus Metall mit gegebener Temperaturverteilung. Nun wollen wir untersuchen wie die Wärme geleitet wird.

Annahmen:

- Stab (isoliert) wird parametrisiert durch das Intervall $[0, 1]$, $u(t, x) =$ Temperatur in x zum Zeitpunkt t .
- Konstanten: ρ Dichte, c spezifische Wärme
- $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ Wärmequelle
- Energie in Segment $[x_1, x_2]$: $E(x_2, x_1, t) \approx c\rho(x_2 - x_1)u(t, x_1)$
- Wärmeleitungsregel von Fourier: Sei $Q(t, x) =$ die Wärme durch Punkt x zum Zeitpunkt t

$$\frac{Q(t_2, x) - Q(t_1, x)}{t_2 - t_1} \approx -K_0 \frac{\partial}{\partial x} u(t_1, x) \quad K_0 \text{ Thermale Leitfähigkeit}$$

- Energieerhaltung:

$$\begin{aligned} & c\rho(x_2 - x_1)(u(t_2, x_1) - u(t_1, x_1)) \\ = & (t_2 - t_1)(x_2 - x_1)f(x_1) - K_0(t_2 - t_1) \left(\frac{\partial}{\partial x} u(t_1, x_1) - \frac{\partial}{\partial x} u(t_1, x_2) \right). \end{aligned}$$

Daraus folgt

$$\frac{u(t_2, x_1) - u(t_1, x_1)}{t_2 - t_1} = \frac{f(x_1)}{c\rho} + \frac{K_0}{c\rho} \frac{\frac{\partial}{\partial x} u(t_1, x_2) - \frac{\partial}{\partial x} u(t_1, x_1)}{x_2 - x_1}$$

und damit

$$(1) \quad \frac{\partial}{\partial t} u(t, x) = \frac{f(x)}{c\rho} + \kappa \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(t, x),$$

wobei $\kappa = \frac{K_0}{c\rho}$ die thermische Diffusivität (eine Konstante) ist.

Stationäre Temperaturverteilung (Gleichgewicht, steady state):

$$0 = \frac{\partial}{\partial t} u(t, x) \xrightarrow{u(t,x)=v(x)} 0 = f(x) + \Delta v(x) \implies \Delta v(x) = -f(x).$$

2. Mathematische Problemstellung

Es sei $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ offen und beschränkt.

Gegeben: Stetige Funktion f auf $\overline{\Omega}$.

Gesucht: Stetige Funktion $u : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$, in Ω zweimal differenzierbar mit

$$(2) \quad \begin{cases} \Delta u(x) = \sum_{i=1}^d \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} u(x) = f(x) & \forall x \in \Omega \\ u(x) = 0(x) & \forall x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

Anwendung: Potential eines Ladungsfreies elektrisches Feldes.

u stationäre Temperaturverteilung

BEMERKUNG 2.1. Δ ist ein linearer Operator $\Delta(u + v) = \Delta u + \Delta v$.

Idee: Definiere den Laplace-Operator in geeigneten Räumen und untersuche Abbildungsvorschriften.

Sei z.B. $X := \{h : h \in C^2(\bar{\Omega}), h|_{\partial\Omega} = 0\}$ und $Y := C(\bar{\Omega})$ und betrachte $\Delta_{XY} : X \rightarrow Y$.

Typische Fragestellungen:

- Ist Δ_{XY} injektiv (d.h. die Lösung der Gleichung 2 ist eindeutig, falls sie existiert)
- Ist Δ_{XY} surjektiv (d.h. es existiert eine Lösung der Gleichung 2 für alle $f \in Y$).
- Finde möglichst einen großen Raum Y so dass Δ_{XY} surjektiv ist (d.h. die Gleichung ist für viele f lösbar).
- Da X typischerweise nicht explizit gegeben ist, finde möglichst viele Eigenschaften von X (d.h. Eigenschaften der Lösung).

BEMERKUNG 2.2. (a) Der Laplace-Operator besitzt keine guten Eigenschaften in $C(\bar{\Omega})$. Suche nach geeigneten Räumen führt auf Sobolev-Räume (reflexive Banachräume bzw. Hilberträumen).

Idee (L_2 -Theorie):

- Die Existenz einer schwachen Lösung lässt sich im Hilbertraumfall (L_2 -Theorie) sehr einfach über Lax-Milgram zeigen.
- Regularitätstheorie liefert dann eine starke bzw. klassische Lösung.

BEMERKUNG 2.3. Eine wichtige Rolle bei der Regularitätstheorie spielt die sogenannte Lokalisierung.

Idee (L_p -Theorie):

- Betrachte zunächst

$$(\lambda - \Delta)u(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

- Benutze die sog. *Fouriertransformation*. Die zentrale Eigenschaft dieser Abbildung ist, dass sie Differentialausdrücke in algebraische umwandelt. Im Fall $(\lambda - \Delta)$ erhält man

$$(\lambda + |\xi|^2)\mathcal{F}u = \mathcal{F}f.$$

Damit ist die formale Inverse von $(\lambda - \Delta)$ durch $u = \mathcal{F}^{-1}(\lambda + |\xi|^2)^{-1}\mathcal{F}f$ gegeben.

Typische Fragestellungen:

- (a) Wie kann man dem formalen Ausdruck $\mathcal{F}^{-1}(\lambda + |\xi|^2)^{-1}\mathcal{F}$ als Operator: $Y \rightarrow X$ einen Sinn zu geben?
- (b) Finde hinreichende Bedingungen, so dass $\mathcal{F}^{-1}(\lambda + |\xi|^2)^{-1}\mathcal{F}$ ein beschränkter Operator in L_p ist.

BEMERKUNG 2.4. *Auf diesem Weg werden wir auch erkennen, dass sich $T = \mathcal{F}^{-1}(\lambda + |\xi|^2)^{-1}\mathcal{F}$ auch als Integraloperator, d.h. $Tf(x) = \int k(x, y)f(y)dy$, darstellen lässt.*

Im letzten Abschnitt betrachten wir die Wärmeleitungsgleichung (1).

Idee:

- (a) Betrachte u als Funktion $t \rightarrow u(t, \cdot) \in X$, X ein Funktionenraum (Sobolevraum)
- (b) Sei Δ der Laplaceoperator und betrachte

$$\begin{aligned} u'(t) - \Delta u(t) &= 0, \quad t > 0 \\ u(0) &= u_0. \end{aligned}$$

Dies ist eine gewöhnliche DGL im Banachraum!

- (c) Ana III: Lösung ist $e^{\Delta t}u_0$.

Typische Fragestellungen

- (a) Vernünftige Definition für e^{tA} für große Klassen von (Differential-)operatoren.
- (b) Suche Bedingungen an A , so dass e^{tA} wohldefiniert ist

BEMERKUNG 2.5. *Für spezielle (in Physik und Ingenieurwissenschaften sehr relevante) Klassen von Differentialoperatoren, sog. Divergenzoperatoren, lässt sich zeigen, dass e^{tA} wieder ein Integraloperator ist (z.B. Laplace auf beliebigen offenen Mengen).*

Sobolevräume

1. L_p Räume (Erinnerung)

In diesem Abschnitt sei (M, Σ, μ) stets ein Maßraum.

DEFINITION 1.1.

- (a) Sei $1 \leq p < \infty$. Setze $\|f\|_p := \left(\int_M |f|^p d\mu \right)^{1/p}$.
- (b) Sei $f : M \rightarrow \mathbb{K}$ messbar. Dann heißt f wesentlich beschränkt, falls ein $\alpha > 0$ existiert mit $\mu(\{x \in X : |f(x)| > \alpha\}) = 0$. Ferner heißt
- $$\|f\|_\infty := \inf\{\alpha \geq 0 : \mu(\{x \in X : |f(x)| > \alpha\}) = 0\}$$
- das wesentliche Supremum von f .
- (c) Sei $1 \leq p \leq \infty$. Definiere
- $$\mathcal{L}^p := \mathcal{L}^p(M, \Sigma, \mu, \mathbb{K}) := \{f : f : M \rightarrow \mathbb{K} \text{ messbar und } \|f\|_p < \infty\}.$$

BEMERKUNG 1.2.

- (a) $\|\cdot\|_p$ ist eine Halbnorm auf \mathcal{L}^p .
- (b) Sei $f \in \mathcal{L}^p$. Dann ist $\|f\|_p = 0$ genau dann wenn
- $$f \in \mathcal{N} := \{f : f \text{ messbar und } f = 0 \text{ } \mu\text{-fast überall}\}.$$
- (c) \mathcal{L}^p ist ein Vektorraum.
- (d) \mathcal{N} ist ein Unterraum von \mathcal{M} , dem Vektorraum der messbaren Funktionen (auch von \mathcal{L}^p), und

$$f \sim g \iff f - g \in \mathcal{N}$$

definiert eine Äquivalenzrelation

DEFINITION 1.3. Der Raum L^∞ ist definiert durch:

$$L^\infty(M, \mu) := \mathcal{L}(M, \Sigma, \mu, \mathbb{K})/\mathcal{N}, \quad \|[f]\|_\infty := \|f\|_\infty, \quad \forall [f] \in L^\infty.$$

SATZ 1.4.

- (a) $|f| \leq \|f\|_\infty$ μ -fast überall.
- (b) $\|\cdot\|_\infty$ ist ein Norm.
- (c) $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0 \implies$ es existiert ein $A \in \Sigma$ mit $\mu(A^c) = 0$ und $f_n \rightarrow f$ gleichmässig auf A .
- (d) $(L^\infty(M, \mu), \|\cdot\|_\infty)$ ist ein Banachraum.

DEFINITION 1.5. Sei $1 \leq p < \infty$

$$L^p(M, \mu) := (M, \Sigma, \mu, \mathbb{K})/\mathcal{N}, \quad \|[f]\|_p := \|f\|_p, \quad \forall [f] \in L^p.$$

SATZ 1.6 (Höldersche Ungleichung). Es sei $1 \leq p, q \leq \infty$ mit $1/p + 1/q = 1$ (interpretiere $1/\infty = 0$). Desweiteren seien $f \in L^p(M, \mu)$ und $g \in L^q(M, \mu)$. Dann ist $f \cdot g \in L^1(M, \mu)$ und

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q.$$

BEWEIS. Die Fälle $p = 1, \infty$ sind trivial. Seien $a, b \in \mathbb{R}_+$ und $f, g \neq 0$. Dann gilt

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \quad (\text{Youngsche Ungleichung}).$$

(Der Beweis dieser Ungleichung ist elementar.) Natürlich ist fg messbar. Seien $G := g/\|g\|_q$ und $F := f/\|f\|_p$. Anwendung der Youngsche Ungleichung in jedem Punkt $x \in M$ ergibt nach Integration

$$\int_M |F(x)G(x)| \, d\mu(x) \leq \int_M \frac{|F(x)|^p}{p} \, d\mu(x) + \int_M \frac{|G(x)|^q}{q} \, d\mu(x) = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

und die Behauptung folgt. \square

SATZ 1.7 (Minkowskische Ungleichung). Sei $1 \leq p < \infty$ und $f, g \in L^p(M, \mu)$. Dann gilt

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

SATZ 1.8 (Riesz–Fischer). Sei $1 \leq p < \infty$. Dann ist $L^p(M, \mu)$ vollständig.

SATZ 1.9. Nehmen wir an, dass $f_n \in L^p(M, \mu)$ gegen $f \in L^p(M, \mu)$ konvergiert, dann existiert eine Teilfolge f_{n_k} , so dass $f_{n_k}(x)$ μ -fast überall konvergiert.

SATZ 1.10 (Dualität). Sei $1 \leq p < \infty$, und (M, Σ, μ) σ -endlicher Maßraum. Sei $1/p + 1/q = 1$ (so genannte konjugierte Exponente). Dann definiert $L^q(M, \mu) \rightarrow L^p(M, \mu)'$

$$J(g)f := \int_M f \cdot g \, d\mu, \quad g \in L^q(M, \mu), f \in L^p(M, \mu),$$

einen isometrischen Isomorphismus.

BEWEIS. J ist wohldefiniert nach der Hölderschen Ungleichung. Natürlich ist J linear. J ist isometrisch, denn sei $g \in L^q(M, \mu)$ und setze

$$f := \frac{\bar{g}}{|g|} \left(\frac{|g|}{\|g\|_q} \right)^{q/p}.$$

Dann

$$\|f\|_p = \int_M \left(\frac{|\bar{g}|}{|g|} \right)^p \frac{|g|^q}{\|g\|_q^q} \, d\mu = 1$$

und $\int_M fg \, d\mu = \|g\|_q$. Es bleibt die Surjektivität von J zu zeigen.

1. Fall $\mu(M) < \infty$: Sei $\varphi \in L^p(M, \mu)'$. Betrachte $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{K}$, $\nu(A) := \varphi(\chi_A)$ ($\chi_A \in L^p(M, \mu)$). ν ist ein signiertes (komplexes) Maß. Ferner ist ν absolut stetig bezüglich μ , denn $A \in \Sigma$ und $\mu(A) = 0$ impliziert $\chi_A = 0$ μ -fast überall, d.h. $\chi_A = 0$ in $L^p(M, \mu)$, also $\nu(A) = \varphi(\chi_A) = 0$. Satz von Radony–Nikodým ergibt $g \in L^1(M, \mu)$ mit

$$\nu(A) = \int_A g \, d\mu = \int_M \chi_A g \, d\mu \quad \forall A \in \Sigma.$$

Also wegen Linearität

$$(3) \quad \varphi(f) = \int_M f g \, d\mu \quad \forall \text{ Treppenfunktionen } f.$$

Ferner $|\varphi(f)| \leq C' \|f\|_\infty$. Die Treppenfunktionen sind dicht in $L^\infty(M, \mu)$ also gilt (3) für $f \in L^\infty(M, \mu)$. Wir zeigen nun $g \in L^q(M, \mu)$. Sei erst $q < \infty$. Setze

$$(4) \quad f(x) := \begin{cases} \frac{|g(x)|^q}{g(x)} & g(x) \neq 0 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

f ist messbar und $|g|^q = f g = |f|^p$. Für $n \in \mathbb{N}$ sei $A_n := \{x \in M : |f(x)| \leq n\}$. Dann ist $\chi_{A_n} f \in L^\infty(M, \mu)$ und

$$\begin{aligned} \int_{A_n} |g|^q \, d\mu &= \int_M \chi_{A_n} f g \, d\mu = \varphi(\chi_{A_n} f) \leq \|\varphi\| \|\chi_{A_n} f\|_p = \\ &= \|\varphi\| \left(\int_{A_n} |f|^p \, d\mu \right)^{1/p} = \|\varphi\| \left(\int_{A_n} |g|^q \, d\mu \right)^{1/p} \\ &\implies \left(\int_{A_n} |g|^q \, d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|\varphi\| \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Satz von Beppo Levi(monotone Konvergenz) gibt $g \in L^q(M, \mu)$.

Jetzt betrachten wir der Fall $q = \infty$. Dann $|g| \leq \|\varphi\|$, denn sei $A := \{x \in M : |g(x)| > \|\varphi\|\}$. Setze $f := \chi_A |g|/g$, $f \in L^\infty(M, \mu)$. Nehmen wir $\mu(A) > 0$ an.

$$\mu(A) \|\varphi\| < \int_A |g| \, d\mu = \int_M f g \, d\mu = \varphi(f) \leq \|\varphi\| \cdot \|f\|_1,$$

und nach Annahme $\implies \mu(A) < \|f\|_1$, Widerspruch mit $\mu(A) = \|f\|_1$. Also $g \in L^\infty(M, \mu)$.

Die Treppenfunktionen sind dicht in $L^p(M, \mu)$ also $\varphi = Jg$.

2. Fall, $\mu(M) = \infty$: Es sei $M = \bigcup_{n=1}^\infty M_n$ mit $\mu(M_n) < \infty$, und M_n paarweise disjunkt. Sei $\varphi \in L^p(M, \mu)'$. Setze $\varphi_n(f) := \varphi(\chi_{M_n} f)$, für $f \in L^p(M_n, \mu_n)$, wobei $\mu_n(A) := \mu(M_n \cap A)$. Dann $\|\varphi_n\| \leq \|\varphi\|$, insbesondere $\varphi_n \in L^p(M_n, \mu_n)'$. Verwende jetzt den ersten Fall um $g_n \in L^q(M_n, \mu_n)$ zu

bekommen. Setze $g := \sum_{n=1}^{\infty} g_n$ (in jedem Punkt nur ein Summand, g_n wird durch 0 fortgesetzt auf M_n^c). Es ist $g \in L^q(M, \mu)$ und $\varphi = Jg$ zu zeigen. Sei $A_n := \bigcup_{j=1}^n M_j$ und f wie in (4)

$$\begin{aligned} \int_{A_n} |g|^q d\mu &= \sum_{j=1}^n \int_{M_j} fg d\mu = \sum_{j=1}^n \int \chi_{M_j} f g_j d\mu = \sum_{j=1}^n \varphi(\chi_{M_j} f) \\ &= \varphi\left(\sum_{j=1}^n \chi_{M_j} f\right) \leq \sum_{j=1}^n \|\varphi\| \|\chi_{M_j} f\|_p \\ &= \|\varphi\| \cdot \left(\sum_{j=1}^n \int \chi_{M_j} |f|^p d\mu\right)^{1/p} = \|\varphi\| \cdot \left(\int_{A_n} |g|^q d\mu\right)^{1/p}. \end{aligned}$$

Daraus folgt $(\int_{A_n} |g|^q d\mu)^{\frac{1}{q}} \leq \|\varphi\|$, und nach Beppo Levi Theorem $g \in L^q(M, \mu)$. Es gilt:

$$\begin{aligned} \varphi(f) &= \varphi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{A_n} f\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(\chi_{A_n} f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} fg \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_M \chi_{A_n} fg \stackrel{\text{Lebesgue}}{=} \int_M fg. \end{aligned}$$

□

SATZ 1.11 (L^p Interpolation Ungleichung). *Seien $p_0, p_1 \in [1, \infty]$, $\theta \in (0, 1)$ und $\frac{1}{p_\theta} := \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$. Sind $f \in L^{p_0}(M, \mu) \cap L^{p_1}(M, \mu)$, dann ist $f \in L^{p_\theta}(M, \mu)$ und es gilt*

$$\|f\|_{p_\theta} \leq \|f\|_{p_0}^{1-\theta} \|f\|_{p_1}^\theta.$$

BEWEIS. Setze $g := |f|^{(1-\theta)p_\theta}$ und $h := |f|^{\theta p_\theta}$. Dann ist $gh = |f|^{(1-\theta)p_\theta + \theta p_\theta} = |f|^{p_\theta}$, ferner $g \in L^{\frac{p_0}{(1-\theta)p_\theta}}(M, \mu)$ und $h \in L^{\frac{p_1}{\theta p_\theta}}(M, \mu)$ und

$$\|f\|_{p_\theta}^{p_\theta} = \|gh\|_1 \leq \|g\|_{\frac{p_0}{(1-\theta)p_\theta}} \cdot \|h\|_{\frac{p_1}{\theta p_\theta}} = \|f\|_{p_0}^{(1-\theta)p_\theta} \cdot \|f\|_{p_1}^{\theta p_\theta},$$

mit der Verwendung der Hölderschen Ungleichung. □

SATZ 1.12 (Verallgemeinerte Hölder-Ungleichung). *Sei $n \in \mathbb{N}$ und $1 \leq p_i \leq \infty$, $f_i \in L^{p_i}$ für $i = 1, \dots, n$. Sei ferner $1 \leq p \leq \infty$ so, dass $\frac{1}{p} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i}$. Dann gilt*

$$\prod_{i=1}^n f_i \in L^p \quad \text{und} \quad \left\| \prod_{i=1}^n f_i \right\|_p \leq \prod_{i=1}^n \|f_i\|_{p_i}.$$

BEWEIS. ÜA. □

DEFINITION UND SATZ 1.13. (a) $L^1 \cap L^\infty(M, \mu) := L^1(M, \mu) \cap L^\infty(M, \mu)$ versehen mit der Norm $\|f\|_{1 \cap \infty} := \|f\|_1 + \|f\|_\infty$ ist ein Banachraum.

(b) Definiere

$$L^1 + L^\infty(M, \mu) := \{f : M \rightarrow \mathbb{K} \text{ mb.} : \exists g \in L^1(M, \mu), h \in L^\infty(M, \mu) \\ \text{mit } f = g + h\}.$$

Die Abbildung

$$\|f\|_{1+\infty} := \inf\{\|h\|_1 + \|g\|_\infty : f = g + h : g \in L^1(M, \mu), h \in L^\infty(M, \mu)\}.$$

ist eine Norm, mit der $L^1 + L^\infty$ ein Banachraum ist.

SATZ 1.14. Sei $1 \leq p \leq \infty$. Dann gilt $L_p(M, \mu) \subseteq L_1 + L_\infty(M, \mu)$.

BEWEIS. Der Fall $p = \infty$ ist trivial. Sei $f \in L^p(M, \mu)$. Setze $A := \{x \in M : |f(x)| \geq 1\}$ und $h := \chi_A f$, $g := \chi_{M \setminus A} f$. Dann $g \in L^\infty(M, \mu)$ und $h \in L^1(M, \mu)$, denn

$$\int_M |h| \, d\mu = \int_A |f| \, d\mu \leq \int_A |f|^p \, d\mu \leq \int_M |f|^p \, d\mu.$$

□

THEOREM 1.15 (Riesz–Thorin Konvexitätstheorem). Sei $T : L_1 + L_\infty \rightarrow L_1 + L_\infty$ linear, ferner seien $p_0, p_1, r_0, r_1 \in [1, \infty]$ mit $p_0 < p_1$ und $r_0 < r_1$. Sei $\alpha \in (0, 1)$ und setze

$$\frac{1}{p_\alpha} := \frac{1-\alpha}{p_0} + \frac{\alpha}{p_1} \quad \text{und} \quad \frac{1}{r_\alpha} := \frac{1-\alpha}{r_0} + \frac{\alpha}{r_1}.$$

Dann gilt

$$\|T\|_{\mathcal{L}(L^{p_\alpha}, L^{r_\alpha})} \leq \|T\|_{\mathcal{L}(L^{p_0}, L^{r_0})}^{1-\alpha} \|T\|_{\mathcal{L}(L^{p_1}, L^{r_1})}^\alpha.$$

Zur Beweis benötigen wir folgenden Satz und folgendes Lemma.

SATZ 1.16 (Hadamard, 3-Linien Satz). Sei $a < b$ und $f : \{z \in \mathbb{C} : a \leq \operatorname{Re} z \leq b\} \rightarrow \mathbb{C}$ analytisch und beschränkt. Weiter sei

$$M_a = \sup_{t \in \mathbb{R}} |f(a + it)|, \quad \text{und} \quad M_b = \sup_{t \in \mathbb{R}} |f(b + it)|.$$

Dann gilt:

$$|f(x + iy)| \leq M_a^{\frac{b-x}{b-a}} M_b^{\frac{x-a}{b-a}}, \quad x + iy \in \{z \in \mathbb{C} : a \leq \operatorname{Re} z \leq b\}.$$

BEWEIS. Wir betrachten $f_\varepsilon(x+iy) = e^{\varepsilon(x+iy)^2} f(x+iy) M_a^{\frac{x+iy-b}{b-a}} M_b^{\frac{a-(x+iy)}{b-a}}$ für $\varepsilon > 0$. Dann gilt $|f_\varepsilon(a+iy)| \leq e^{\varepsilon a^2}$ und $|f_\varepsilon(b+iy)| \leq e^{\varepsilon b^2}$ (Beachte: $|a^{iy}| = 1$ für $a > 0$, $y \in \mathbb{R}$). Außerdem gilt

$$\lim_{y \rightarrow \pm\infty} \sup_{a \leq x \leq b} |f_\varepsilon(x+iy)| = 0.$$

Mit dem Maximumprinzip für analytische Funktionen und ein hinreichend großes Rechteck folgt $|f_\varepsilon(z)| \leq \max\{e^{\varepsilon a^2}, e^{\varepsilon b^2}\}$. Aus $\varepsilon \rightarrow 0^+$ folgt die Behauptung. □

LEMMA 1.17. Sei $p_0 < p < p_1$ und $f = \sum \alpha_j a_j \chi_{E_j}$ eine Treppenfunktion mit $\alpha_j \in \mathbb{C}$, $|\alpha_j| = 1$, $a_j > 0$ und $\{E_j\}$ paarweise, disjunkte, mb. Mengen mit (jeweils) endlichem Maß. Weiter sei $\|f\|_p = 1$ und

$$f_z = \sum \alpha_j a_j^{\frac{p}{p_z}} \chi_{E_j},$$

wobei p_z

$$\frac{1}{p_z} = \frac{1-z}{p_0} + \frac{z}{p_1}$$

genügt. Dann gilt:

$$\|f_z\|_{L^{p_{\operatorname{Re} z}}} = 1, \quad 0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1.$$

BEWEIS. Es gilt

$$\int |f_z(x)|^{p_{\operatorname{Re} z}} d\mu \stackrel{\text{Ü.A.}}{=} \sum |a_j|^p \mu(E_j) = \|f\|_p^p = 1.$$

□

BEWEIS V. THEOREM 1.15. Sei $p = p_\alpha$ mit $0 < \alpha < 1$ und betrachte Treppenfunktion f und f' auf M , welche $\|f\|_p = \|f'\|_{p'} = 1$ erfüllen. Sei f_z und f'_z wie in Lemma 1.17, wobei f_z mit p_0 und p_1 und f'_z mit r_0 und r_1 konstruiert werden. Nach Voraussetzung ist

$$\Phi(z) := \int_M f'_z(x) T f_z(x) d\mu(x)$$

analytisch in z . Mit der Hölder-Ungleichung und Lemma 1.17 folgt nun:

$$|\Phi(j + iy)| \leq \|f'_z\|_{p'} M_j \|f_z\|_p \leq M_j, \quad j = 0, 1, \quad y \in \mathbb{R}$$

d.h.

$$\sup_{y \in \mathbb{R}} |\Phi(j + iy)| \leq M_j, \quad j = 0, 1.$$

Damit folgt mit dem 3-Linien Satz, dass

$$\left| \int f' T f \right| \leq M_0^{1-\alpha} M_1^\alpha.$$

Da Treppenfunktionen dicht in $L^{p'}$ sind, erhalten wir $\|Tf\|_p \leq M_0^{1-\alpha} M_1^\alpha$. Die Behauptung folgt nun, da Treppenfunktionen auch in L^p dicht sind. □

2. L_p Räume II

Im Folgenden sei μ stets das Lebesgue-Maß und Σ die σ -Algebra der Lebesgue-messbaren Mengen.

SATZ 2.1 (Faltung, Youngsche Ungleichung). Sei $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $g \in L^p(\mathbb{R}^d)$, $1 \leq p \leq \infty$. Dann gilt

$$(a) \text{ Für fast alle } x \in \mathbb{R}^d \text{ ist } y \mapsto f(x-y)g(y) \in L^1(\mathbb{R}^d)$$

(b) Setzt man

$$(f * g)(x) := \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y) \, dy$$

so ist $f * g \in L^p(\mathbb{R}^d)$ und es gilt

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_p \quad 1 \leq p \leq \infty.$$

BEWEIS. Sei $p = 1$. Dann gilt:

$$\int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)g(y)| \, dy \, dx \stackrel{\text{Tonelli}}{=} \int_{\mathbb{R}^d} |g(y)| \int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)| \, dx \, dy \leq \|f\|_1 \|g\|_1.$$

Für $p = \infty$ liefert die Hölder-Ungleichung

$$\left| \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y) \, dy \right| \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty,$$

insbesondere existiert $\int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y) \, dy$ für alle $x \in \mathbb{R}^d$.

Betrachte nun die Abbildung $T_f g := f * g$. Dann folgt aus dem Riesz-Thorin Konvexitätstheorem, dass $T_f \in \mathcal{L}(L^p, L^p)$ und $\|T_f\|_{\mathcal{L}(L^p, L^p)} \leq \|f\|_1$ für $1 \leq p \leq \infty$, d.h. (b) gilt. Ferner erhalten wir mit Beppo-Levi

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)||g(y)| \, dy \right)^p \, dx \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)||\chi_{B(0,r)}g(y)| \, dy \right)^p \, dx \\ &\leq \lim_{r \rightarrow \infty} \|f\|_1 \|\chi_{B(0,r)}g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p, \end{aligned}$$

d.h.

$$\left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)||g(y)| \, dy \right)^p < \infty, \text{ f.a. } x \in \mathbb{R}^d.$$

□

BEISPIEL 2.2.

(a) Betrachte die partielle Differentialgleichung

$$(1 - \Delta)u(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

Dann existiert für jedes $f \in L^p$ eine eindeutige Lösung u . Desweiteren besitzt u die Darstellung

$$u(x) = (k * f)(x), \quad x \in \mathbb{R}^d,$$

mit einem Kern $k \in L^1$.

(b) Betrachte

$$\begin{aligned}\partial_t u(t, x) - \Delta u(t, x) &= 0, \quad t > 0, \quad x \in \mathbb{R}^d \\ u(0, x) &= u_0(x), \quad x \in \mathbb{R}^d.\end{aligned}$$

Dann existiert für jedes $u_0 \in L^p$ eine eindeutige Lösung u . Desweiteren besitzt u die Darstellung

$$u(t, x) = (k_t * u_0)(x), \quad t > 0, \quad x \in \mathbb{R}^d,$$

mit $k_t \in L^1$ für $t > 0$.

Im Folgenden benötigen wir den Raum der lokal integrierbaren Funktionen $L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$. Genauer,

$$L^1_{loc}(\mathbb{R}^d) := \left\{ f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C} \text{mb.} : \|f\|_{L^1(K)} < \infty \text{ für alle kp. } K \subset \mathbb{R}^d \right\}.$$

KOROLLAR 2.3. Sei $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, dann definiert die Abbildung $Tf := f * g$ einen stetigen linearen Operator auf $L^p(\mathbb{R}^d)$ mit $\|T\| \leq \|f\|_1$.

SATZ 2.4. Sei $f \in C_c(\mathbb{R}^d)$, $g \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$. Dann $f * g \in C(\mathbb{R}^d)$.

BEWEIS. Wegen

$$|(f * g)(x)| = \int_{\mathbb{R}^d} f(x - y)g(y) \, dy \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty$$

existiert $(f * g)(x) = \int f(x - y)g(y) \, dy$ für alle $x \in \mathbb{R}^d$. Sei $x_n \rightarrow x$. Wir zeigen $(f * g)(x_n) \rightarrow (f * g)(x)$. Setze

$$F_n(y) = f(x_n - y)g(y) \text{ und } F(y) = f(x - y)g(y),$$

dann gilt $F_n(y) \rightarrow F(y)$ für fast alle $y \in \mathbb{R}^d$. Andererseits, sei K kompakt so, dass $x_n - \text{supp } f \subseteq K$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann $x_n - y \notin \text{supp } f$ falls $y \notin K$, d.h. $f(x_n - y) = 0$ für $y \notin K$. Daher ist $|F_n(y)| \leq \|f\|_\infty \chi_K(y) |g(y)|$ eine integrierbare Majorante. Nach dem Lebesgueschen Satz folgt $\int F_n \, dy \rightarrow \int F \, dy$. \square

DEFINITION 2.5. Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ messbar und setze

$$O_f := \left\{ x \in \Omega : \exists V \subset \Omega \text{ offene Umgebung von } x \right. \\ \left. \text{mit } f(x) = 0 \text{ für f.a. } x \in V \right\}$$

Dann heißt $\text{supp } f := \Omega \setminus O_f$ der Träger von f .

SATZ 2.6. Sei $f \in C_c(\mathbb{R}^d)$, $g \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$. Dann gilt

$$(5) \quad \text{supp}(f * g) \subseteq \overline{\text{supp } f + \text{supp } g}$$

BEWEIS. Wegen $|(f * g)(x)| \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty$ existiert $(f * g)(x) = \int f(x - y)g(y) dy$ für alle $x \in \mathbb{R}^d$. Also

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x - y)g(y) dy = \int_{(x - \text{supp } f) \cap \text{supp } g} f(x - y)g(y) dy.$$

Falls $x \notin \text{supp } f + \text{supp } g$, gilt $(x - \text{supp } f) \cap \text{supp } g = \emptyset$ und $(f * g)(x) = 0$. \square

BEMERKUNG 2.7. Im Satz 2.6 gilt $\overline{\text{supp } f + \text{supp } g} = \text{supp } f + \text{supp } g$.

BEMERKUNG 2.8. Die obige Aussage (5) gilt auch für $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $g \in L^p(\mathbb{R}^d)$, $1 \leq p \leq \infty$.

SATZ 2.9. Seien $f \in C_c^k(\mathbb{R}^d)$, $g \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^d)$. Dann ist $f * g \in C^k(\mathbb{R}^d)$, und $D^\alpha(f * g) = D^\alpha f * g$. Insbesondere $f \in C_c^\infty$, $g \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^d) \implies f * g \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$.

BEWEIS. Wie immer existiert $(f * g)(x)$ für alle x . Sei $e_j \in \mathbb{R}^d$ ein Standardbasisvektor, $h \in \mathbb{R}$, $|h| \leq 1$. Setze $K := \text{supp } f + \overline{B}(0, 1)$, dies ist auch kompakt. Dann gilt (Differenzenquotient):

$$\begin{aligned} & \frac{1}{h}((f * g)(x + he_j) - (f * g)(x)) \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{h}(f(x + he_j - y)g(y) - f(x - y)g(y)) dy = \\ &= \int_{K-x} \frac{1}{h}(f(x + he_j - y)g(y) - f(x - y)g(y)) dy, \end{aligned}$$

wobei der Integrand gegen $D_j f(x - y)g(y)$ für alle y konvergiert. Außerdem gilt

$$\left| \frac{1}{h}(f(x + he_j - y)g(y) - f(x - y)g(y)) \right| \leq \|D_j f\|_\infty |g(y)| \chi_K(y).$$

Nach dem Satz von Lebesgue (Beachte: $g \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^d)$) bekommen wir $D_j(f * g)(x) = ((D_j f) * g)(x)$, und so die Behauptung. \square

DEFINITION 2.10. Eine Folge $(\rho_n)_{n \geq 1}$ von Funktionen mit den Eigenschaften

- | | |
|---|---|
| (a) $\rho_n \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ | (c) $\text{supp } \rho_n \subseteq B(0, 1/n)$ |
| (b) $\rho_n \geq 0$ | (d) $\int_{\mathbb{R}^d} \rho_n = 1$ |

heißt Mollifier.

BEISPIEL 2.11. Betrachte $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, $\text{supp}(\rho) \subseteq B(0, 1)$, $\rho \geq 0$, $\int \rho = 1$, und definiere $\rho_n(x) := 1/n^d \rho(nx)$.

LEMMA 2.12. Sei $f \in C(\mathbb{R}^d)$ und $(\rho_n)_{n \geq 1}$ ein Mollifier. Dann konvergiert $\rho_n * f \rightarrow f$ gleichmäßig auf kompakten Teilmengen von \mathbb{R}^d .

BEWEIS. Sei $K \subseteq \mathbb{R}^d$ kompakt. Dann existiert für alle $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ mit $|f(x-y) - f(x)| \leq \varepsilon$ für $x \in K$ und $|y| \leq \delta$. Also

$$\begin{aligned} (\rho_n * f)(x) - f(x) &= \int_{\mathbb{R}^d} (f(x-y) - f(x)) \rho_n(y) \, dy \\ &= \int_{B(0,1/n)} (f(x-y) - f(x)) \rho_n(y) \, dy, \end{aligned}$$

so für $n > 1/\delta$ gilt $|(\rho_n * f)(x) - f(x)| \leq \varepsilon \int \rho_n = \varepsilon$ für $x \in K$. \square

LEMMA 2.13 (Urysohn, C^∞ -Version). Sei $\emptyset \neq \Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ offen, $K \subseteq \Omega$, K kompakt. Dann existiert ein $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ mit $0 \leq \varphi \leq 1$ und $\varphi(x) = 1$ für $x \in K$.

BEWEIS. Sei $0 < 1/n < \varepsilon < \varepsilon + 1/n < \text{dist}(K, \Omega^c)$. Setze $U_\varepsilon := \{y \in \Omega : \text{dist}(y, K) < \varepsilon\} \subseteq \Omega$ und $u = \chi_{U_\varepsilon}$. Dann gilt $\varphi := \rho_n * u \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ und $\text{supp } \varphi \subseteq \overline{B(0, 1/n)} + \overline{U_\varepsilon} \subseteq \Omega$, also $\text{supp } \varphi \subseteq \Omega$ ist kompakt. Sei $x \in K$, dann $\varphi(x) = \int_{|y| \leq 1/n} u(x-y) \rho_n(y) \, dy = \int_{|y| \leq 1/n} \rho_n(y) \, dy = 1$. Ferner $\|\varphi\|_\infty \leq \|\rho_n\|_1 \cdot \|u\|_\infty = 1$. Da $\varphi \geq 0$ folgt auch $0 \leq \varphi \leq 1$. \square

BEMERKUNG 2.14. Sei $\emptyset \neq \Omega \subset \mathbb{R}^d$ offen und $K \subset \Omega$ kompakt. Dann existiert $V \subset \mathbb{R}^d$ offen mit \overline{V} kompakt und

$$K \subset V \subset \overline{V} \subset \Omega.$$

BEWEIS. Sei $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ wie in Lemma 2.13 und setze

$$V := \{x \in \Omega; \varphi(x) > \frac{1}{2}\}.$$

\square

SATZ 2.15. Sei $1 \leq p < \infty$. Dann ist $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ dicht in $L^p(\mathbb{R}^d)$.

BEWEIS. Sei $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$.

Beh.: $\forall \varepsilon > 0 \exists$ Treppenfunktion $T = \sum_{i=1}^N \alpha_i \chi_{A_i}$ mit $A_i \subset \mathbb{R}^d$ beschränkt und $\|T - f\|_p \leq \varepsilon$, bekannt aus der Maßtheorie.

Beh.: $\forall \varepsilon > 0 \exists u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d) : \|u - \chi_{A_i}\|_p \leq \varepsilon$.

Wähle eine offene Menge O und eine kompakte Menge K mit $K \subset A_i \subset O$ und $|O \setminus K| \leq \varepsilon$ (Existenz: Maßtheorie). Dann existiert nach Lemma 2.13 ein $\varphi \in C_c^\infty(O)$ mit $\varphi \equiv 1$ auf K . Es gilt:

$$\int_O |\chi_{A_i} - \varphi|^p = \int_{O \setminus K} |\chi_{A_i} - \varphi|^p \leq 2^p |O \setminus K| \leq 2^p \varepsilon.$$

\square

SATZ 2.16. Sei $(\rho_n)_{n \geq 1}$ ein Mollifier.

(a) Sei $1 \leq p < \infty$ und $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$. Dann $\|\rho_n * f - f\|_p \rightarrow 0$.

(b) Sei $f \in BUC(\mathbb{R}^d)$. Dann $\|\rho_n * f - f\|_\infty \rightarrow 0$

BEWEIS. (a) Nach Satz 2.15 existiert für $\varepsilon > 0$ ein $g \in C_c(\mathbb{R}^d)$ mit $\|f - g\| \leq \varepsilon$. Satz 2.6 liefert

$$\text{supp}(\rho_n * g) \subseteq \overline{B(0, 1/n)} + \text{supp } g \subseteq K, \quad \text{wobei } K \text{ kompakt.}$$

Da nach Lemma 2.12 $\rho_n * g$ gleichmässig auf K gegen g konvergiert, existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$\|\rho_n * g - g\|_p^p = \int_K |\rho_n * g - g|^p \leq \varepsilon^p |K|.$$

Daraus folgt mit der Youngschen Ungleichung

$$\begin{aligned} \|\rho_n * f - f\|_p &\leq \|\rho_n * (f - g)\|_p + \|\rho_n * g - g\|_p + \|g - f\|_p \\ &\leq \|f - g\|_p + \|\rho_n * g - g\|_p + \|g - f\|_p \leq \varepsilon + \varepsilon |K|^{\frac{1}{p}} + \varepsilon. \end{aligned}$$

(b) Wiederhole den Beweis von Lemma 2.12. □

KOROLLAR 2.17. Sei $\emptyset \neq \Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ offen und $1 \leq p < \infty$. Dann ist $C_c^\infty(\Omega)$ dicht in $L^p(\Omega)$.

BEWEIS. Setze $\Omega_n := \{x \in \Omega : \text{dist}(x, \Omega^c) > \frac{1}{n}\}$ und

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x) & , \quad x \in \Omega_n \\ 0 & , \quad \text{sonst} \end{cases}$$

Dann gilt nach dem Satz von Lebesgue $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^p(\Omega)} = 0$, d.h. für $\varepsilon > 0$ existiert ein n_0 mit $\|f_n - f\|_{L^p(\Omega)} \leq \varepsilon$.

Setze $g_m := \rho_m * f_n$, wobei ρ_m ein Mollifier ist. Dann existiert nach Satz 2.16 ein $m_0 > n_0$ mit $\|g_m - f_{n_0}\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leq \varepsilon$, $m \geq m_0$. Des Weiteren gilt

$$\text{supp } g_m = \text{supp } \rho_m + \text{supp } f_{n_0} \subset \Omega, \quad m \geq m_0.$$

Damit erhalten wir

$$\|g_m - f\|_{L^p(\Omega)} \leq \|g_m - f_{n_0}\|_{L^p(\Omega)} + \|f_{n_0} - f\|_{L^p(\Omega)} \leq 2\varepsilon, \quad m \geq m_0. \quad \square$$

SATZ 2.18 (Zerlegung der Eins). Seien $\Omega, \Omega_i \subseteq \mathbb{R}^d$ offen. Seien ferner

$$K_i \subset \Omega_i \subset \overline{\Omega}_i \subset \Omega, \quad i \in \mathbb{N},$$

mit $K_i, \overline{\Omega}_i$ kompakt und

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} \Omega_i = \Omega,$$

so, dass für alle $x \in \Omega$ eine Umgebung $U(x)$ existiert, welche nur endlich viele Ω_j trifft (diese Überdeckung heißt lokal endlich). Nehmen wir ferner an, dass $K_j \cap K_i = \emptyset$, falls $i \neq j$.

Dann existieren $\varphi_i \in C_c^\infty(\Omega)$, $i \in \mathbb{N}$ mit

- (a) $\varphi_i \geq 0$
- (b) $\sum_{i \in \mathbb{N}} \varphi_i(x) = 1$, falls $x \in \Omega$
- (c) $\text{supp } \varphi_i \subset \Omega_i$

$$(d) 0 \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \varphi_i \leq 1.$$

Außerdem gilt $\varphi_j(x) = 1$ für $x \in K_j$.

BEWEIS. 1. Schritt: Nehmen wir an dass wir die folgende Situation haben

$$K_j \subseteq V_j \subseteq \overline{V_j} \subseteq U_j \subseteq \Omega_j$$

wobei $\overline{V_j}$ kompakt, $U_i \cap K_j = \emptyset$ falls $i \neq j$ und V_j, U_j sind lokal endliche Überdeckungen von Ω . Wähle φ'_j nach Lemma 2.13 zu U_j und $\overline{V_j}$. Dann gilt $\varphi(x) := \sum_{i \in \mathbb{N}} \varphi'_i(x) > 0$, wobei lokal in Ω nur endlich viele Summanden von 0 verschieden sind. Setze $\varphi_j(x) := \varphi'_j(x)/\varphi(x)$. Nach Konstruktion haben die φ_j die gewünschte Eigenschaften.

2. Schritt, Disjunktisierung von Ω_j und K_j : $U_j := \Omega_j \setminus \bigcup_{i \neq j} K_i$. Natürlich gilt $K_j \subseteq U_j \subseteq \Omega_j$. Wir behaupten, dass U_j offen ist. Sei $x \in U_j$ und $U(x) \subseteq \Omega_j$ eine Umgebung von x so, dass $J := \{i : \Omega_i \cap U(x) \neq \emptyset\}$ endlich ist. Für $j \neq k \in J$ existiert eine Umgebung $W_k(x) \subseteq U(x)$ von x mit $W_k(x) \cap K_k = \emptyset$. Setze $W(x) := \bigcap_{k \in J} W_k(x)$, die ist eine Umgebung von x mit $W(x) \subseteq U_j$ und $W(x) \cap K_i = \emptyset$ für alle $i \in \mathbb{N}$, $i \neq j$, also U_j ist offen. Sei jetzt $x \in \Omega$, liegt dann $x \in \Omega_j$ für ein j , dann liegt es entweder in U_j oder in K_i für ein $i \neq j$. Die Überdeckung U_j ist lokal endlich, da Ω_j lokal endlich ist.

3. Schritt, Konstruktion von V_j : Sei $V_1 := U_1$. Angenommen V_j , $j < n$ konstruiert ist mit der Eigenschaft

$$\bigcup_{j=1}^{n-1} V_j \cup \bigcup_{j=n}^{\infty} U_j = \Omega,$$

sei F_n eine abgeschlossene Umgebung von ∂U_n die erfüllt

$$\partial U_n \subseteq F_n \subseteq \bigcup_{j=1}^{n-1} V_j \cup \bigcup_{j=n+1}^{\infty} U_j.$$

Solche eine Umgebung existiert nach Bemerkung 2.14. Falls $U_n \neq \emptyset$, können wir eine kleinere Umgebung $\partial U_n \subseteq F'_n \subseteq F_n$ finden damit $U_n \setminus F'_n$ nichtleer wird. Setze $V_n := U_n \setminus F'_n$. Dann

$$U_n \subseteq V_n \cup F'_n \subseteq \bigcup_{j=1}^n V_j \cup \bigcup_{j=n+1}^{\infty} U_j.$$

Also V_j ist eine offene Überdeckung, die natürlich lokal endlich bleibt. \square

SATZ 2.19 (Zerlegung der Eins). Sei $K \subseteq \mathbb{R}^d$ kompakt und $K \subseteq \bigcup_{i=1}^n \Omega_i$, mit $\Omega_i \subseteq \mathbb{R}^d$ offen. Dann existiert $\varphi_i \in C_c^\infty(\Omega)$ mit

- (a) $\varphi_i \geq 0$
- (b) $\sum_{i=1}^n \varphi_i(x) = 1$, falls $x \in K$
- (c) $0 \leq \sum_{i=1}^n \varphi_i \leq 1$.

(d) $\text{supp } \varphi_j \subset \Omega_j$

BEWEIS. Wähle V mit \bar{V} kompakt und

$$K \subset V \subset \bar{V} \subset \bigcup_{i=1}^n \Omega_i$$

nach Bemerkung 2.14. Setze $U_i := V \cap \Omega_i$ und verwende Satz 2.18 □

BEMERKUNG 2.20. Das System $(\varphi_i)_{i \in \mathbb{N}}$ heißt der Überdeckung untergeordnete Zerlegung der Eins zu K .

3. Sobolev Räume I.

In diesem Abschnitt es sei $\emptyset \neq \Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ offen und beschränkt.

DEFINITION 3.1 (Distributionelle Ableitung). Sei $f, g \in L^1_{loc}(\Omega)$. Falls die Identität

$$\int_{\Omega} f D^{\alpha} \varphi = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} g \varphi \quad \text{für alle } \varphi \in C_c^{\infty}(\Omega)$$

gilt, heißt TG die distributionelle Ableitung von f , und wir schreiben $D^{\alpha} f = g$, $f^{(\alpha)} = g$ oder $f = \partial^{\alpha} g$.

BEMERKUNG 3.2.

(a) Die distributionelle Ableitung ist eindeutig, insbesondere ist die obige Definition sinnvoll, denn

$$\int_{\Omega} (f - g) \varphi = 0 \quad \text{für alle } \varphi \in C_c^{\infty}(\Omega) \quad \implies \quad f - g = 0 \text{ fast überall.}$$

(b) Falls $f \in C^m(\Omega)$. Dann für jede $|\alpha| \leq m$ ist $D^{\alpha} f$ die klassische partielle Ableitung von f .

DEFINITION 3.3. Sei $m \in \mathbb{N}$ und $1 \leq p \leq \infty$. Definiere

$$W^{m,p}(\Omega) := \{f \in L^p(\Omega) : \forall |\alpha| \leq m \exists D^{\alpha} f \in L^p(\Omega)\}$$

$$\|f\|_{W^{m,p}(\Omega)} := \sum_{|\alpha| \leq m} \|D^{\alpha} f\|_{L^p(\Omega)}.$$

SATZ 3.4. $W^{m,p}(\Omega)$ ist ein Banachraum.

BEWEIS. Klar: normierter Vektorraum. Um die Vollständigkeit zu zeigen, nehme $(f_n) \in W^{m,p}(\Omega)$ eine Cauchyfolge, d.h. die Folgen $(D^{\alpha} f_n) \subseteq L^p(\Omega)$ sind alle Cauchyfolgen. Daher konvergieren die auch, bezeichne die Grenzwerte mit f_{α} . Wir zeigen nun $D^{\alpha} f = f_{\alpha}$:

$$\int_{\Omega} f_{\alpha} \varphi \leftarrow \int_{\Omega} D^{\alpha} f_n \varphi = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f_n D^{\alpha} \varphi \rightarrow (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f D^{\alpha} \varphi.$$

Die Behauptung folgt. □

SATZ 3.5. Sei $1 < p < \infty$. Dann ist $W^{m,p}(\Omega)$ separabel und reflexiv. $W^{m,1}(\Omega)$ ist separabel.

BEWEIS. Definiere die stetige Abbildung

$$J : W^{m,p}(\Omega) \rightarrow \underbrace{L^p(\Omega) \times \cdots \times L^p(\Omega)}_M =: X,$$

wobei $M =$ die Anzahl der Multiindizes α mit $|\alpha| \leq m$ ist, durch $(Jf)(x) := (D^\alpha f)_{|\alpha| \leq m}$. Dann ist J stetig invertierbar, bildet also auf einen abgeschlossenen Unterraum von X ab. Falls $1 \leq p < \infty$ ist, ist X separabel, ist zusätzlich $p > 1$, folgt die Reflexivität von X . \square

LEMMA 3.6 (Lokale Approximation). Sei $1 \leq p < \infty$, $f \in W^{m,p}(\Omega)$ und $D \subseteq \Omega$ offen mit $\overline{D} \subseteq \Omega$. Betrachte $\delta = \text{dist}(D, \partial\Omega) > 0$ und den Mollifier η_ε , $\varepsilon < \delta$. Setze $f_\varepsilon := \eta_\varepsilon * (\chi_\Omega f)$. Dann $f_\varepsilon \rightarrow f$ in $W^{m,p}(D)$.

BEWEIS.

$$\begin{aligned} D^\alpha f_\varepsilon(x) &= D^\alpha \eta_\varepsilon * (\chi_\Omega f)(x) = \int_{\Omega} D^\alpha(\eta_\varepsilon(x-y))f(y) \, dy \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} D^\alpha \eta_\varepsilon(x-y)f(y) \, dy \stackrel{\text{Träger!}}{=} \int_{\Omega} \eta_\varepsilon(x-y)D^\alpha f(y) \, dy \\ &= (D^\alpha f)_\varepsilon(x), \quad x \in D. \end{aligned}$$

Also $f_\varepsilon \in W^{m,p}(D)$ und nach Satz 2.16 $D^\alpha f_\varepsilon = (D^\alpha f)_\varepsilon \rightarrow D^\alpha f$. \square

SATZ 3.7. Für $1 \leq p < \infty$ ist $W^{m,p}(\Omega) \cap C^\infty(\Omega)$ dicht in $W^{m,p}(\Omega)$.

BEWEIS. Betrachte eine lokal endliche Überdeckung Ω_k von Ω , $\overline{\Omega_k} \subseteq \Omega$ kompakt (siehe Satz 2.18). Sei φ_k Zerlegung der Eins, $\varepsilon > 0$ und $c_k > 0$ später noch zu bestimmen. Für $\varepsilon > 0$ existiert nach Lemma 3.6 $f_{k,\varepsilon} \in C^\infty(\Omega) \cap W^{m,p}(\Omega_k)$ mit $\|f - f_{k,\varepsilon}\|_{W^{m,p}(\Omega_k)} \leq c_k \varepsilon$. Setze

$$f_\varepsilon := \sum_{k \in \mathbb{N}} \varphi_k f_{k,\varepsilon}, \text{ also } f_\varepsilon - f := \sum_{k \in \mathbb{N}} \varphi_k (f_{k,\varepsilon} - f)$$

(lokal nur endlich viele Summanden). Die Produktregel gilt, denn für $\psi \in C_c^\infty(\Omega)$

$$\int_{\Omega} \varphi_k f D_i \psi = \int_{\Omega} (D_i(\varphi_k \psi) - (D_i \varphi_k) \psi) f = - \int_{\Omega} ((\varphi_k \psi) D_i f + \psi f D_i \varphi_k).$$

Daher ist $\varphi_k f \in W^{1,p}(\Omega)$,

$$D_i(\varphi_k f) = D_i \varphi_k \cdot f + \varphi_k D_i f.$$

Ferner gilt induktiv auch $\varphi_k f \in W^{m,p}(\Omega)$, und für $|\alpha| \leq m$

$$D^\alpha(\varphi_k f) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^{\alpha-\beta} \varphi_k \cdot D^\beta f.$$

Wir erhalten

$$\begin{aligned} D^\alpha f_\varepsilon - D^\alpha f &= \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \sum_{k \in \mathbb{N}} D^{\alpha-\beta} \varphi_k (D^\beta f_{k,\varepsilon} - D^\beta f). \\ \|D^\alpha f_\varepsilon - D^\alpha f\|_{L^p(\Omega)} &\leq C \sum_{k \in \mathbb{N}} \|\varphi_k\|_{C^m(\overline{\Omega})} \|D^\beta f_{k,\varepsilon} - D^\beta f\|_{L^p(\Omega)} \\ &\leq C\varepsilon \sum_{k \in \mathbb{N}} c_k \|\varphi_k\|_{C^m(\overline{\Omega})} \leq \varepsilon, \end{aligned}$$

falls $c_k \leq 2^{-k} (\|\varphi_k\|_{C^m(\overline{\Omega})} + 1)^{-1}/C$. \square

SATZ 3.8 (Produktregel). Sei $1 \leq p \leq \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ und $f \in W^{m,p}(\Omega)$, $g \in W^{m,q}(\Omega)$. Dann $fg \in W^{m,1}(\Omega)$ und $D_i(fg) = D_i f \cdot g + f D_i g$.

BEWEIS. Sei $p < \infty$. Nehme $f_k \in W^{m,p}(\Omega) \cap C^\infty(\Omega)$ mit $f_k \rightarrow f$. Wir haben gesehen $D_i(f_k g) = D_i f_k \cdot g + f_k D_i g$.

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} D_i \varphi \cdot fg &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} D_i \varphi \cdot f_k g = - \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \varphi D_i(f_k g) \\ &= - \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \varphi (D_i f_k \cdot g + f_k D_i g) = - \int_{\Omega} \varphi (D_i f \cdot g + f D_i g). \end{aligned}$$

Der Rest folgt mit Induktion. \square

SATZ 3.9 (Kettenregel). Seien $\Omega', \Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ offen, und $\Phi : \Omega' \rightarrow \Omega$ ein C^1 -Diffeomorphismus mit beschränkten Ableitungen $D\Phi, D\Phi^{-1}$. Sei $1 \leq p \leq \infty$. Dann gilt für $f \in W^{1,p}(\Omega)$:

- (a) $f \circ \Phi \in W^{1,p}(\Omega')$.
- (b) $\partial(f \circ \Phi) = \partial f \circ \Phi \cdot \partial\Phi$.

BEWEIS. ÜA. \square

Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ offen, $1 \leq p < \infty$ und $m \in \mathbb{N}$. Wir setzen

$$\begin{aligned} W_0^{m,p}(\Omega) &:= \overline{C_c^\infty(\Omega)}^{W^{m,p}(\Omega)}, \\ W_0^{m,p}(\Omega)_+ &:= \{u \in W_0^{m,p} : u \geq 0 \text{ f.ü.}\}, \\ C_c^\infty(\Omega)_+ &:= \{\varphi \in C_c^\infty(\Omega) : \varphi \geq 0\}. \end{aligned}$$

und

$$f^+ = \chi_{f>0} f, \quad f^- = \chi_{f<0} f, \quad f \in L^p(\Omega).$$

LEMMA 3.10. Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ offen.

- (a) $D_j f^+ = \chi_{f>0} D_j f$, $D_j f^- = -\chi_{f<0} D_j f$ fuer $f \in W^{1,2}(\Omega)$
- (b) $f \mapsto |f|$, f^+ , $f^- : W^{1,2}(\Omega) \rightarrow W^{1,2}(\Omega)$ stetig.
- (c) $C_c^\infty(\Omega)_+$ dicht in $W_0^{1,2}(\Omega)_+$.
- (d) Sei $u \in W^{1,2}(\Omega)$, $\text{supp}(u) \subset\subset \Omega$, d.h. es existiert ein offenes $D \subset \Omega$ mit $\text{supp } u \subset D \subset \overline{D} \subset \Omega$. Dann ist $u \in W_0^{1,2}(\Omega)$.

BEWEIS. Ü.A. □

SATZ 3.11. Sei $I \neq \emptyset$ ein offenes Intervall und $f \in W^{1,1}(I)$. Dann existiert eine Nullmenge N so, dass für $x, y \in I \setminus N$

$$(6) \quad f(y) - f(x) = \int_x^y f'(z) \, dz$$

gilt.

BEWEIS. Sei $f \in W^{1,1}(I)$ und $f_k \in C^\infty(I) \cap W^{1,1}(I)$ mit $f_k \rightarrow f$ in $W^{1,1}(I)$. Dann gilt

$$f_k(y) - f_k(x) = \int_x^y f'_k(z) \, dz \rightarrow \int_x^y f'(z) \, dz.$$

Da f_k in $L^1(I)$ konvergiert, besitzt sie eine punktweis fast überall konvergente Teilfolge, also $\lim_{l \rightarrow \infty} f_{k_l}(z) = f(z)$ für fast alle $z \in I$. □

SATZ 3.12. Sei $I \neq \emptyset$ ein offenes Intervall und $f, g \in L^1(I)$ mit

$$f(y) - f(x) = \int_x^y g(z) \, dz \quad \text{für } x, y \in I \setminus N,$$

für eine Nullmenge N . Dann ist $f \in W^{1,1}(I)$ und $f' = g$.

BEWEIS. Sei $\psi \in C_c^\infty(I)$, und $c, d \in I$ so, dass $\text{supp } \psi \in [c, d]$ und $f(y) - f(c) = \int_c^y g(z) \, dz$ für fast alle $y \in I$. Dann

$$\begin{aligned} \int_c^d \psi'(y)(f(y) - f(c)) \, dy &= \int_c^d \int_c^y \psi'(y)g(x) \, dx \, dy = \int_c^d \int_x^d \psi'(y) \, dy g(x) \, dx \\ &= - \int_c^d \psi(x)g(x) \, dx. \end{aligned}$$

□

SATZ 3.13. Sei $f \in W^{1,1}(I)$. Dann existiert ein $g \in C(\bar{I})$ so, dass $f = g$ fast überall.

BEWEIS. Sei $I = (a, b)$. Definiere $h(y) := \int_a^y f'(z) \, dz$. Die Funktion h ist stetig auf I , denn $f' \in L^1(I)$. Außerdem existiert $\lim_{x \rightarrow a, b} h(x)$, also $h \in C(\bar{I})$. Seien x, z so, dass $f(z) - f(x) = \int_x^z f'(z) \, dz$. Sei $c := f(z) - h(z)$ und setze $g(y) := h(y) + c$. Nach Definition $f'(x) = g(x)$ für fast alle $x \in I$. □

BEMERKUNG 3.14. Die obige Integralgleichung impliziert nicht nur Stetigkeit, sondern auch Absolutstetigkeit. Genauer ist Absolutstetigkeit äquivalent zu (6) (vgl. Maßtheorie).

SATZ 3.15. *Es sei $1 \leq p \leq \infty$ und $I = (a, b)$. Dann sind die Einbettungen $W^{m,p}(I) \hookrightarrow W^{1,p}(I) \hookrightarrow W^{1,1}(I) \hookrightarrow C(\bar{I})$ stetig. Falls $p > 1$, ist die Einbettung $W^{1,p}(I) \hookrightarrow C(\bar{I})$ kompakt.*

BEWEIS. Es ist klar, dass die Einbettungen

$$W^{m,p}(I) \hookrightarrow W^{1,p}(I) \hookrightarrow W^{1,1}(I)$$

stetig sind.

Es bleibt zu zeigen, dass $W^{1,1}(I) \hookrightarrow C(\bar{I})$ stetig ist. Sei $f \in W^{1,1}(I)$. Nach Satz 3.11 existiert eine Nullmenge N mit

$$f(y) - f(x) = \int_x^y f'(t) dt, \quad x, y \in I \setminus N.$$

Dann gilt

$$|f(y)| = \left| f(x) + \int_x^y f' \right| \leq |f(x)| + \int_x^y |f'| \leq |f(x)| + \|f'\|_{L^1(I)}.$$

Integration bzgl. x über I liefert

$$(b-a)|f(y)| \leq \int_I |f(y)| dx \leq \|f\|_{L^1(I)} + (b-a)\|f'\|_{L^1(I)}, \quad y \in I \setminus N,$$

d.h. $\|f\|_{L^\infty(I)} \leq C\|f\|_{W^{1,1}(I)}$. Da $C^\infty(I) \cap W^{1,1}(I)$ dicht in $W^{1,1}(I)$ ist, folgt die Behauptung (Beachte: für $f \in C(\bar{I})$ gilt $\|u\|_{L^\infty(I)} = \|u\|_\infty$).

Nun sei $p > 1$ und $x, y \in I$ mit $x > y$. Dann gilt mit $1/p + 1/p' = 1$

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)|^p &\leq \left(\int_x^y |f'| \right)^p \stackrel{\text{Hölder}}{\leq} (x-y)^{p/p'} \int_x^y |f'|^p \leq (x-y)^{p/p'} \int_a^b |f'|^p \\ &\leq (x-y)^{p/p'} \|f\|_{W^{1,p}(I)}^p, \end{aligned}$$

d.h.

$$|f(x) - f(y)| \leq (x-y)^{\frac{1}{p'}} \|f\|_{W^{1,p}(I)}, \quad f \in W^{1,p}(I).$$

Also ist $B_{W^{1,p}(I),1}(0) \subset C(I)$ gleichmäßig gleichgradig stetig. Die Behauptung folgt nun aus dem Satz von Arzelà–Ascoli. \square

4. Sobolev Räume II. – Einbettungssätze

SATZ 4.1. *Für $1 \leq p < \infty$ ist der Raum $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ dicht in $W^{m,p}(\mathbb{R}^d)$.*

BEWEIS. Seien $\varepsilon > 0$, $f \in W^{m,p}(\mathbb{R}^d)$ und $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ mit $\text{supp } \psi \subseteq B(0,2)$ und $\psi(x) = 1$ für $x \in \overline{B(0,1)}$. Setze $\psi_j(x) := \psi(x/j)$.

Beh. $\psi_j f \rightarrow f$ in $W^{m,p}(\mathbb{R}^d)$.

Die Produktregel (Satz 3.8) liefert

$$|D^\alpha(\psi_j f - f)| \leq C \sum_{\beta \leq \alpha} |D^\beta(\psi_j - 1)| \cdot |D^{\alpha-\beta} f|,$$

also

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} |D^\alpha(\psi_j f - f)|^p &\leq C' \int_{\mathbb{R}^d} \sum_{\beta \leq \alpha} |D^\beta(\psi_j - 1)|^p \cdot |D^{\alpha-\beta} f|^p \\ &= C' \sum_{\beta \leq \alpha_{\mathbb{R}^d \setminus B(0,j)}} \int_{B(0,j)} |D^\beta(\psi_j - 1)|^p \cdot |D^{\alpha-\beta} f|^p \\ &\quad + C' \sum_{\beta \leq \alpha_{B(0,j)}} \int_{B(0,j)} |D^\beta(\psi_j - 1)|^p \cdot |D^{\alpha-\beta} f|^p \\ &= C' \sum_{\beta \leq \alpha_{\mathbb{R}^d \setminus B(0,j)}} \int_{B(0,j)} |D^\beta(\psi_j - 1)|^p \cdot |D^{\alpha-\beta} f|^p \\ &\leq C'' \sum_{\beta \leq \alpha_{\mathbb{R}^d \setminus B(0,j)}} \int_{B(0,j)} |D^{\alpha-\beta} f|^p \leq \varepsilon^p, \end{aligned}$$

falls j groß genug ist.

Nun betrachten wir einen Mollifier (ρ_n) . Dann hat $\rho_n * \psi_j f$ kompakten Träger und ist glatt. Nach Satz 2.9 und 2.16 gilt $D^\alpha(\rho_n * (\psi_j f)) = \rho_n * D^\alpha(\psi_j f) \rightarrow D^\alpha \psi_j f$ für $n \rightarrow \infty$. Sei also erst j groß und dann n genügend groß, so dass

$$\|f - \rho_n * (\psi_j f)\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}^d)} \leq \|f - \psi_j f\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}^d)} + \|\psi_j f - \rho_n * (\psi_j f)\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}^d)} \leq \varepsilon.$$

□

SATZ 4.2. Sei $1 \leq p \leq \infty$. Dann gilt

$$W^{1,p}(\mathbb{R}) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R})$$

mit stetiger Einbettung, d.h. für eine Konstante C_p

$$\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \leq C_p \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R})}, \quad \forall u \in W^{1,p}(\mathbb{R}).$$

BEWEIS. Sei $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ und $1 \leq p < \infty$. Setze $G(s) := |s|^{p-1}s$. Dann gilt $\psi := G(\varphi) \in C_c^1(\mathbb{R})$ und $\psi' = G'(\varphi)\varphi' = p|\varphi|^{p-1}\varphi'$. Also erhalten wir für $x \in \mathbb{R}$

$$G(\varphi(x)) = \int_{-\infty}^x p|\varphi(t)|^{p-1}\varphi'(t) dt.$$

Nach der Hölderschen Ungleichung folgt

$$|G(\varphi(x))| = |\varphi(x)|^p \leq p \|\varphi\|_p^{p-1} \|\varphi'\|_p$$

und

$$|\varphi(x)| \leq C \|\varphi\|_p^{(p-1)/p} \|\varphi'\|_p^{1/p}.$$

Die Youngsche Ungleichung liefert

$$(7) \quad |\varphi(x)| \leq C \frac{p-1}{p} \|\varphi\|_p + C \frac{1}{p} \|\varphi'\|_p \leq C \|\varphi\|_{W^{1,p}(\mathbb{R})}.$$

Sei nun $u \in W^{1,p}(\mathbb{R})$. Nach Satz 4.1 existiert $u_n \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ mit $u_n \rightarrow u$ in $W^{1,p}(\mathbb{R})$. Mit (7) ist dann u_n eine Cauchyfolge in $L^\infty(\mathbb{R})$ und die Behauptung folgt. \square

LEMMA 4.3. Sei $d \geq 2$ und $f_1, \dots, f_d \in L^{d-1}(\mathbb{R}^{d-1})$. Für $x \in \mathbb{R}^d$ und $1 \leq i \leq d$ setze

$$\tilde{x}_i := (x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^{d-1}$$

und sei

$$f(x) = f_1(\tilde{x}_1) f_2(\tilde{x}_2) \cdots f_d(\tilde{x}_d) \quad \text{für } x \in \mathbb{R}^d.$$

Dann $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ und

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \leq \prod_{i=1}^d \|f_i\|_{L^{d-1}(\mathbb{R}^{d-1})}.$$

BEWEIS. Ü.A. \square

THEOREM 4.4 (Sobolev). Sei $1 \leq p < d$. Dann ist die Einbettung

$$W^{1,p}(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow L^{p^*}(\mathbb{R}^d), \quad \text{mit } \frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{d}$$

stetig und es existiert $C = C_{p,d}$ mit

$$\|f\|_{L^{p^*}} \leq C \|\nabla f\|_{L^p} \quad \forall f \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d).$$

BEWEIS. 1. Schritt: $u \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$.

Sei $1 \leq i \leq d$.

$$\begin{aligned} |u(x_1, x_2, \dots, x_d)| &= \left| \int_{-\infty}^{x_i} \frac{\partial u}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, t, x_{i+1}, \dots, x_d) dt \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{\partial u}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, t, x_{i+1}, \dots, x_d) \right| dt \\ &:= f_i(\tilde{x}_i). \end{aligned}$$

Also $\|f_i\|_{L^1(\mathbb{R}^{d-1})} \leq \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}$.

Es gilt $|u(x)|^d \leq \prod_{i=1}^d |f_i(\tilde{x}_i)|$. Mit Lemma 4.3 folgt:

$$\int_{\mathbb{R}^d} |u(x)|^{\frac{d}{d-1}} dx \leq \int_{\mathbb{R}^d} \prod_{i=1}^d |f_i(\tilde{x}_i)|^{\frac{1}{d-1}} dx \leq \prod_{i=1}^d \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}^{\frac{1}{d-1}}.$$

Das heißt

$$(8) \quad \|u\|_{L^{\frac{d}{d-1}}(\mathbb{R}^d)} \leq \prod_{i=1}^d \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}^{\frac{1}{d}}.$$

Wir wenden (8) auf $|u|^t$, $t > 1$ anstatt auf u an. Also, mit $1/p + 1/p' = 1$

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^{\frac{td}{d-1}}(\mathbb{R}^d)}^t &= \left(\int_{\mathbb{R}^d} |u|^{\frac{td}{d-1}}(x) \, dx \right)^{\frac{d-1}{d}} \leq \prod_{i=1}^d \left\| |u|^{t-1} \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}^{\frac{1}{d}} \\ &\leq t \prod_{i=1}^d \left\| |u|^{t-1} \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}^{\frac{1}{d}} \leq t \|u\|_{L^{p'(t-1)}(\mathbb{R}^d)}^{t-1} \prod_{i=1}^d \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^{\frac{1}{d}}. \end{aligned}$$

Wähle nun t so dass $\frac{td}{d-1} = p'(t-1)$, d.h. $t = \frac{d-1}{d}p^*$ (dann $t \geq 1$). Jetzt durch dividieren durch $\|u\|_{L^{p'(t-1)}(\mathbb{R}^d)}^{t-1}$ bekommen wir

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^d)} \leq t \prod_{i=1}^d \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^{\frac{1}{d}} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)},$$

die Behauptung für $u \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$.

2. *Schritt:* Sei $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$. Nach Satz 4.1 wähle $u_k \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ mit $u_k \rightarrow u$ in $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$. Dann $\|u_k\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^d)} \leq C \|\nabla u_k\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$. Dies zeigt auch dass u_k eine Cauchyfolge in $L^{p^*}(\mathbb{R}^d)$ ist, deshalb ist sie konvergent. Eine Teilfolge konvergiert dann fast überall, benutzen wir die selbe Bezeichnung $u_k(x) \rightarrow u(x)$ für fast alle $x \in \mathbb{R}^d$. Also $u_k \rightarrow u$ in $L^{p^*}(\mathbb{R}^d)$, und $\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^d)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$. \square

BEMERKUNG 4.5. *Es genügt $C_{p,d} := \frac{(d-1)p}{d-p}$. Die optimale Konstante ist bekannt aber kompliziert.*

SATZ 4.6. *Sei $1 \leq p < d$. Dann ist die Einbettung*

$$W^{1,p}(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow L^r(\mathbb{R}^d), \quad r \in [p, p^*]$$

stetig.

BEWEIS. Sei $p \leq r \leq p^*$. Für ein θ gilt $\frac{1}{r} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{p^*}$. Verwende dann die Interpolationsungleichung, die Youngsche Ungleichung und Theorem 4.4

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^r(\mathbb{R}^d)} &\leq \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^\theta \|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^d)}^{1-\theta} \leq \theta \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} + (1-\theta) \|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^d)} \\ &\leq \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} + \|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^d)} \leq \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} + C \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \\ &\leq C' \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)}. \end{aligned}$$

\square

THEOREM 4.7 (Morrey). *Es sei $p > d$. Dann ist die Einbettung*

$$W^{1,p}(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^d)$$

stetig. Ferner existiert ein $C := C_{d,p}$ so, dass für alle $f \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ gilt

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\theta \|\nabla f\|_{L^p} \quad \text{für fast alle } x \in \mathbb{R}^d,$$

wobei $\theta = 1 - \frac{d}{p}$.

BEWEIS. 1. Schritt: Sei $u \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$. Sei Q ein abgeschlossener Würfel $0 \in Q$ mit Seitenlänge r . Sei $x \in Q$, dann $u(x) - u(0) = \int_0^1 \frac{d}{dt} u(tx) dt$. Daraus

$$|u(x) - u(0)| \leq \int_0^1 \sum_{i=1}^d \left| \frac{\partial u}{\partial x_i}(tx) \right| |x_i| dt \leq r \sum_{i=1}^d \int_0^1 \left| \frac{\partial u}{\partial x_i}(tx) \right| dt.$$

Sei $\bar{u} = |Q|^{-1} \int_Q u(x) dx$. Dann $|\bar{u} - u(0)| \leq |Q|^{-1} \int_Q |u(x) - u(0)|$, und

$$\begin{aligned} |\bar{u} - u(0)| &\leq \frac{r}{|Q|} \int_Q \int_0^1 \sum_{i=1}^d \left| \frac{\partial u}{\partial x_i}(tx) \right| dt dx = \frac{r}{r^d} \int_0^1 \int_Q \sum_{i=1}^d \left| \frac{\partial u}{\partial x_i}(tx) \right| dx dt \\ &= \frac{1}{r^{d-1}} \int_0^1 \sum_{i=1}^d \int_{tQ} \left| \frac{\partial u}{\partial x_i}(y) \right| dy \cdot \frac{1}{t^d} dt \\ &\leq \frac{1}{r^{d-1}} \int_0^1 \sum_{i=1}^d \left(\int_Q \left| \frac{\partial u}{\partial x_i}(y) \right|^p dy \right)^{1/p} |tQ|^{1/q} \cdot \frac{1}{t^d} dt \\ &\leq \frac{1}{r^{d-1}} \|\nabla u\|_{L^p(Q)} r^{d/q} \int_0^1 \frac{t^{d/q}}{t^d} dt = \frac{r^{1-d/p}}{1-d/p} \|\nabla u\|_{L^p(Q)}. \end{aligned}$$

Natürlich können wir das ganze für x anstatt für 0 wiederholen und auch Q verschieben, also

$$(9) \quad |\bar{u} - u(x)| \leq \frac{r^{1-d/p}}{1-d/p} \|\nabla u\|_{L^p(Q)} \quad \text{für } x \in Q.$$

Daraus

$$|u(x) - u(y)| \leq |u(x) - \bar{u}| + |\bar{u} - u(y)| \leq \frac{2r^{1-d/p}}{1-d/p} \|\nabla u\|_{L^p(Q)} \quad \text{für } x, y \in Q.$$

Sei nun $x, y \in \mathbb{R}^d$. Es existiert ein Würfel Q der Seitenlänge $r = 2|x - y|$ mit $x, y \in Q$.

$$|u(x) - u(y)| \leq \frac{C|x - y|^\theta}{1-d/p} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}.$$

2. Schritt: Sei $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$. Approximiere mit $u_k \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, d.h. $u_k \rightarrow u$ in $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$. Wie im Beweis von Theorem 4.4 folgt

$$|u(x) - u(y)| \leq \frac{C|x - y|^\theta}{1-d/p} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}.$$

3. *Schritt:* Wir zeigen $W^{1,p}(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^d)$. Sei $u \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$, $x \in \mathbb{R}^d$ und $Q \ni x$ der Einheitswürfel. Aus (9) folgt

$$|u(x)| \leq |\bar{u}| + C\|\nabla u\|_{L^p(Q)} \leq \|u\|_{L^p(Q)} + C\|\nabla u\|_{L^p(Q)} \leq C_{d,p}\|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)}.$$

Schließlich approximiere $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ mit $u_k \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$. \square

SATZ 4.8 (Der Fall $p = d$). *Die Einbettung*

$$W^{1,d}(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow L^q(\mathbb{R}^d), \quad q \in [d, \infty)$$

ist stetig.

BEWEIS. Ohne Beweis. \square

KOROLLAR 4.9. *Sei $m \in \mathbb{N}$ ($m \geq 1$) und $1 \leq p < \infty$. Dann gilt*

- (a) $\frac{1}{p} - \frac{m}{d} > 0 \implies W^{m,p}(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow L^r(\mathbb{R}^d)$ mit $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} - \frac{m}{d}$
- (b) $\frac{1}{p} - \frac{m}{d} = 0 \implies W^{m,p}(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow L^r(\mathbb{R}^d)$ für alle $r \in [p, \infty)$ $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{m}{d}$
- (c) $\frac{1}{p} - \frac{m}{d} < 0 \implies W^{m,p}(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^d)$

jeweils mit stetiger Einbettung.

- (a) Sei $\frac{1}{p} - \frac{m}{d} < 0$, $m - d/p \notin \mathbb{N}$. Setze

$$k := \left[m - \frac{d}{p} \right] \quad \text{und} \quad \theta := m - \frac{d}{p} - k, \quad 0 < \theta < 1$$

\implies für jede $f \in W^{m,p}(\mathbb{R}^d)$ es existiert C mit

$$\|D^\alpha f\|_{L^\infty} \leq C\|f\|_{W^{m,p}} \quad \forall |\alpha| \leq k$$

$$|D^\alpha f(x) - D^\alpha f(y)| \leq C\|f\|_{W^{m,p}}|x - y|^\theta \quad \text{fast alle } x, y \in \mathbb{R}^d, |\alpha| = k.$$

Insbesondere gilt

$$W^{m,p}(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow C^k(\mathbb{R}^d)$$

mit stetiger Einbettung.

BEWEIS. ÜA. \square

5. Sobolev Räume III. - Gebiete

NOTATION 5.1. *Sei $x \in \mathbb{R}^d$. Dann $x = (x', x_d)$ mit $x' \in \mathbb{R}^{d-1}$, $x' = (x_1, \dots, x_{d-1})$. Wir setzen*

$$\mathbb{R}_+^d := \{x = (x', x_d) : x_d > 0\}$$

$$Q := \{x = (x', x_d) : |x'| < 1 \text{ und } |x_d| < 1\}$$

$$Q_+ := Q \cap \mathbb{R}_+^d$$

$$Q_0 := \{x = (x', x_d) : |x'| < 1 \text{ und } x_d = 0\}$$

DEFINITION 5.2. *Sei $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ offen. Dann heißt Ω von der Klasse C^m , falls eine lokal endliche Überdeckung $\{U_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ des Randes $\partial\Omega$ und bijektive Abbildungen $\Phi_j : Q \rightarrow U_j$ existieren, so dass Φ_j, Φ_j^{-1} m -fach stetig differenzierbar mit gleichmäßig beschränkten Ableitungen sind und $\Phi_j(Q_+) = U_j \cap \Omega$ und $\Phi_j(Q_0) = U_j \cap \partial\Omega$ gelten.*

SATZ 5.3 (Fortsetzungsoperator). Sei $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ beschränkt und von der Klasse C^m oder $\Omega = \mathbb{R}_+^d$. Dann existiert für $1 \leq p \leq \infty$ ein linearer Operator $F : L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^d)$, so dass für alle $u \in W^{k,p}(\Omega)$ mit $k \leq m$ gilt

- (a) $Fu|_{\Omega} = u$,
 (b) $\|Fu\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^d)} \leq C_{\Omega} \|u\|_{W^{k,p}(\Omega)}$.

BEWEISIDEE FÜR $m = 1$ UND Ω BESCHRÄNKT: Nach Voraussetzung kann man $\bar{\Omega}$ mit $U_0 = \Omega$ und endlich vielen U_l überdecken. Die zugehörigen bijektiven Abbildungen bezeichnen wir wieder mit Φ_l . Betrachte eine dieser Überdeckungen untergeordnete Zerlegung der Eins (φ_l) . Die Funktionen $\varphi_l f$ (eingeschränkt auf $\Omega \cap U_l$) liegen in $W^{1,p}(\Omega \cap U_l)$. Sei einfach

$$\tilde{f}_0(x) := \begin{cases} g_0(x) & x \in U_0 \\ 0 & x \notin U_0 \end{cases}.$$

Für $l > 0$ definiere $g_l := (\varphi_l f) \circ \Phi_l$. Dann gehört g_l zu $W^{1,p}(Q_+)$ nach Satz 3.9. Setze g_l , $l > 0$ auf Q so fort:

$$\tilde{g}_l((x', x_d)) := \begin{cases} g_l((x', x_d)) & (x', x_d) \in Q_+ \\ g_l((x', -x_d)) & (x', x_d) \notin Q_+ \cup Q_0. \end{cases}$$

Es gilt $\tilde{g}_l \in W^{1,p}(Q)$ und $\|\tilde{g}_l\|_{W^{1,p}(Q)} \leq C \|g_l\|_{W^{1,p}(Q_+)}$ (dies ist noch zu beweisen!). Jetzt sei $\tilde{f}_l := \tilde{g}_l \circ \Phi_l^{-1}$. Dann gilt $\tilde{f}_l|_{\Omega \cap U_l} = (\varphi_l f)|_{\Omega \cap U_l}$ und \tilde{f}_l ist null außerhalb von $\Phi_l^{-1}(Q)$. Betrachte jedes \tilde{f}_l als eine Funktion definiert auf \mathbb{R}^d (0 außerhalb U_l). Dann $\tilde{f}_l \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$, also liegt die Funktion

$$\tilde{f} = \sum_{l=0}^N \tilde{f}_l$$

auch in $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ und sie ist eine Fortsetzung von f (nach Konstruktion). Die folgenden Abschätzungen gelten für $l > 0$:

$$\begin{aligned} \|g_l\|_{W^{1,p}(Q_+)} &\leq C \|\varphi_l f\|_{W^{1,p}(\Omega \cap U_l)}, & \|g_l\|_{L^p(Q_+)} &\leq C \|\varphi_l f\|_{L^p(\Omega \cap U_l)} \\ \|\tilde{g}_l\|_{W^{1,p}(Q)} &\leq C \|g_l\|_{W^{1,p}(Q_+)}, & \|\tilde{g}_l\|_{L^p(Q)} &\leq C \|g_l\|_{L^p(Q_+)} \\ \|\tilde{f}_l\|_{W^{1,p}(U_l)} &\leq C \|\tilde{g}_l\|_{W^{1,p}(Q)}, & \|\tilde{f}_l\|_{L^p(U_l)} &\leq C \|\tilde{g}_l\|_{L^p(Q)}, \end{aligned}$$

wobei die Konstante C nur von Ω , von der Überdeckung und von den zugehörigen Funktionen Φ_l abhängt. Also

$$\begin{aligned} \|\tilde{f}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} &\leq \sum_{l=0}^N \|\tilde{f}_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} = \sum_{l=0}^N \|\tilde{f}_l\|_{W^{1,p}(U_l)} \leq C' \sum_{l=0}^N \|\varphi_l f\|_{W^{1,p}(U_l \cap \Omega)} \\ &\leq C'' \|f\|_{W^{1,p}(\Omega)}. \end{aligned}$$

Analog folgt die Abschätzung im Fall $k = 0$. □

SATZ 5.4 (Dichtheit). Sei $\emptyset \neq \Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ beschränkt und von der Klasse C^m . Sei $u \in W^{m,p}(\Omega)$ wobei $1 \leq p < \infty$. Dann existiert eine Folge $(u_n) \subseteq C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ mit $u_n|_\Omega \rightarrow u$ in $W^{m,p}(\Omega)$, d.h. die Menge

$$\{u|_\Omega : u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)\}$$

ist ein dichter Unterraum von $W^{m,p}(\Omega)$.

BEWEIS. Sei $u \in W^{m,p}(\Omega)$ und betrachte Fu . Satz 4.1 liefert eine Folge $(v_n) \subseteq C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ mit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|v_n - Fu\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}^d)} = 0.$$

Die Folge $u_n := v_n|_\Omega$ hat die gewünschten Eigenschaften. \square

KOROLLAR 5.5. Sei $m \in \mathbb{N}$ ($m \geq 1$), $\emptyset \neq \Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ beschränkt von der Klasse C^m oder $\Omega = \mathbb{R}_+^d$ und $1 \leq p < \infty$. Dann gelten die folgende Aussagen

- (a) $\frac{1}{p} - \frac{m}{d} > 0 \implies W^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow L^r(\Omega)$ mit $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} - \frac{m}{d}$,
- (b) $\frac{1}{p} - \frac{m}{d} = 0 \implies W^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow L^r(\Omega)$ für alle $r \in [d, \infty)$,
- (c) $\frac{1}{p} - \frac{m}{d} < 0 \implies W^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow L^\infty(\Omega)$

jeweils mit stetiger Einbettung.

- (a) Sei $\frac{1}{p} - \frac{m}{d} < 0$, $m - d/p \notin \mathbb{N}$. Setze

$$k := \left[m - \frac{d}{p} \right] \quad \text{und} \quad \theta := m - \frac{d}{p} - k, \quad 0 < \theta < 1$$

\implies für jede $f \in W^{m,p}(\Omega)$. Dann existiert C mit

$$\|D^\alpha f\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C \|f\|_{W^{m,p}(\Omega)} \quad \text{für alle } |\alpha| \leq k$$

$$|D^\alpha f(x) - D^\alpha f(y)| \leq C \|f\|_{W^{m,p}(\Omega)} |x - y|^\theta \quad \text{für fast alle } x, y \in \Omega, |\alpha| = k.$$

Insbesondere gilt

$$W^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow C^k(\overline{\Omega})$$

mit stetiger Einbettung.

BEWEIS. Ü.A. \square

SATZ 5.6 (Charakterisierungen von Sobolev Funktionen). Es sei $f \in L^p(\Omega)$ mit $1 < p \leq \infty$. Äquivalent sind

- (a) $f \in W^{1,p}(\Omega)$
- (b) Es existiert $C > 0$

$$\left| \int_\Omega f \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right| \leq C \|\varphi\|_{L^{p'}(\Omega)}, \quad \text{für alle } \varphi \in C_c^\infty(\Omega), i = 1, \dots, d.$$

- (c) Es existiert ein $C > 0$, so dass für jedes $\Omega' \subset \Omega$ mit $\overline{\Omega'} \subseteq \Omega$ und für alle $h \in \mathbb{R}^d$ mit $|h| < \text{dist}(\Omega', \Omega^c)$ gilt

$$\|\tau_h f - f\|_{L^p(\Omega')} \leq C|h|.$$

BEMERKUNG 5.7. Es kann $C = \|\nabla f\|_{L^p(\Omega)}$ gewählt werden.

Falls $p = 1$, so gilt (a) \implies (b) \iff (c)

BEWEIS. ÜA. □

SATZ 5.8. Sei $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ offen, $1 \leq p < \infty$ und $M \subseteq L^p(\Omega)$ beschränkt. Es gelte

(a) für alle $\varepsilon > 0$ und $\Omega' \subseteq \overline{\Omega'} \subseteq \Omega$ existiert ein $0 < \delta < \text{dist}(\Omega', \Omega^c)$ mit

$$\|\tau_h f - f\|_{L^p(\Omega')} < \varepsilon \quad \text{für alle } h \in \mathbb{R}^d \text{ mit } |h| < \delta \text{ und für alle } f \in M,$$

wobei $(\tau_h f)(x) = f(x + h)$.

(b) für alle $\varepsilon > 0$ existiert ein $\Omega' \subseteq \Omega$ mit $\overline{\Omega'}$ kompakt in Ω , so dass

$$\|f\|_{L^p(\Omega \setminus \Omega')} < \varepsilon \quad \text{für alle } f \in M.$$

Dann ist M relativ kompakt in $L^p(\Omega)$.

BEWEIS. (Skizze). Wir betrachten zunächst den Fall $\Omega = \mathbb{R}^d$. Nach Voraussetzung (b) können wir $\Omega' \subset \Omega$ mit $\overline{\Omega'}$ kompakt in Ω wählen, so dass ein $C > 0$ mit

$$(10) \quad \|f\|_{L^p(\Omega \setminus \Omega')} \leq C\varepsilon, \quad f \in M.$$

existiert. Sei η_n ein Mollifier und $\Phi \in C_c(\mathbb{R}^d)$. Dann gilt

$$(11) \quad \|\eta_n * \Phi - \Phi\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leq \sup_{h \in B(0, \varepsilon)} \|\tau_h \Phi - \Phi\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}.$$

Da $C_c(\mathbb{R}^d)$ dicht in $L^p(\mathbb{R}^d)$ ist, existiert für $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ eine Folge $(\Phi_j)_{j \in \mathbb{N}} \subset C_c(\mathbb{R}^d)$ mit $\lim_{j \rightarrow \infty} \Phi_j = f$ in $L^p(\mathbb{R}^d)$. Es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n * \Phi_j = \eta_n * f \text{ in } L^p(\mathbb{R}^d),$$

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \tau_h \Phi_j = \tau_h f \text{ in } L^p(\mathbb{R}^d).$$

Damit folgt aus (11) und (a), dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\eta_n * f - f\|_{L^p(\Omega')} = 0$$

gleichmäßig für alle $f \in M$, d.h. es existiert ein $C > 0$ und ein $n \in \mathbb{N}$ mit

$$(12) \quad \|\eta_n * f - f\|_{L^p(\Omega')} < C\varepsilon, \quad f \in M.$$

Wegen $\eta_n * f \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ gilt insbesondere $\eta_n * f \in C(\overline{\Omega'})$. Mit Arzela-Ascoli folgt nun, dass

$$M' = \{\eta_n * f : f \in M\}$$

relativ kompakt ist.

Somit existieren nach (Adams, Sobolev Spaces) Theorem 1.19 (*Total beschränkt*) eine endliche Menge von Funktionen $\{\psi_1, \dots, \psi_m\} \subset C(\overline{\Omega'})$ mit

$$M' \subset \bigcup_{i=1}^m B(\psi_i, \varepsilon).$$

Daher existiert ein $C > 0$, so dass für $f \in M$ ein $j \in \{1, \dots, m\}$ mit

$$(13) \quad |\psi_j(x) - (\eta_m * f)(x)| < C\varepsilon, \quad x \in \overline{\Omega'}$$

existiert. Bezeichne die Erweiterung mit 0 auf \mathbb{R}^d von ψ mit $\tilde{\psi}$. Dann folgt aus (10), (11), (12) und (13), dass

$$\|f - \tilde{\psi}_j\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} < \varepsilon$$

für ein $j \in \{1, \dots, m\}$ gilt, d.h.

$$M \subset \bigcup_{i=1}^m B(\tilde{\psi}_i, \varepsilon).$$

Daher ist M relativ kompakt.

Der allgemeine Fall folgt aus dem Spezialfall, wenn man die Menge $\tilde{M} = \{\tilde{f} : f \in M\}$, wobei \tilde{f} die Erweiterung mit 0 auf \mathbb{R}^d von f bezeichnet, betrachtet. (s. Adams, Sobolev Spaces, Theorem 2.32) \square

THEOREM 5.9 (Rellich). Sei $\emptyset \neq \Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ beschränkt der Klasse C^1 . Sei $1 \leq p < \infty$. Dann gilt

(a) $p < d \implies W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^r(\Omega)$, $r \in [1, p^*)$, wobei $\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{d}$ erfüllt ist;

(b) $p = d \implies W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^r(\Omega)$, $r \in [1, \infty)$;

(c) $p > d \implies W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow C(\overline{\Omega})$

jeweils mit kompakter Einbettung.

BEWEIS. (a) Sei B die Einheitskugel in $W^{1,p}(\Omega)$. Wir verwenden Satz 5.8. Sei $1 \leq r < p^*$. Dann existiert ein $\theta \in (0, 1]$ mit $\frac{1}{r} = \frac{\theta}{1} + \frac{1-\theta}{p^*}$. Sei $\Omega' \subseteq \overline{\Omega} \subseteq \Omega$ und $|h| < \text{dist}(\Omega', \Omega^c)$. Die Interpolationsungleichung 1.11 und 5.6 liefern

$$\begin{aligned} \|\tau_h u - u\|_{L^r(\Omega')} &\leq \|\tau_h u - u\|_{L^1(\Omega')}^\alpha \|\tau_h u - u\|_{L^{p^*}(\Omega')}^{1-\alpha} \\ &\leq |h|^\alpha \|\nabla u\|_{L^1(\Omega)}^\alpha (2\|u\|_{L^{p^*}(\Omega)})^{1-\alpha} \\ &\leq C|h|^\alpha \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}^\alpha \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}^{1-\alpha} \leq C|h|^\alpha, \end{aligned}$$

falls $u \in B$. Ferner gilt für solche u

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^r(\Omega \setminus \Omega')} &= \left(\int_{\Omega \setminus \Omega'} |u(x)|^r dx \right)^{1/r} \leq \|u\|_{L^{p^*}(\Omega \setminus \Omega')} |\Omega \setminus \Omega'|^{1-r/p^*} \\ &\leq |\Omega \setminus \Omega'|^{1-r/p^*} \leq \varepsilon, \end{aligned}$$

falls Ω' geeignet gewählt ist.

(b) Analog.

(c) Sei $p > d$. Sei B die Einheitskugel in $W^{1,p}(\Omega)$. Es ist zu zeigen, dass B relativ kompakt in $C(\overline{\Omega})$ ist. Korollar 5.5 liefert

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha \quad \forall f \in B,$$

mit $\alpha > 0$, d.h. B ist gleichmäßig gleichgradig stetig. Der Satz von Arzelà-Ascoli liefert die Behauptung. \square

SATZ 5.10 (Poincaré Ungleichung). *Sei $\emptyset \neq \Omega \subset \mathbb{R}^d$ offen und beschränkt. Dann existiert $C_\Omega > 0$ mit*

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} \leq C_\Omega \|\nabla f\|_{L^p(\Omega)} \quad \text{für alle } f \in W_0^{1,p}(\Omega).$$

BEWEIS. Sei $f \in C_c^\infty(\Omega)$ und $\Omega \subseteq [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_d, b_d]$, und definiere $f = 0$ auf $\mathbb{R}^d \setminus \Omega$. Dann gilt für $i = 1, \dots, d$

$$\begin{aligned} |f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_d)|^p &= |f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_d) - f(x_1, \dots, a_i, \dots, x_d)|^p \\ &= \left| \int_{a_i}^{x_i} \partial_i f(x_1, \dots, y_i, \dots, x_d) \right|^p dy_i \\ &\leq (b_i - a_i)^{p/q} \int_{a_i}^{x_i} |\partial_i f|^p \leq (b_i - a_i)^{p/q} \int_{a_i}^{b_i} |\partial_i f|^p. \end{aligned}$$

Daher

$$\|f\|_{L^p(\Omega)}^p \leq (b_i - a_i)^{p/p'} (b_i - a_i) \|\partial_i f\|_{L^p(\Omega)}^p = (b_i - a_i)^p \|\partial_i f\|_{L^p(\Omega)}^p.$$

Da $(\sum_{i=1}^d |\partial_i f|^p)^{1/p} \leq M |\nabla f|$, so erhalten wir die gewünschte Ungleichung. \square

SATZ 5.11 (Einbettungssätze für $W_0^{1,p}(\Omega)$). *Die obigen Einbettungssätze gelten auch für $W_0^{1,p}$ -Räume.*

BEWEIS. Klar, da $W_0^{1,p}(\Omega) \subset W^{1,p}(\Omega)$. \square

BEMERKUNG 5.12 (Vektorwertige Sobolev-Räume). *Sei $m \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{N}_0$, $1 \leq p \leq \infty$ und $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ offen. Wir definieren*

$$W^{k,p}(\Omega, \mathbb{R}^m) := \{f = (f_1, \dots, f_m) : f_i \in W^{k,p}(\Omega), i = 1, \dots, m\}.$$

Dann gelten die Sätze für $W^{k,p}(\Omega)$ auch für vektorwertige Sobolev-Räume.

BEWEIS. Sätze komponentenweise anwenden. \square

6. Sobolev Räume IV. Spurooperatoren

SATZ 6.1 (Spursatz (Halbraum)). *Sei $1 \leq p < \infty$. Dann existiert eine eindeutige stetige Abbildung $\Gamma_{\mathbb{R}_+^d} : W^{1,p}(\mathbb{R}_+^d) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^{d-1})$ mit*

$$\Gamma_{\mathbb{R}_+^d} u = u|_{\partial \mathbb{R}_+^d}, \quad u \in C_c^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^d}).$$

BEWEIS. Ü.A. \square

SATZ 6.2. *Sei $1 \leq p < \infty$. Dann gilt:*

$$u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}_+^d) \Leftrightarrow \Gamma_{\mathbb{R}_+^d} u = 0, \quad u \in W^{1,p}(\Omega).$$

BEWEIS. Die Richtung von links nach rechts ist klar. Sei nun $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^d)$ mit $\Gamma_{\mathbb{R}_+^d} u = 0$ und $(u_n) \subset C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ mit $u_n \rightarrow u$ in $W^{1,p}(\mathbb{R}_+^d)$. Wir bezeichnen die Fortsetzung von u mit 0 auf \mathbb{R}^d mit \tilde{u} und zeigen, dass $\tilde{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ liegt, wobei $D^\alpha \tilde{u}$ die Fortsetzung von $D^\alpha u$ mit 0 auf \mathbb{R}^d ist. Es gilt

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} D^\alpha \tilde{u} \varphi &= \int_{\mathbb{R}_+^d} D^\alpha u \varphi = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}_+^d} D^\alpha u_n \varphi \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(- \int_{\mathbb{R}_+^d} u_n D^\alpha \varphi + \int_{\partial \mathbb{R}_+^d} u_n \varphi \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}_+^d} u_n D^\alpha \varphi = \int_{\mathbb{R}_+^d} u D^\alpha \varphi = \int_{\mathbb{R}^d} \tilde{u} D^\alpha \varphi, \\ &|\alpha| \leq 1, \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d), \end{aligned}$$

da

$$\left| \int_{\partial \mathbb{R}_+^d} u_n \varphi \right| \leq \|\Gamma_{\mathbb{R}_+^d} u_n\|_{L^p(\mathbb{R}^{d-1})} \|\varphi\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^{d-1})} \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty.$$

Daher liegt $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$. Da $h \mapsto T_{\vec{h}} u$ (vgl. 1. Übungsblatt) für $\vec{h} = (0, 0, 0, \dots, h)$ eine stetige Abbildung mit Werten in $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ ist, folgt die Behauptung nach Lemma 3.10 (d). \square

SATZ 6.3 (Spursatz). Sei $1 \leq p < \infty$ und $\emptyset \neq \Omega \subset \mathbb{R}_+^d$ beschränkt und von der Klasse C^1 . Dann existiert eine eindeutige stetige Abbildung $\Gamma_\Omega : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow L^p(\partial\Omega)$ mit

$$\Gamma_\Omega u = u|_{\partial\Omega}, \quad u \in C_c^\infty(\overline{\Omega}).$$

BEWEIS. Nach Voraussetzung existiert eine Überdeckung U_j des Randes von Ω . Wir bezeichnen wieder die zugehörigen Diffeomorphismen mit Φ_j . Weiter sei φ_j eine der Überdeckung U_j untergeordnete Zerlegung der Eins und $\psi_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ mit $0 \leq \psi_j \leq 1$ und $\text{supp } \varphi_j \subset \subset \{\psi_j \equiv 1\}$. Wir definieren

$$\Gamma_\Omega u := \sum \varphi_j (\Gamma_{\mathbb{R}_+^d} (\psi_j u) \circ \Phi_j) \circ \Phi_j^{-1}.$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} (\Gamma_\Omega u)(x) &= \sum \varphi_j(x) (\Gamma_{\mathbb{R}_+^d} (\psi_j u) \circ \Phi_j) \circ \Phi_j^{-1}(x) \\ &= \sum \varphi_j(x) ((\psi_j u) \circ \Phi_j) \circ \Phi_j^{-1}(x) = \sum \varphi_j(x) (\psi_j u)(x) \\ &= u(x), \quad x \in \partial\Omega, \quad u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d). \end{aligned}$$

\square

SATZ 6.4. Sei $1 \leq p < \infty$, $\emptyset \neq \Omega \subset \mathbb{R}^d$ und von der Klasse C^1 . Dann gilt:

$$u \in W_0^{1,p}(\Omega) \Leftrightarrow \Gamma_\Omega u = 0, u \in W^{1,p}(\Omega).$$

BEWEIS. Ü.A. Lokalisierung unter Verwendung von Satz 6.2. □

BEMERKUNG 6.5. Es stellt sich die Frage, ob die Abbildung $\Gamma_\Omega : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$ surjektiv ist, d.h. kann jede L^p -Funktion auf dem Rand ins Innere fortgesetzt werden?

Antwort: Nein, man kann aber zeigen, dass $\Gamma_\Omega : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1-\frac{1}{p},p}(\partial\Omega)$ für $1 < p < \infty$ surjektiv ist. Hier:

$$W^{s,p}(\partial\Omega) := \left\{ u \in L^p(\partial\Omega) : \int \int_{\partial\Omega \partial\Omega} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{d+sp}} dx dy < \infty \right\}, \quad s \in (0, 1).$$

Elliptische Randwertproblem in L^2

1. Elliptische Randwertprobleme

NOTATION 1.1. Die Sobolevräume werden im Falle $p = 2$ mit $H^m(\Omega) = W^{m,2}(\Omega)$ bzw. mit $H_0^m(\Omega) = W_0^{m,2}(\Omega)$ bezeichnet.

BEMERKUNG 1.2. Die Räume H^m und H_0^m sind Hilberträume mit dem Skalarprodukt

$$\langle f, g \rangle := \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} D_{\alpha} f \overline{D_{\alpha} g}.$$

Insbesondere sind sie reflexiv. Die Norm ist hier gegeben durch das Skalarprodukt

$$\|f\|_{H^m(\Omega)} := \langle f, f \rangle^{1/2} := \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |D_{\alpha} f|^2 \right)^{1/2},$$

welches zu der $W^{m,2}$ -Norm äquivalent ist.

Im Folgenden nehmen wir stillschweigend $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ an, aber natürlich gelten die Resultate auch im Falle $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

LEMMA 1.3. Sei $\emptyset \neq \Omega \subset \mathbb{R}^d$ offen, beschränkt und von der Klasse C^1 . Sei $(u_n) \subseteq H^1(\Omega)$ schwach konvergent gegen ein u . Dann konvergiert u_n in $L^2(\Omega)$ gegen u .

BEWEIS. Die Einbettung $H^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$ ist kompakt (siehe Theorem 5.9). Nehmen wir an, dass eine Teilfolge u_{n_k} existiert mit $\|u_{n_k} - u\|_{L^2(\Omega)} \geq \varepsilon$ für ein festes $\varepsilon > 0$ und für alle n_k . Diese Teilfolge wird auch mit u_n bezeichnet. Da (u_n) beschränkt in $H^1(\Omega)$ ist, hat es eine $L^2(\Omega)$ -konvergente Teilfolge $u_{n_k} \rightarrow u'$. Aber $u_{n_k} \rightarrow u$ schwach in $H^1(\Omega)$ also auch schwach in $L^2(\Omega)$, was zu dem Widerspruch $u' = u$ führt. \square

BEMERKUNG 1.4. Natürlich gilt das obige Resultat für $W^{1,p}$ Räume, so lange $1 < p < \infty$ ist.

1.1. Elliptische Gleichungen 2. Ordnung mit Dirichlet Randbedingungen. Sei $\emptyset \neq \Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ offen und beschränkt. Seien $a_{ji} = a_{ij} \in C^1(\overline{\Omega})$, $1 \leq i, j \leq d$ und $a_0 \in C(\overline{\Omega})$, $a_0(x) \geq 0$ für jedes $x \in \Omega$. Wir setzen im Folgenden die sogenannte *Elliptizitätsbedingung* voraus:

$$\sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \xi_i \xi_j > \alpha |\xi|^2, \quad \forall x \in \Omega, \forall \xi \in \mathbb{R}^d,$$

für ein $\alpha > 0$, d.h. die Matrix mit den Einträgen (a_{ij}) ist positiv definit.

PROBLEM 1.5 (Dirichlet-Randbedingung). *Finde $u : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ mit*

$$(P) \quad \begin{cases} - \sum_{i,j=1}^d \frac{\partial}{\partial x_j} (a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i}) + a_0 u = f & \text{in } \Omega \\ u = 0 & \text{auf } \partial\Omega \end{cases}$$

Klassische Lösung: Eine Funktion $u \in C^2(\bar{\Omega})$, welche (P) erfüllt.

Schwache Lösung: Eine Funktion $u \in H_0^1(\Omega)$ mit

$$(SP) \quad + \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^d a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} + \int_{\Omega} a_0 u v = \int_{\Omega} f v, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Schritt 1: Klassische Lösungen sind auch schwache Lösungen

Falls $u \in C^2(\bar{\Omega})$ gilt auch $u \in H^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$. Da $u|_{\partial\Omega} = 0$, liegt u in $H_0^1(\Omega)$. Multiplikation mit $v \in C_c^\infty(\Omega)$ und partielle Integration liefern (SP) für $v \in C_c^\infty(\Omega)$. Der Dichtesatz 3.7 gibt (P) für alle $v \in H_0^1(\Omega)$.

Schritt 2: Existenz von schwachen Lösungen

Seien nun $a_{ij} \in L^\infty(\Omega)$, $f \in L^2(\Omega)$. Dann existiert eine eindeutige Lösung $u \in H_0^1(\Omega)$ des schwachen Problems (SP), mit

$$\|u\|_{H_0^1(\Omega)} \leq C \|f\|_{L^2(\Omega)}$$

mit einer von f unabhängigen Konstanten C .

BEWEIS. Setze

$$\begin{aligned} a(u, v) &:= \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^d a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} + \int_{\Omega} a_0 u v, \\ b(v) &:= \int_{\Omega} f v, \quad v \in H_0^1(\Omega). \end{aligned}$$

Dann ist a eine stetige Bilinearform auf $H_0^1(\Omega)$, denn

$$\begin{aligned} |a(u, v)| &\leq C \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)} + C \|u\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq C' \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}. \end{aligned}$$

Genauso sieht man, dass das lineare Funktional b stetig ist. Die Bilinearform a ist auch koerziv, denn

$$\begin{aligned}
a(u, u) &= \int_{\Omega} \left(\sum_{i,j=1}^d a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} + a_0 u^2 \right) \stackrel{\text{ellipt.}}{\geq} \int_{\Omega} \alpha |\nabla u|^2 + a_0 \int_{\Omega} |u|^2 \\
&\geq \alpha \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 = \alpha \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \varepsilon \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 - \varepsilon \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 \\
&= \varepsilon \|u\|_{H^1(\Omega)}^2 + (\alpha - \varepsilon) \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 - \varepsilon \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 \\
&\stackrel{\text{Poincaré}}{\geq} \varepsilon \|u\|_{H^1(\Omega)}^2 + \frac{(\alpha - \varepsilon)}{C_{\Omega}^2} \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 - \varepsilon \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 \\
&= \varepsilon \|u\|_{H^1(\Omega)}^2 + \left(\frac{\alpha}{C_{\Omega}^2} - \varepsilon \left(1 + \frac{1}{C_{\Omega}^2} \right) \right) \|u\|_{L^2(\Omega)}^2.
\end{aligned}$$

Für genügend kleines $\varepsilon > 0$ folgt die Koerzivität von a , d.h. $a(u, u) \geq \varepsilon \|u\|_{H^1(\Omega)}^2$, $u \in H_0^1(\Omega)$. Verwendung vom Lax–Milgram Lemma liefert die Existenz und die Eindeutigkeit der Lösung (vgl. ÜA).

Die schwache Lösung u erfüllt

$$\|u\|_{H_0^1}^2 \leq \frac{1}{\varepsilon} a(u, u) = \frac{1}{\varepsilon} b(u) = \int_{\Omega} f u \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|u\|_{L^2(\Omega)}.$$

Dies zeigt $\|u\|_{H_0^1} \leq \frac{1}{\varepsilon} \|f\|_{L^2(\Omega)}$, also die gewünschte Normabschätzung. \square

Schritt 3: Regularität der Lösung

Seien $a_{ij}(x) = \delta_{ij}$ für alle $x \in \Omega$ und Ω offen, beschränkt, von der Klasse C^2 . Sei $f \in L^2(\Omega)$, $u \in H_0^1(\Omega)$ schwache Lösung von (P). Dann gilt

- (a) $u \in H^2(\Omega)$ und $\|u\|_{H^2(\Omega)} \leq c \|f\|_{L^2(\Omega)}$.
- (b) Ist $f \in H^m(\Omega)$ und $\partial\Omega$ der Klasse $C^{m+2} \implies u \in H^{m+2}(\Omega)$ und $\|u\|_{H^{m+2}(\Omega)} \leq C \|f\|_{H^m(\Omega)}$.

BEWEIS. Siehe Kapitel 2. \square

KOROLLAR 1.6. Sei $f \in H^m(\Omega)$ und $u \in H^{m+2}(\Omega)$ die schwache Lösung von (P). Die Sobolevschen Einbettungsätze 4.9 geben $W^{l,p}(\Omega) \hookrightarrow C^2(\Omega)$, falls $l > 2 + d/p$. Für $p = 2$ und $m > d/2$ gilt $u \in H^{m+2}(\Omega) \hookrightarrow C^2(\overline{\Omega})$.

Schritt 4: Rückkehr zur klassischen Lösung

Sei $f \in H^m(\Omega)$ mit $m > d/2$. Dann existiert eine schwache Lösung $u \in H_0^1(\Omega) \cap C^2(\overline{\Omega})$. Ferner partielle Integration und Dichtheitsargument liefern die Existenz klassischer Lösungen.

2. L^2 -Regularitätstheorie

Sei $\emptyset \neq \Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ offen und beschränkt. Seien $a_{ji} = a_{ij} \in C^1(\overline{\Omega})$, $1 \leq i, j \leq d$ und $b_i, a_0 \in C(\overline{\Omega})$, $1 \leq i \leq d$. Wir setzen die Elliptizitätsbedingung voraus. Wir untersuchen zunächst die Regularität von Lösungen der folgenden

Gleichung für $f \in L^2(\Omega)$.

$$(14) \quad - \sum_{i,j=1}^d \partial_j (a_{ij} \partial_i u) + \sum_{i=1}^d b_i \partial_i u + a_0 u = f \quad \text{in } \Omega.$$

THEOREM 2.1 (Innere Regularität). *Sei $f \in L^2(\Omega)$ und $u \in H^1(\Omega)$ eine schwache Lösung von (14). Dann ist $u \in H_{loc}^2(\Omega)$ und für $V \subset\subset \Omega$ gilt:*

$$\|u\|_{H^2(V)} \leq C (\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{L^2(\Omega)}),$$

wobei C nur von Ω , V und a_{ij} , b_i und a_0 abhängt.

BEWEIS. Wir betrachten nur den Fall $a_{ij} = \delta_{ij}$, $b_i = a_0 = 0$. Zu $V \subset \Omega$ wähle $W_1 \subset \Omega$ und $W_2 \subset \Omega$ offen mit

$$\overline{V} \subset W_1 \subset \overline{W_1} \subset W_2 \subset \overline{W_2} \subset \Omega$$

und $\xi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ mit $\xi = 1$ auf V , $\xi = 0$ auf $\mathbb{R}^d \setminus W_1$ und $0 \leq \xi \leq 1$. Betrachte

$$(15) \quad \int_{\Omega} (\nabla \varphi)(\nabla u) = \int_{\Omega} \varphi f, \quad \varphi \in H_0^1(\Omega)$$

Setze $\varphi = -D_k^{-h}(\xi^2 D_k^h u)$, wobei

$$D_k^h u(x) = \frac{u(x + h e_k) - u(x)}{h}, \quad h \neq 0.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \varphi f &= \int_{\Omega} \nabla \varphi \nabla u = \int_{\Omega} \nabla \left(D_k^{-h}(\xi^2 D_k^h u) \right) \nabla u = \int_{\Omega} \nabla \left((\xi^2 D_k^h u) \right) D_k^h \nabla u \\ &= \int_{\Omega} 2\xi(\nabla \xi) D_k^h u D_k^h \nabla u + \int_{\Omega} \xi^2 D_k^h(\nabla u) D_k^h \nabla u \\ &\geq -C \|D_k^h u\|_{L^2(W_1)} \|\xi D_k^h \nabla u\|_{L^2(W_1)} + \|\xi D_k^h \nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 \\ &\geq \frac{1}{2} \|\xi D_k^h \nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 - C \|\nabla u\|_{L^2(W_1)}^2. \end{aligned}$$

Weiter

$$\begin{aligned} \|\varphi\|_{L^2(\Omega)}^2 &\leq C \|\nabla(\xi^2 D_k^h u)\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C (\|2\xi \nabla \xi D_k^h u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|\xi^2 \nabla D_k^h u\|_{L^2(\Omega)}^2) \\ &\leq C \left(\|D_k^h u\|_{L^2(W_1)}^2 + \|\xi^2 D_k^h \nabla u\|_{L^2(W_1)}^2 \right) \\ &\leq C \left(\|\nabla u\|_{L^2(W_1)}^2 + \|\xi^2 D_k^h \nabla u\|_{L^2(W_1)}^2 \right) \end{aligned}$$

und damit

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} \varphi f \right| &\leq C \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\varphi\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq C \|f\|_{L^2(\Omega)} (\|\nabla u\|_{L^2(W_1)} + \|\xi^2 D_k^h \nabla u\|_{L^2(W_1)}) \\ &\leq C \left(\|f\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|u\|_{H^1(W_1)}^2 + \frac{1}{4} \|\xi^2 D_k^h \nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 \right). \end{aligned}$$

Also,

$$\frac{1}{4} \|D_k^h \nabla u\|_{L^2(V)}^2 \leq \frac{1}{4} \|\xi D_k^h \nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C (\|f\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|u\|_{H^1(W_1)}^2)$$

für h klein genug, d.h. $\nabla u \in H^1(V)$ und

$$\|u\|_{H^2(V)} \leq C (\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{H^1(W_1)}).$$

Wähle $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ mit $\eta = 1$ auf W_1 , $\eta = 0$ auf $\mathbb{R}^d \setminus W_2$ und $0 \leq \eta \leq 1$. Mit $\varphi = \eta^2 u$ in (15) erhalten wir

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f \varphi &= \int_{\Omega} (\nabla \varphi) \nabla u = \int_{\Omega} \eta^2 (\nabla u) (\nabla u) + \int_{\Omega} 2\eta (\nabla \eta) u \nabla u \\ &\geq \|\eta \nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 - C \|u\|_{L^2(W_2)} \|\eta \nabla u\|_{L^2(W_2)} \\ &\geq \frac{1}{2} \|\eta \nabla u\|_{L^2(W_2)}^2 - C \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} \varphi f \right| &\leq C (\|f\|_{L^2(\Omega)} \|u\|_{L^2(\Omega)}) \\ &\leq C \left(\|f\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 \right), \end{aligned}$$

d.h.

$$\|\nabla u\|_{L^2(W_1)} \leq \|\eta \nabla u\|_{L^2(\Omega)} \leq \left(\|f\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 \right).$$

Also

$$\|u\|_{H^1(W_2)} \leq C (\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{L^2(\Omega)}).$$

□

THEOREM 2.2 (Höhere innere Regularität). Sei $a_{ij}, a_0, b_i \in C^{m+1}(\overline{\Omega})$, $m \in \mathbb{N}$, $f \in H^m(\Omega)$ und $u \in H^1(\Omega)$ eine schwache Lösung von (14). Dann ist $u \in H_{\text{loc}}^{m+2}(\Omega)$ und für $V \subset\subset \Omega$ gilt:

$$\|u\|_{H^{m+2}(V)} \leq C (\|f\|_{H^m(\Omega)} + \|u\|_{L^2(\Omega)}),$$

wobei C nur von Ω , V und a_{ij} , b_i , a_0 abhängt.

BEWEIS. Der Fall $m = 0$ ist klar. Wir betrachten nur den Fall $b_i = a_0 = 0$. Sei nun $m \in \mathbb{N}$ und das Theorem gelte für m . Insbesondere gilt dann $u \in H_{\text{loc}}^{2+m}(\Omega)$ und für alle $V \subset\subset \Omega$ existiert $C > 0$ mit

$$(16) \quad \|u\|_{H^{2+m}(V)} \leq C(\|f\|_{H^m(\Omega)} + \|u\|_{L^2(\Omega)}), \quad f \in H^m(\Omega).$$

Wir zeigen, dass das Theorem dann auch für $m + 1$ gilt.

Sei $W \subset \Omega$ mit $\bar{V} \subset W \subset \bar{W} \subset \Omega$ und $|\alpha| = m + 1$. Wähle $\tilde{\varphi} \in C_c^\infty(W)$ und $\varphi = (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \tilde{\varphi}$. Mit partieller Integration erhalten wir

$$(17) \quad \sum_{i,j=1}^d \int_{\Omega} a_{ij} \partial_i \tilde{\varphi} \partial_j \tilde{u} = \int_{\Omega} \tilde{\varphi} \tilde{f}$$

mit $\tilde{u} = D^\alpha u \in H^1(W)$ und

$$\tilde{f} = D^\alpha f - \sum_{\beta \leq \alpha, \beta \neq \alpha} \left[- \sum_{i,j=1}^d \partial_i (D^{\alpha-\beta} a_{ij} D^\beta \partial_j u) \right].$$

Insbesondere folgt aus (16) $\tilde{f} \in L^2(W)$ und

$$\|f\|_{L^2(W)} \leq C(\|f\|_{H^{m+1}(\Omega)} + \|u\|_{L^2(\Omega)}).$$

Daher folgt mit Theorem 2.1

$$\|\tilde{u}\|_{H^2(V)} \leq C(\|\tilde{f}\|_{L^2(W)} + \|\tilde{u}\|_{L^2(W)}) \leq C(\|f\|_{H^{m+1}(\Omega)} + \|u\|_{L^2(\Omega)}),$$

d.h. $\|u\|_{H^{m+3}(V)} \leq C(\|f\|_{H^{m+1}(\Omega)} + \|u\|_{L^2(\Omega)})$. \square

Im nächsten Schritt betrachten wir das Problem

$$(18) \quad - \sum_{i,j=1}^d \partial_j (a_{ij} \partial_i u) + \sum_{i=1}^d b_i \partial_i u + a_0 u = f \text{ in } \Omega$$

$$u = 0 \text{ auf } \partial\Omega.$$

THEOREM 2.3. Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ beschränkt von der Klasse C^2 , $f \in L^2(\Omega)$ und $u \in H_0^1(\Omega)$ eine schwache Lösung von (18). Dann ist $u \in H^2(\Omega)$ und es gilt:

$$\|u\|_{H^2(\Omega)} \leq C(\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{L^2(\Omega)}),$$

wobei C nur von Ω und a_{ij} , b_i , a_0 abhängt.

BEWEIS. Wir betrachten wieder nur den Fall $a_{ij} = \delta_{ij}$, $b_i = a_0 = 0$.

Schritt 1:

Sei $\Omega = B(0, 1) \cap \mathbb{R}_+^d$ und setze $V = B(0, \frac{1}{2}) \cap \mathbb{R}_+^d$. Wähle $\xi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ mit $\xi \equiv 1$ auf $B(0, \frac{1}{2})$, $\xi \equiv 0$ auf $\mathbb{R}^d \setminus B(0, 1)$ und $0 \leq \xi \leq 1$. Sei $u \in H^1(\Omega)$ mit $u|_{\partial\Omega \cap \partial\mathbb{R}_+^d} = 0$ und

$$\int_{\Omega} (\nabla \varphi)(\nabla u) = \int_{\Omega} \varphi f, \quad \varphi \in H_0^1(\Omega),$$

Für $k = 1, \dots, d-1$ setze $\varphi := -D_k^{-h}(\xi^2 D_k^h u)$. Da

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= -\frac{1}{h} D_k^{-h}(\xi^2(x)[u(x+he_k) - u(x)]) \\ &= \frac{1}{h^2}(\xi^2(x-he_k)[u(x) - u(x-he_k)] - \xi^2(x)[u(x+he_k) - u(x)]), \\ &\quad x \in \Omega,\end{aligned}$$

folgt $\varphi \in H_0^1(\Omega)$. Wie im Beweis von Theorem 2.1 erhalten wir

$$\|D_k^h \nabla u\|_{L^2(V)}^2 \leq C \left(\|f\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|u\|_{H_0^1(\Omega)}^2 \right),$$

d.h. $\partial_k u \in H^1(V)$ für $k = 1, \dots, d-1$ und

$$(19) \quad \sum_{k,l=1, k+l < 2d}^d \|\partial_k \partial_l u\|_{L^2(V)} \leq C \left(\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{H^1(\Omega)} \right).$$

Desweiteren gilt:

$$-\partial_d^2 u = \sum_{i=1}^{d-1} \partial_i^2 u - \Delta u = \sum_{i=1}^{d-1} \partial_i^2 u + f.$$

Damit (i. A. aus der Elliptizität)

$$(20) \quad \|\partial_d^2 u\|_{L^2(V)} \leq C \left(\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{H^1(\Omega)} \right).$$

Außerdem gilt:

$$(21) \quad \alpha \|u\|_{H^1(\Omega)}^2 \leq \int_{\Omega} (\nabla u)(\nabla u) = \int_{\Omega} u f \leq \|f\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|u\|_{L^2(\Omega)}^2$$

Aus (19), (20) und (21) folgt nun

$$\|u\|_{H^2(V)} \leq C \left(\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{L^2(\Omega)} \right).$$

Schritt 2:

Sei nun Ω beliebig und wähle zu $x \in \partial\Omega$

$$\Phi_x : \Omega' := B(x, r) \cap \mathbb{R}_+^d \rightarrow U(x),$$

$V' := B(x, r/2) \cap \mathbb{R}^d$ für ein $r > 0$ (vgl. Definition 5.2. Setze $V := \Phi_x(V')$ und $u' = u \circ \Phi_x$. Dann gilt $u' \in H^1(\Omega')$, $u|_{\partial\Omega' \cap \mathbb{R}_+^d} = 0$ und (dies ist noch zu Zeigen)

$$\sum_{i,j=1}^d \int_{\Omega} a'_{ij} \partial_j \varphi' \partial_i u' = \int_{\Omega} \sum_{i=1}^d b'_i \varphi' \partial_i u' + \int_{\Omega} a'_0 \varphi' u' + \int_{\Omega} \varphi' f',$$

mit $f' = f \circ \Phi_x$ und geeigneten a'_{ij} , b'_i und a'_0 . Außerdem gilt (auch dies ist noch zu Zeigen)

$$\sum_{i,j=1}^d a'_{ij} \xi_i \xi_j \geq \alpha' |\xi|^2, \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

Nach dem ersten Schritt ist $u' \in H^2(V')$ und es gilt

$$\|u'\|_{H^2(V')} \leq C(\|f'\|_{L^2(\Omega')} + \|u'\|_{L^2(\Omega')}),$$

wobei $C > 0$ unabhängig von f' ist. Also ist $u \in H^2(V)$ und es gilt

$$\|u\|_{H^2(V)} \leq C(\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{L^2(\Omega)})$$

mit einer von f unabhängigen Konstante C .

Da $\partial\Omega$ kompakt ist, können wir $\partial\Omega$ mit endlich vielen V_1, \dots, V_N überdecken.

Dies liefert zusammen mit der inneren Regularität die gewünschte Abschätzung. \square

Analog zu Theorem 2.2 erhalten wir

THEOREM 2.4. *Sei $a_{ij}, b_i, a_0 \in C^{m+1}(\bar{\Omega})$, $m \in \mathbb{N}$, $f \in H^m(\Omega)$ und $u \in H_0^1(\Omega)$ eine schwache Lösung von (18). Dann ist $u \in H^{m+2}(\Omega)$ und es gilt:*

$$\|u\|_{H^{m+2}(\Omega)} \leq C(\|f\|_{H^m(\Omega)} + \|u\|_{L^2(\Omega)}),$$

wobei C nur von Ω und a_{ij}, b_i, a_0 abhängt.

BEWEIS. Ohne Beweis. \square

KOROLLAR 2.5. *Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ von der Klasse C^2 , $b_i = 0$, $a_0(x) \geq 0$ für $x \in \Omega$, $f \in L^2(\Omega)$ und $u \in H_0^1(\Omega)$ eine schwache Lösung von (18). Dann ist $u \in H^2(\Omega)$ und es gilt:*

$$\|u\|_{H^2(\Omega)} \leq C\|f\|_{L^2(\Omega)},$$

wobei C nur von Ω und a_{ij}, a_0 abhängt.

BEWEIS. Lax-Milgram liefert $\|u\|_{H^1(\Omega)} \leq C\|f\|_{L^2(\Omega)}$. (Die Einschränkung an die Koeffizienten liefert die Koerzivität). \square

Temperierte Distributionen und die Fouriertransformation

In diesem Kapitel entwickeln wir die wesentlichen Eigenschaften der Fouriertransformation. Für unsere Zwecke notwendig ist dabei eine Einführung in die Theorie der Distributionen, die wir voranstellen wollen. Wir werden uns hier jedoch auf temperierte Distributionen beschränken.

1. Temperierte Distributionen

DEFINITION 1.1 (Schnell fallende Funktionen). *Eine Funktion $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ heißt schnell fallend, falls für alle Multiindizes $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$*

$$d_{\alpha,\beta}(\varphi) := \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{|x^\alpha D^\beta \varphi(x)|\} < \infty.$$

Wir bezeichnen die Menge aller schnell fallenden Funktionen mit \mathcal{S} . Weiter versehen wir \mathcal{S} mit der Topologie, die von der Menge der Halbnormen $\{d_{\alpha,\beta} : \alpha, \beta \in \mathbb{N}^d\}$ induziert wird.

BEMERKUNG 1.2. (a) *Nach Definition konvergiert eine Folge $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}$ gegen $\varphi \in \mathcal{S}$, wenn $d_{\alpha,\beta}(\varphi_n - \varphi) \rightarrow 0$ für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^d$ gilt.*

(b) *Der Raum der schnell fallenden Funktionen ist ein Fréchet-Raum. Denn eine abzählbare Familie von Halbnormen ist gegeben durch*

$$d_j(\varphi) := \sup_{|\alpha|=j} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{(1 + |x|^2)^j |D^\alpha \varphi(x)|\}, \quad j \in \mathbb{N}.$$

und

$$d(\varphi, \psi) := \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2^{-j} d_j(\varphi - \psi)}{1 + d_j(\varphi - \psi)}$$

definiert eine Metrik auf \mathcal{S} mit der dieser Raum vollständig ist.

DEFINITION 1.3. *Der Dualraum von \mathcal{S} (versehen mit der schwach-* Topologie) heißt der Raum der temperierten Distributionen und wird mit \mathcal{S}' bezeichnet. D.h.:*

$$\mathcal{S}' := \{f : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{C} : f \text{ ist linear und stetig}\}.$$

Wir schreiben $\langle f, \varphi \rangle$ für die duale Paarung zwischen \mathcal{S}' und \mathcal{S} .

BEMERKUNG 1.4. (a) *Eine Folge $(T_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}'$ konvergiert gegen $T \in \mathcal{S}'$, falls $\langle T_n - T, \varphi \rangle \rightarrow 0$ für alle Testfunktionen $\varphi \in \mathcal{S}$.*

(b) Die Definition der Ableitung stimmt für stetig differenzierbare Funktionen mit der üblichen Definition der Ableitung überein.

BEISPIELE 1.5. (a) Es sei $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ messbar mit $\int (1+|x|^2)^{-r} f(x) dx < \infty$ für ein $r \geq 0$. Dann definiert

$$T_f(\varphi) := \int f \varphi \, dx$$

eine temperierte Distribution. Insbesondere ist also in diesem Sinne $L^p(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'$ für $1 \leq p \leq \infty$.

(b) Das Auswertfunktional $\delta(\varphi) := \varphi(0)$ definiert ebenfalls eine temperierte Distribution die sogenannte Diracsche δ -Distribution.

(c) Cauchy Hauptwert:

Durch

$$ch - \frac{1}{x}(\varphi) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \varphi(x) \frac{1}{x} \, dx$$

wird eine Distribution in $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ definiert.

BEWEIS. Einfach, bzw. in den Übungen. □

DEFINITION UND SATZ 1.6. Es seien $T \in \mathcal{S}'$, $\psi \in \mathcal{S}$ und p ein Polynom.

(a) Die Ableitung D_i in Richtung $i = 1, \dots, d$ ist definiert durch

$$\langle D_i T, \varphi \rangle := -\langle T, D_i \varphi \rangle.$$

(b) Die Multiplikation von T mit ψ bzw. p ist definiert durch

$$\langle \psi T, \varphi \rangle := \langle T, \psi \varphi \rangle \quad \varphi \in \mathcal{S}$$

$$\langle pT, \varphi \rangle := \langle T, p\varphi \rangle \quad \varphi \in \mathcal{S}$$

Diese Definitionen sind wohldefiniert, d.h. für $\alpha \in \mathbb{N}^d$ gilt $D^\alpha T$, pT , $\psi T \in \mathcal{S}'$.

BEWEIS. Übung □

Mit Hilfe der Notation $\tilde{\tau}_x g(y) := g(x - y)$ übertragen wir die Faltung auf Distributionen.

DEFINITION 1.7 (Faltung von Distributionen mit Funktionen). Es seien $T \in \mathcal{S}'$, $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$. Dann definieren wir die Faltung $T * \varphi$ durch

$$(T * \varphi)(x) = \langle T, \tilde{\tau}_x \varphi \rangle.$$

SATZ 1.8. Es seien $T \in \mathcal{S}'$ und $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, dann gilt $T * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ mit $D_j(T * \varphi) = (D_j T) * \varphi = T * (D_j \varphi)$.

BEWEIS. 1. $T * \varphi$ ist stetig:

Es gilt $\tilde{\tau}_z \varphi(y) - \tilde{\tau}_x \varphi(y) = \varphi(z - y) - \varphi(x - y)$ und damit folgt $\tilde{\tau}_z \varphi(y) \rightarrow \tilde{\tau}_x \varphi(y)$ in \mathcal{S} , falls $z \rightarrow x$ (MWS). Also $\langle T, \tilde{\tau}_z \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \tilde{\tau}_x \varphi \rangle$ und damit $\lim_{z \rightarrow x} (T * \varphi)(z) = (T * \varphi)(x)$.

2. Differenzierbarkeit: Es sei $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und e_i der i -te Einheitsvektor. Dann gilt

$$\frac{1}{h} (\tilde{\tau}_{x+he_i}\varphi - \tilde{\tau}_x\varphi)(y) = \frac{1}{h} (\varphi(x + he_i - y) - \varphi(x - y)).$$

Wie oben folgt daher $\frac{1}{h} (\tilde{\tau}_{x+he_i}\varphi - \tilde{\tau}_x\varphi) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \tilde{\tau}_x(\partial_i\varphi)$ in \mathcal{S} . Also folgt

$$\begin{aligned} \partial_i(T * \varphi)(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \langle T, \tilde{\tau}_{x+he_i}\varphi - \tilde{\tau}_x\varphi \rangle \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \langle T, \frac{1}{h} (\tilde{\tau}_{x+he_i}\varphi - \tilde{\tau}_x\varphi) \rangle \\ &\stackrel{T \text{ stetig}}{=} \langle T, \tilde{\tau}_x\partial_i\varphi \rangle \\ &\stackrel{\text{Def}}{=} (T * \partial_i\varphi)(x) \end{aligned}$$

und damit existiert die partielle Ableitung von $T * \varphi$ mit $\partial_i(T * \varphi) = T * \partial_i\varphi$. Insbesondere ist damit $\partial_i(T * \varphi)$ eine stetige Funktion. Mit Induktion folgt schließlich $(T * \varphi) \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$.

3. $\partial_i(T * \varphi) = (\partial_i T) * \varphi$:

Es gilt $(\partial_i\varphi)(x - y) = -(\partial_i\varphi(x - \cdot))(y)$, also ist auch $\partial_i(\tilde{\tau}_x\varphi) = -\tilde{\tau}_x(\partial_i\varphi)$ damit rechnen wir unter Verwendung von Obigem

$$\begin{aligned} \partial_i(T * \varphi)(x) &= (T * \partial_i\varphi)(x) = \langle T, \tilde{\tau}_x(\partial_i\varphi) \rangle \\ &= \langle T, -\partial_i(\tilde{\tau}_x\varphi) \rangle = \langle \partial_i T, \tilde{\tau}_x\varphi \rangle = ((\partial_i T) * \varphi)(x). \end{aligned}$$

□

2. Die Fouriertransformation

DEFINITION 2.1. Für $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ ist die Fouriertransformation von f definiert durch

$$\mathcal{F}f(\xi) := \hat{f}(\xi) := \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-i\langle x, \xi \rangle} f(x) \, dx.$$

LEMMA 2.2. Es sei $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. Dann ist $\hat{f} \in \text{BC}(\mathbb{R}^d)$ und es gilt

$$\|\hat{f}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)} \leq \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}.$$

BEWEIS. Es sei $\xi \in \mathbb{R}^d$ und $(\xi_k) \subset \mathbb{R}^d$ mit $\xi_k \rightarrow \xi$. Dann gilt

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\hat{f}(\xi_k) - \hat{f}(\xi)| \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left| e^{-i\langle x, \xi_k \rangle} - e^{-i\langle x, \xi \rangle} \right| \stackrel{\text{Lebesgue}}{=} 0,$$

d.h. \hat{f} ist stetig. Desweiteren gilt:

$$|\hat{f}(\xi)| \leq \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \, dx = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}, \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

□

SATZ 2.3. *Es seien $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $k \in \mathbb{N}_0$. Dann gilt:*

$$(a) \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}g = \int_{\mathbb{R}^d} f\widehat{g}.$$

$$(b) \widehat{f * g} = (2\pi)^{\frac{d}{2}} \widehat{f} \cdot \widehat{g}.$$

(c) *Es sei $x \mapsto x^\alpha f(x) \in L^1(\mathbb{R}^d)$ für alle $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$. Dann gilt*

$$\partial^\alpha \widehat{f} = \widehat{(-ix)^\alpha f}.$$

(d) *Es sei $f \in W^{k,1}(\mathbb{R}^d)$. Dann gilt*

$$\widehat{\partial^\alpha f}(\xi) = (i\xi)^\alpha \widehat{f}(\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^d$$

für alle $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$ mit $|\alpha| \leq k$

(e) *Es gilt $\mathcal{F}(L^1(\mathbb{R}^d)) \subset C_0(\mathbb{R}^d)$ (Riemann-Lebesgue).*

BEWEIS. (a) Wir erhalten mit Fubini:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi)g(\xi) \, d\xi &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-i\langle x, \xi \rangle} \, dx g(\xi) \, d\xi \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \int_{\mathbb{R}^d} g(\xi)e^{-i\langle x, \xi \rangle} \, d\xi \, dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\widehat{g}(x) \, dx \end{aligned}$$

(b) Es gilt:

$$\begin{aligned} \widehat{f * g}(\xi) &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y) \, dy e^{-i\langle x, \xi \rangle} \, dx \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_{\mathbb{R}^d} g(y)e^{-i\langle y, \xi \rangle} \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)e^{-i\langle x-y, \xi \rangle} \, dx \, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} g(y)e^{-i\langle y, \xi \rangle} \widehat{f}(\xi) \, dy = (2\pi)^{\frac{d}{2}} \widehat{g}(\xi) \widehat{f}(\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^d. \end{aligned}$$

(c) Da $\partial_\xi^\alpha e^{-i\langle x, \xi \rangle} = (-ix)^\alpha e^{-i\langle x, \xi \rangle}$ gilt, folgt für $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$

$$\begin{aligned} \partial_j \widehat{\varphi}(\xi) &= \frac{\partial}{\partial \xi_j} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x) e^{-i\langle x, \xi \rangle} \, dx \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x) \frac{e^{-i\langle x, \xi + h e_j \rangle} - e^{-i\langle x, \xi \rangle}}{h} \, dx \\ &\stackrel{\text{Lebesgue}}{=} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x) \frac{\partial}{\partial \xi_j} e^{-i\langle x, \xi \rangle} \, dx \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_{\mathbb{R}^d} -ix_j \varphi(x) e^{-i\langle x, \xi \rangle} \, dx \\ &= \widehat{(-ix)^{e_j} \varphi}(\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^d, \quad j = 1, \dots, d. \end{aligned}$$

Approximiere f mit $(\varphi_n) \subset C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$.

(d) Sei $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$. Dann gilt:

$$\begin{aligned}\widehat{\partial_j \varphi}(\xi) &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_{\mathbb{R}^d} (\partial_j \varphi)(x) e^{-i\langle x, \xi \rangle} dx = -\frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x) (-i\xi_j) e^{-i\langle x, \xi \rangle} dx \\ &= (i\xi)^{e_j} \widehat{\varphi}(\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^d, \quad j = 1, \dots, d.\end{aligned}$$

Approximiere $f \in W^{k,1}(\mathbb{R}^d)$ mit $(\varphi_n) \subset C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$.

(e) Sei $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$. Dann gilt $\partial_x^\alpha \varphi \in L^1(\mathbb{R}^d)$ für alle $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$. Insbesondere folgt aus (d), dass $\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \widehat{\varphi}(\xi) = 0$, d.h. $\widehat{\varphi} \in C_0(\mathbb{R}^d)$.
Approximiere $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ mit $(\varphi_n) \subset C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$. □

BEISPIEL 2.4. Sei $a > 0$ und $f(x) = e^{-a|x|^2}$. Dann gilt:

$$\widehat{f}(\xi) = \left(\frac{1}{2a}\right)^{\frac{d}{2}} e^{-\frac{|\xi|^2}{4a}}.$$

BEWEIS. Sei $d = 1$. Dann gilt

$$\begin{aligned}(\widehat{f})'(\xi) &= \widehat{(-ix)e^{-a|x|^2}}(\xi) = \left(\frac{i}{2a} (e^{-a|x|^2})'\right) \\ &= \frac{i}{2a} (i\xi) \widehat{f}(\xi) = -\frac{1}{2a} \xi \widehat{f}(\xi).\end{aligned}$$

Damit folgt:

$$\frac{d}{d\xi} \left(e^{\frac{|\xi|^2}{4a}} \widehat{f}(\xi) \right) = 0;$$

also ist $e^{|\xi|^2/4a} \widehat{f}(\xi)$ konstant. Die Konstante ergibt sich aus

$$\widehat{f}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-a|x|^2} dx = \left(\frac{1}{2a}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

Somit erhalten wir die Behauptung für $d = 1$. Der allgemeine Fall folgt nun mit Fubini:

$$\widehat{f}(\xi) = \prod_{j=1}^d \int_{\mathbb{R}} e^{-ax_j^2} e^{-ix_j \xi_j} dx_j = \left(\frac{1}{2a}\right)^{\frac{d}{2}} e^{-\frac{|\xi|^2}{4a}}.$$

□

NOTATION 2.5. Für $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ definieren wir

$$\check{f}(\xi) := \widehat{f}(-\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\langle x, \xi \rangle} f(x) dx.$$

THEOREM 2.6 (Inversionsformel der Fouriertransformation). *Seien $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$. Dann gilt:*

$$(\hat{f})^\sim = \hat{\hat{f}} = f, \quad f. \ddot{u}.$$

BEWEIS. Für $t > 0$, $x \in \mathbb{R}^d$ setze

$$\varphi_{x,t}(z) := e^{i\langle x,z \rangle} e^{-t^2|z|^2}.$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} \hat{\varphi}_{x,t}(\xi) &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\langle x-\xi,z \rangle} e^{-t^2|z|^2} dz = \frac{1}{2^{\frac{d}{2}} t^d} e^{-\frac{|x-\xi|^2}{4t^2}} \\ &= (2\pi)^{\frac{d}{2}} \frac{1}{(4\pi)^{\frac{d}{2}} t^d} e^{-\frac{|x-\xi|^2}{4t^2}} := (2\pi)^{\frac{d}{2}} g_t(x-\xi), \end{aligned}$$

wobei $g(x) = \frac{1}{(4\pi)^{\frac{d}{2}}} e^{-|x|^2/4}$ und $g_t(x) := 1/t^d g(x/t)$. Somit gilt:

$$\begin{aligned} (22) \quad \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_{x,t}(\xi) \hat{f}(\xi) d\xi &= \int_{\mathbb{R}^d} f(\xi) \hat{\varphi}_{x,t}(\xi) d\xi \\ &= (2\pi)^{\frac{d}{2}} \int_{\mathbb{R}^d} f(\xi) g_t(x-\xi) d\xi = (2\pi)^{\frac{d}{2}} (f * g_t)(x). \end{aligned}$$

Man zeigt (vgl. Mollifier)

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|f * g_t - f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} = 0.$$

Desweiteren gilt:

$$(23) \quad \lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_{x,t}(\xi) \hat{f}(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\langle x,\xi \rangle} \hat{f}(\xi) d\xi = (2\pi)^{\frac{d}{2}} (\hat{f})^\sim(x).$$

Aus (22) und (23) folgt $f = (\hat{f})^\sim$. Analog zeigt man $f = \hat{\hat{f}}$. □

KOROLLAR 2.7. *Sei $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ und $\hat{f} = 0$. Dann gilt $f = 0$.*

BEWEIS. Klar. □

THEOREM 2.8 (Plancherel). *Sei $f \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$. Dann ist $\hat{f} \in L^2(\mathbb{R}^d)$ und die Abbildung $\mathcal{F}|_{L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)}$ kann eindeutig zu einem unitärem Isomorphismus \mathcal{F}_2 auf $L^2(\mathbb{R}^d)$ fortgesetzt werden.*

BEWEIS. Sei $X := \{f \in L^1(\mathbb{R}^d) : \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)\}$. Dann ist insbesondere $f \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$, d.h. $X \subset L^2(\mathbb{R}^d)$. Ferner ist X dicht in $L^2(\mathbb{R}^d)$, da $C_c^\infty(\mathbb{R}^d) \subset X$.

Seien $f, g \in X$ und $h := \overline{\hat{g}}$. Dann gilt:

$$\hat{h}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-i\langle x,\xi \rangle} \overline{\hat{g}}(x) dx = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \overline{\int_{\mathbb{R}^d} e^{i\langle x,\xi \rangle} \hat{g}(x) dx} = \overline{g(\xi)},$$

d.h.

$$\int_{\mathbb{R}^d} f\bar{g} = \int_{\mathbb{R}^d} f\hat{h} = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}h = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}\bar{g}.$$

Insbesondere folgt mit $g = f$, dass $\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = \|\hat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$ gilt. Da $\mathcal{F}X = X$ kann $\mathcal{F}|_X$ zu einem unitären Isomorphismus \mathcal{F}_2 fortgesetzt werden.

Es bleibt zu Zeigen, dass

$$(\mathcal{F}_2 f)(\xi) = \hat{f}(\xi), \quad f \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d).$$

Sei $(\varphi_j) \subset C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ mit

$$\begin{aligned} \lim_{j \rightarrow \infty} \|f - \varphi_j\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} &= 0 \\ \lim_{j \rightarrow \infty} \|f - \varphi_j\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} &= 0. \end{aligned}$$

Einerseits gilt $\lim_{j \rightarrow \infty} \|\hat{f} - \hat{\varphi}_j\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)} = 0$, d.h.

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{B(0,R)} |\hat{\varphi}_j(\xi) - \hat{f}(\xi)| \, d\xi = 0, \quad R > 0.$$

Andererseits folgt mit Plancherel

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \|\hat{\varphi}_j - \mathcal{F}_2 f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = \lim_{j \rightarrow \infty} \|\varphi_j - f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = 0,$$

d.h.

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{B(0,R)} |\hat{\varphi}_j(\xi) - \mathcal{F}_2 f(\xi)| \, d\xi = 0, \quad R > 0.$$

Damit folgt $\mathcal{F}_2 f(\xi) = \hat{f}(\xi)$ für alle $f \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$. □

SATZ 2.9 (Hausdorff-Young-Ungleichung). *Sei $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 0$ mit $p \in [1, 2]$. Der Operator \mathcal{F} kann zu einem stetigen Operator $\mathcal{F}_{p,q} : L^p(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^d)$ fortgesetzt werden. Es gilt:*

$$\|\mathcal{F}_{p,q}\|_{\mathcal{L}(L^p(\mathbb{R}^d), L^q(\mathbb{R}^d))} \leq \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n-d}{p} - \frac{d}{2}}}.$$

BEWEIS. Wir wissen bereits, dass $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R}^d)$ und $\mathcal{F}_2 : L^2(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^d)$ stetig sind. Daher folgt die Behauptung aus dem Riesz-Thorin Konvexitätstheorem (man ersetze ∞ durch 2). □

BEMERKUNG 2.10. *Für $p > 2$ und $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ ist \hat{f} i. A. keine Funktion mehr (vgl. Distributionen-Theorie).*

BEWEIS. Ohne Beweis. □

SATZ 2.11. *Sei $k \in \mathbb{N}_0$. Dann gilt:*

(a) Sei $x \mapsto x^\alpha f(x) \in L^2(\mathbb{R}^d)$ für alle $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$ mit $|\alpha| \leq k$. Dann gilt

$$\partial^\alpha \hat{f} = \widehat{(-ix)^\alpha f}.$$

(b) Sei $f \in H^k(\mathbb{R}^d)$. Dann gilt

$$\widehat{\partial^\alpha f}(\xi) = (i\xi)^\alpha \hat{f}(\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^d$$

für alle $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$ mit $|\alpha| \leq k$.

BEWEIS. Nach Satz 2.3 gilt die Behauptung für $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$. Approximiere $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ mit $(\varphi_n) \subset C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ und nutze Plancherel. \square

SATZ 2.12. Die Fouriertransformation ist ein topologischer Isomorphismus von \mathcal{S} nach \mathcal{S} .

BEWEIS. Wegen einfacherer Notation setzen wir zunächst $D^\alpha = (-i)^{|\alpha|} \partial^\alpha$ für $\alpha \in \mathbb{N}^d$. Wir verwenden Satz 2.3 und erhalten für $\varphi \in \mathcal{S}$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^d$

$$\begin{aligned} |\xi^\alpha D^\beta \hat{\varphi}(\xi)| &= |\xi^\alpha (-1)^{|\beta|} \mathcal{F}(x^\beta \varphi)| \\ &= |\mathcal{F}(D^\alpha (-x)^\beta \varphi)| \\ &\leq \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} |D^\alpha (x^\beta \varphi(x))| dx \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} (1 + |x|^2)^{-m} (1 + |x|^2)^m |D^\alpha (x^\beta \varphi(x))| dx. \end{aligned}$$

Wählen wir m so, dass $\int (1 + |x|^2)^{-m} dx = M < \infty$ gilt, so folgt

$$(24) \quad |\xi^\alpha D^\beta \hat{\varphi}(\xi)| \leq \sup_{x \in \mathbb{R}^d} (1 + |x|^2)^m |D^\alpha (x^\beta \varphi(x))| M$$

Da $\varphi \in \mathcal{S}$ gilt, folgt somit auch $\mathcal{F}\varphi \in \mathcal{S}$. \mathcal{F} ist linear und mit (24) folgt auch, dass $\mathcal{F}\varphi_n \rightarrow 0$, falls $\varphi_n \rightarrow 0$, also ist \mathcal{F} stetig.

Mit Theorem 2.6 folgt schließlich die Bijektivität und die Stetigkeit von \mathcal{F}^{-1} , da $\mathcal{F}^{-1}\varphi(x) = \mathcal{F}\varphi(-x)$. \square

Setzt man die Fouriertransformation in natürlicher Weise auf komplexe Variablen fort, so erhalten wir die folgende Verbindung zwischen holomorphen Funktionen und Funktionen mit kompaktem Träger. Wir bemerken hierzu noch, dass eine Funktion $F : \mathbb{C}^d \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph ist, wenn sie in jeder Koordinate holomorph ist.

SATZ 2.13 (Paley-Wiener). Eine ganze holomorphe Funktion $F(\zeta) : \mathbb{C}^d \rightarrow \mathbb{C}$ ist genau dann die Fouriertransformierte einer Funktion $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ mit $\text{supp}(f) \subset B(0, R)$, d.h.

$$F(\zeta) = (2\pi)^{-\frac{d}{2}} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-i\langle \zeta, x \rangle} f(x) dx,$$

wenn es für jedes $N \in \mathbb{N}$ eine Konstante C_N gibt, so dass

$$(25) \quad |F(\zeta)| \leq C_N(1 + |\zeta|)^{-N} e^{R|\operatorname{Im} \zeta|}.$$

BEWEIS. Es sei $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ mit $\operatorname{supp} f \subset B(0, R)$. Dann folgt mit partieller Integration für jedes $\beta \in \mathbb{N}^d$ mit $|\beta| = N$

$$\begin{aligned} |(i\zeta)^\beta F(\zeta)| &= |(2\pi)^{-d/2} \int_{B(0,R)} e^{-i\langle \zeta, x \rangle} \partial^\beta f(x) \, dx| \\ &\leq e^{|\operatorname{Im} \zeta| R} (2\pi)^{-d/2} \int_{B(0,R)} |\partial^\beta f(x)| \, dx \end{aligned}$$

Für die Rückrichtung definieren wir zunächst

$$(26) \quad f(x) = (2\pi)^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\langle \xi, x \rangle} F(\xi) \, d\xi.$$

Die Inversionsformel liefert nun, dass $\hat{f}(\xi) = F(\xi)$ und $f \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ gilt, da aus der Glattheit von F folgt, dass $\check{F} \in L^1(\mathbb{R}^d)$ gilt.

Zur Eingrenzung des Trägers von f differenzieren wir zunächst (26) unterm Integralzeichen. Dies ist durch die Voraussetzung (25) gerechtfertigt. Es folgt somit

$$(27) \quad \partial^\beta f(x) = (2\pi)^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\langle x, \xi \rangle} (i\xi)^\beta F(\xi) \, d\xi$$

Wir setzen nun für ein $\alpha > 0$ $\eta = \alpha \frac{x}{|x|}$ und wenden Cauchys Integralsatz sukzessive auf (26) an und erhalten

$$f(x) = (2\pi)^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\langle x, \xi + i\eta \rangle} F(\xi + i\eta) \, d\xi$$

wobei die Integrale über die Wege in imaginärer Richtung wegen (25) im Grenzfall verschwinden.

Für $N = d+1$ erhalten wir nun wieder mit der Voraussetzung die Abschätzung

$$|f(x)| \leq C e^{R|\eta| - \langle x, \eta \rangle} \int_{\mathbb{R}^d} (1 + |\xi|)^{-d-1} \, d\xi.$$

Da dies für beliebige $\alpha > 0$ gilt, folgt (mit $\alpha \rightarrow \infty$) für $|x| > R$, dass $f(x) = 0$. Also folgt $\operatorname{supp} f \subset B(0, R)$. \square

DEFINITION UND SATZ 2.14. Sei $m \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$. Dann ist $T_m : L^2(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^d)$, $T_m f := \mathcal{F}_2^{-1}(m \mathcal{F}_2 f)$ ein stetiger Operator mit

$$\|T_m\|_{\mathcal{L}(L^2(\mathbb{R}^d))} = \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)}.$$

Die Funktion m heißt Fourier-Multiplikator.

BEWEIS. Plancherel liefert

$$\begin{aligned}\|T_m f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} &= \|\mathcal{F}_2^{-1}(m\mathcal{F}_2 f)\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = \|m\mathcal{F}_2 f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \\ &\leq \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)} \|\mathcal{F}_2 f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \\ &= \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)} \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}, \quad f \in L^2(\mathbb{R}^d),\end{aligned}$$

d.h. $\|T_m\|_{\mathcal{L}(L^2(\mathbb{R}^d))} \leq \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)}$.

Zu $\varepsilon > 0$ wähle $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ mit $0 < |\Omega| \leq 1$ mit $\inf_{x \in \Omega} |m(x)| \geq \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)} - \varepsilon$.
Dann gilt für $\varphi = \chi_\Omega$

$$\begin{aligned}\|T_m(\mathcal{F}_2^{-1}\varphi)\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} &= \|m\mathcal{F}_2\mathcal{F}_2^{-1}\varphi\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = \|m\varphi\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \\ &\geq \left(\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)} - \varepsilon\right) \|\varphi\|_{L^2(\mathbb{R}^d)},\end{aligned}$$

d.h. $\|T_m\|_{\mathcal{L}(L^2(\mathbb{R}^d))} = \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)}$. □

BEMERKUNG 2.15. Man kann zeigen, dass $m \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$ eine notwendige Bedingung ist.

DEFINITION 2.16. Die Fouriertransformation für temperierte Distributionen ist definiert durch $\langle \mathcal{F}f, \varphi \rangle := \langle f, \mathcal{F}\varphi \rangle$, $f \in \mathcal{S}'$, $\varphi \in \mathcal{S}$.

SATZ 2.17. Die Fouriertransformation $\mathcal{F} : \mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}'$ ist stetig. Ist $\psi \in \mathcal{S}$ und ist $T_\psi \in \mathcal{S}'$ die von ψ erzeugte Distribution (via $\langle T_\psi, \varphi \rangle := \int \psi\varphi$), so gilt $\hat{T}_\psi = T_{\hat{\psi}}$.

BEWEIS. $\mathcal{F}T \in \mathcal{S}'$ folgt aus der Stetigkeit von \mathcal{F} auf \mathcal{S} , da für $\varphi_k \rightarrow \varphi$

$$\langle \mathcal{F}T, \varphi_k \rangle = \langle T, \mathcal{F}\varphi_k \rangle \rightarrow \langle T, \mathcal{F}\varphi \rangle = \langle \mathcal{F}T, \varphi \rangle$$

gilt.

Die Stetigkeit von \mathcal{F} auf \mathcal{S}' folgt ähnlich, denn für $T_k \rightarrow T$ in \mathcal{S}' folgt

$$\langle \hat{T}_k, \varphi \rangle = \langle T_k, \hat{\varphi} \rangle \rightarrow \langle T, \hat{\varphi} \rangle = \langle \hat{T}, \varphi \rangle$$

□

SATZ 2.18. Die Fouriertransformation ist ein Isomorphismus auf \mathcal{S}' mit Inverser $\langle \mathcal{F}^{-1}T, \varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}^{-1}\varphi \rangle$.

BEWEIS. Es sei $T \in \mathcal{S}'$ und $\varphi \in \mathcal{S}$. Dann gilt

$$\langle \mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}T, \varphi \rangle = \langle \mathcal{F}^{-1}T, \mathcal{F}^{-1}\varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}\varphi \rangle = \langle T, \varphi \rangle$$

also folgt $\mathcal{F}\mathcal{F}^{-1} = Id_{\mathcal{S}'}$ und analog $\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F} = Id_{\mathcal{S}'}$. □

Singuläre Integraloperatoren

1. Interpolation von Operatoren

Wir werden uns in diesem Abschnitt einen Spezialfall des Interpolationssatzes von Marcinkiewicz beweisen. Für diesen Satz definieren wir zunächst die folgenden Begriffe. Im folgenden sei (M, Σ, μ) ein σ -endlicher Maßraum.

DEFINITION 1.1. *Es sei T eine Abbildung, die messbare Funktionen auf M auf messbare Funktionen auf M schickt. Weiter sei $1 \leq q < \infty$ und $1 \leq p < \infty$. Dann ist T vom schwachen (p, q) -Typ, falls es eine Konstante A gibt, so dass für alle $f \in L^p(M)$ und alle $\lambda > 0$*

$$\mu(\{x : |Tf(x)| > \lambda\}) \leq \left(\frac{A\|f\|_p}{\lambda}\right)^q.$$

Die Abbildung ist vom schwachen (p, ∞) -Typ, falls es eine Konstante A gibt mit

$$\|Tf\|_\infty \leq A\|f\|_p$$

Schließlich sagen wir, dass T vom starken (p, q) -Typ ist, falls für ein A

$$\|Tf\|_q \leq A\|f\|_p$$

gilt.

DEFINITION 1.2. *Es sei T wie in Definition 1.1. Die Abbildung T heißt sublinear, falls*

$$|T(f+g)(x)| \leq |Tf(x)| + |Tg(x)|.$$

Wesentlich für den Beweis des Marcinkiewicz-Satzes ist die folgende Darstellungsformel für die L^p -Norm

LEMMA 1.3. *Es seien $1 \leq p < \infty$ und $f : M \rightarrow \mathbb{K}$ eine messbare Funktion. Dann gilt für alle $f \in L^p(M)$*

$$\|f\|_p^p = p \int_0^\infty \mu(\{x : |f(x)| > \lambda\}) \lambda^{p-1} d\lambda.$$

BEWEIS. Für eine einfache Funktion $\alpha\chi_A$ gilt offensichtlich die Gleichung $\|f\|_p^p = \alpha^p \mu(A)$. Weiter gilt

$$\begin{aligned} p \int_0^\infty \mu(\{x : |f(x)| > \lambda\}) \lambda^{p-1} d\lambda &= p \int_0^\alpha \mu(A) \lambda^{p-1} d\lambda \\ &= \mu(A) [\lambda^p]_0^\alpha \\ &= \alpha^p. \end{aligned}$$

Aufgrund der Linearität des Integrals folgt damit die Aussagen auch für Treppenfunktionen. Für eine beliebige messbare Funktion f wählen wir eine monotone Folge von Treppenfunktionen T_n mit $T_n \rightarrow |f|$ (punktweise). Mit dem Satz von der monotonen Konvergenz folgt dann $\|T_n\|_p \rightarrow \|f\|_p$. Außerdem ist A_n , wobei $A_n(\lambda) := \{x : |T_n(x)| > \lambda\}$ eine wachsende Folge von messbaren Mengen mit $A_n(\lambda) \rightarrow A(\lambda) = \{x : |f(x)| > \lambda\}$, d.h. $\cup A_n = A$. Eine weitere Anwendung des Satzes von Beppo-Levi ergibt

$$p \int_0^\infty \mu(A_n(\lambda)) \lambda^{p-1} d\lambda \rightarrow p \int_0^\infty \mu(A(\lambda)) \lambda^{p-1} d\lambda$$

womit die Behauptung bewiesen ist. \square

Für einen Maßraum M bezeichnen wir im Folgenden mit $\mathcal{M}(M)$ die Menge aller messbaren Funktionen von M nach \mathbb{C} . Weiter definieren wir die Zerlegung einer Funktion $f : M \rightarrow \mathbb{C}$ durch $f = f_\lambda + f^\lambda$ wobei

$$f_\lambda(x) = \begin{cases} f, & \text{falls } |f| \leq \lambda \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

und $f^\lambda = f - f_\lambda$. Nun können wir zum Beweis des Satzes von Marcinkiewicz kommen.

THEOREM 1.4 (Marcinkiewicz Interpolationssatz). *Es seien $1 \leq p_0 < p_1 \leq \infty$ und (M, Σ, μ) bzw. (N, Π, ν) σ -endliche Maßräume. Weiter sei $D(T) \subset \mathcal{M}(M)$ und $T : D(T) \rightarrow \mathcal{M}(N)$ eine sublineare Abbildung. Außerdem sei $D(T)$ abgeschlossen unter Zerlegung, d.h. $f_\lambda \in D(T)$, falls $f \in D(T)$.*

Ist T vom schwachen (p_j, p_j) -Typ für $j = 0, 1$, dann ist T vom starken (p, p) -Typ für jedes $p \in (p_0, p_1)$. Ist $p_1 < \infty$ so gilt

$$\|Tf\|_p \leq 2 \left(\frac{pA_0^{p_0}}{p-p_0} + \frac{p_1A_1^{p_1}}{p_1-p} \right)^{1/p} \|f\|_p.$$

Im Fall $p_1 = \infty$ gilt

$$\|Tf\|_p \leq (1 + A_1) \left(\frac{pA_0^{p_0}}{p-p_0} \right)^{1/p} \|f\|_p.$$

BEWEIS. Wir betrachten zuerst den Fall $p_1 < \infty$. Für $f \in D(T)$ sei $f_\lambda + f^\lambda = f$ die Zerlegung zu $\lambda > 0$. Aus der Sublinearität von T folgt $\{x : |Tf(x)| > 2\lambda\} \subset \{x : |Tf_\lambda(x)| + |Tf^\lambda(x)| > 2\lambda\} \subset \{x : |Tf_\lambda(x)| > \lambda\} \cup$

$\{x : |Tf^\lambda(x)| > \lambda\}$, da für ein x aus der linken Menge $|Tf_\lambda(x)| > \lambda$ oder $|Tf^\lambda(x)| > \lambda$ gilt. Da T vom schwachen (p_j, p_j) -Typ ist gilt weiter

$$\begin{aligned} \nu(\{x : |Tf(x)| > 2\lambda\}) &\leq \nu(\{x : |Tf^\lambda(x)| > \lambda\}) + \nu(\{x : |Tf_\lambda(x)| > \lambda\}) \\ &\leq \left(\frac{A_0 \|f^\lambda\|_{p_0}}{\lambda}\right)^{p_0} + \left(\frac{A_1 \|f_\lambda\|_{p_1}}{\lambda}\right)^{p_1}. \end{aligned}$$

Mit Hilfe von Lemma 1.3 und der Substitution $2z \rightarrow \lambda$ folgt

$$\begin{aligned} 2^{-p} \|Tf\|_p^p &= 2^{-p} p \int_0^\infty \nu(\{x : |Tf(x)| > z\}) z^{p-1} dz \\ &= p \int_0^\infty \nu(\{x : |Tf(x)| > 2\lambda\}) \lambda^{p-1} d\lambda \\ &\leq p \int_0^\infty (A_0 \|f^\lambda\|_{p_0})^{p_0} \lambda^{-p_0+p-1} d\lambda + p \int_0^\infty (A_1 \|f_\lambda\|_{p_1})^{p_1} \lambda^{-p_1+p-1} d\lambda \\ &= A_0^{p_0} p p_0 \int_0^\infty \int_0^\infty \mu(\{x : |f^\lambda(x)| > \tau\}) \tau^{p_0-1} d\tau \lambda^{p-p_0-1} d\lambda \\ &\quad + A_1^{p_1} p p_1 \int_0^\infty \int_0^\lambda \mu(\{x : |f_\lambda(x)| > \tau\}) \tau^{p_1-1} d\tau \lambda^{p-p_1-1} d\lambda, \end{aligned}$$

da $|f_\lambda| < \lambda$ gilt. Zur weiteren Abschätzung betrachten wir zunächst den zweiten Term der rechten Seite. Mit

$$\mu(\{x : |f_\lambda(x)| > \tau\}) \leq \mu(\{x : |f(x)| > \tau\})$$

und dem Satz von Tonelli folgt

$$\begin{aligned} &p p_1 \int_0^\infty \int_0^\lambda \mu(\{x : |f_\lambda(x)| > \tau\}) \tau^{p_1-1} d\tau \lambda^{p-p_1-1} d\lambda \\ &= p p_1 \int_0^\infty \mu(\{x : |f(x)| > \tau\}) \int_\tau^\infty \lambda^{p-p_1-1} d\lambda \tau^{p_1-1} d\tau \\ &\leq \frac{p p_1}{(p_1 - p)} \int_0^\infty \mu(\{x : |f(x)| > \tau\}) \tau^{p-1} d\tau \\ &= \frac{p_1}{p_1 - p} \|f\|_p^p. \end{aligned}$$

Für die Abschätzung des ersten Terms von oben bemerken wir zunächst, dass

$$\begin{aligned}\mu\left(\left\{x : |f^\lambda(x)| > \tau\right\}\right) &= \mu\left(\{x : |f(x)| > \tau\}\right), \quad \text{falls } \tau > \lambda \text{ und} \\ \mu\left(\left\{x : |f^\lambda(x)| > \tau\right\}\right) &= \mu\left(\{x : |f(x)| > \lambda\}\right), \quad \text{falls } \tau \leq \lambda.\end{aligned}$$

Daher folgt

$$\begin{aligned}& pp_0 \int_0^\infty \int_0^\infty \mu\left(\left\{x : |f^\lambda(x)| > \tau\right\}\right) \tau^{p_0-1} d\tau \lambda^{p-p_0-1} d\lambda \\ &= pp_0 \int_0^\infty \int_\lambda^\infty \mu\left(\{x : |f(x)| > \tau\}\right) \tau^{p_0-1} d\tau \lambda^{p-p_0-1} d\lambda \\ &\quad + p \int_0^\infty \mu\left(\{x : |f(x)| > \lambda\}\right) \lambda^{p-1} d\lambda \\ &= \left(\frac{p_0}{p-p_0} + 1\right) \|f\|_p^p.\end{aligned}$$

Insgesamt folgt also

$$\|Tf\|_p^p \leq 2^p \left(\frac{pA_0^{p_0}}{p-p_0} + \frac{p_1A_1^{p_1}}{p_1-p}\right) \|f\|_p^p.$$

Für den Fall $p_1 = \infty$ bemerken wir zunächst, dass falls $|Tf(x)| > (1 + A_1)\lambda$ auch die Ungleichung

$$(1 + A_1)\lambda < |Tf_\lambda(x)| + |Tf^\lambda(x)| \leq A_1\lambda + |Tf^\lambda(x)|$$

gilt, da T vom schwachen (∞, ∞) -Typ ist. Damit folgt dann $|Tf^\lambda(x)| > \lambda$. Das heißt, es gilt die Beziehung

$$\{x : |Tf(x)| > (1 + A_1)\lambda\} \subset \{x : |Tf^\lambda(x)| > \lambda\}.$$

Wir können nun wie folgt abschätzen

$$\begin{aligned}
(1 + A_1)^{-p} \|Tf\|_p^p &= (1 + A_1)^{-p} p \int_0^\infty \nu(\{x : |Tf(x)| > \lambda\}) \lambda^{p-1} d\lambda \\
&= p \int_0^\infty \nu(\{x : |Tf(x)| > (1 + A_1)\lambda\}) \lambda^{p-1} d\lambda \\
&\leq p \int_0^\infty \nu(\{x : |Tf^\lambda(x)| > \lambda\}) \lambda^{p-1} d\lambda \\
&= p \int_0^\infty \left(\frac{A_0 \|f^\lambda\|_{p_0}}{\lambda}\right)^{p_0} \lambda^{p-1} d\lambda \\
&= p A_0^{p_0} p_0 \int_0^\infty p \int_0^\infty \mu(\{x : |f^\lambda(x)| > \tau\}) \tau^{p_0-1} d\tau \lambda^{p-p_0-1} d\lambda \\
&\leq \frac{A_0^{p_0}}{p-p_0} \|f^\lambda\|_p^p \leq \frac{A_0^{p_0}}{p-p_0} \|f\|_p^p
\end{aligned}$$

□

2. Calderón-Zygmund-Theorie

Wir wollen nun Abbildungen $T : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ betrachten, die sich über einen Integralkern definieren lassen. Eine Funktion $K : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ heißt Integralkern von T , falls K auf $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \setminus \{(x, y) : x = y\}$ lokal integrierbar ist (d.h. integrierbar auf kompakten Teilmengen) und für $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ mit $\text{supp } f \cap \text{supp } g = \emptyset$ die Gleichung

$$Tf(g) = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} K(x, y) f(y) g(x) dx dy$$

gilt.

DEFINITION 2.1. (a) Ein Integralkern K heißt Calderón-Zygmund-Kern, falls K stetig differenzierbar in $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \setminus \{(x, y) : x = y\}$ ist und

$$(i) |K(x, y)| \leq \frac{C}{|x-y|^n}$$

$$(ii) |\nabla_x K(x, y)| + |\nabla_y K(x, y)| \leq \frac{C}{|x-y|^{n+1}}$$

gilt.

(b) Es sei T ein Operator mit Calderón-Zygmund-Kern. Ist T stetig auf $L^2(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^d)$ fortsetzbar, so heißt T Calderón-Zygmund-Operator.

Das Ziel dieses Abschnitts ist es zu beweisen, dass sich Calderón-Zygmund-Operatoren beschränkt auf $L^p(\mathbb{R}^d)$ für $1 < p < \infty$ fortsetzen lassen. Dies ist eines der zentralen Themen der Harmonischen Analysis. Wir werden

später sehen, dass sich mit Hilfe dieser Theorie Existenzresultate für partielle Differentialgleichungen von L^2 nach L^p für $p \neq 2$ übertragen lassen. Das Hauptresultat dieses Abschnitts lautet also

THEOREM 2.2. *Es sei T ein Calderón-Zygmund-Operator. Dann gibt es für $p \in (1, \infty)$ eine Konstante $C > 0$, so dass $\|Tf\|_p \leq C\|f\|_p$ für alle $f \in L^p(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$.*

Wir werden den Beweis führen indem wir mit Hilfe einer Zerlegung für integrierbare Funktionen zeigen, dass Calderón-Zygmund-Operatoren vom schwachen $(1, 1)$ -Typ sind und anschließend den Interpolationssatz von Marcinkiewicz anwenden.

Wir kommen also nun zur angesprochenen Zerlegung und legen zunächst ein paar Bezeichnungen fest, die uns das (Notations-)Leben etwas erleichtern.

NOTATION 2.3. *Wir beginnen mit der Menge aller achsenparalleler Würfel mit Seitenlänge 1 und ganzzahligen Ecken. Diese Menge nennen wir \mathcal{D}_0 . Für eine ganze Zahl k entsteht die Menge \mathcal{D}_k von Würfeln indem wir die Skalierung $x \rightarrow 2^k x$ auf jedes Element in \mathcal{D}_0 anwenden. Das heißt, die Würfel in \mathcal{D}_k haben Seitenlänge 2^k und entstehen, wenn man die Seiten der Würfel in \mathcal{D}_{k-1} halbiert. Eine wichtige Eigenschaft der Menge aller so entstehenden Würfel $\mathcal{D} = \cup_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{D}_k$, die dyadischen Würfel, ist die folgende: Für zwei Würfel W und W' gilt entweder, dass einer im anderen enthalten ist oder, dass sie disjunktes Inneres haben.*

LEMMA 2.4 (Calderón-Zygmund-Zerlegung). *Es seien $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ und $\lambda > 0$. Dann gibt es eine Familie von dyadischen Würfeln W_k mit paarweise disjunktem Inneren, so dass $|f(x)| \leq \lambda$ f.ü. in $\mathbb{R}^d \setminus \cup_{k \in \mathbb{Z}} W_k$ und*

$$\lambda < \frac{1}{|W_k|} \int_{W_k} |f(x)| \, dx \leq 2^d \lambda.$$

Insbesondere lässt sich f zerlegen in $f = g + b$, wobei $|g(x)| \leq 2^d \lambda$ f.ü., $\|g\|_1 \leq \|f\|_1$ und $b = \sum_{k \in \mathbb{Z}} b_k$. Für die Funktionen b_k gilt weiter $\text{supp } b_k \subset W_k$, $\int_{\mathbb{R}^d} b_k = 0$ und $\|b_k\|_1 \leq 2 \int_{W_k} |f(x)| \, dx$.

BEWEIS. Es sei \mathcal{E} die Menge aller dyadischen Würfel $W \in \mathcal{D}$, die die Bedingung

$$(28) \quad \frac{1}{|W|} \int_W |f(x)| \, dx > \lambda$$

erfüllen. Da $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, folgt, dass ein Würfel W mit $\|f\|_1 \leq \lambda|W|$ nicht in \mathcal{E} enthalten ist. Die Seitenlängen der Würfel in \mathcal{E} ist also beschränkt. Damit gibt es zu jedem Würfel $W' \in \mathcal{E}$ einen größten Würfel $W \in \mathcal{E}$, der W' enthält. Die Menge aller dieser maximalen Würfel nennen wir $\mathcal{W} := \{W_k\}$. Ist W'_k ein größerer dyadischer Würfel, der W_k enthält, dann ist W'_k nicht

in \mathcal{E} und daher kann für diesen Würfel die Ungleichung (28) nicht gelten. Damit folgt

$$(29) \quad \int_{W_k} |f(x)| \, dx \leq \int_{W'_k} |f(x)| \, dx \leq |W'_k| \lambda = 2^d |W_k| \lambda.$$

Die geforderten Bedingungen für die Familie von Würfeln gilt also. Die Funktionen b_k werden definiert durch $b_k := f - |W_k|^{-1} \int_{W_k} f(x) \, dx$ auf W_k und 0 sonst. Mit $b = \sum_k b_k$ setzen wir $g = f - b$. Die Eigenschaft $\int b_k = 0$ folgt unmittelbar aus der Definition. Die Dreiecksungleichung liefert weiter

$$\int_{\mathbb{R}^d} |b_k(x)| \, dx \leq 2 \int_{W_k} |f(x)| \, dx$$

Weiter gilt $\|g\|_1 \leq \|f\|_1$, da in W_k $g = |W_k|^{-1} \int_{W_k} f(x) \, dx$.

Es bleibt noch $|g(x)| \leq 2^d \lambda$ zu zeigen. Auf jedem Würfel W_k folgt diese Ungleichung mit (29). Für $x \in (\cup_k W_k)^c$ gibt es eine Folge von dyadischen Würfeln, so dass die Seitenlängen gegen Null konvergieren, x enthalten und die Ungleichung (28) nicht gilt. Da $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ und damit fast alle Punkte Lebesgue-Punkte von g sind, folgt daher $|g(x)| \leq \lambda$ fast überall. \square

LEMMA 2.5. *Es sei K ein Calderón-Zygmund-Kern und $r > 0$. Dann gibt es eine Konstante $C > 0$, so dass für alle $x, y \in \mathbb{R}^d$ mit $|x - y| \leq r$ die Ungleichung*

$$\int_{\mathbb{R}^d \setminus B_{2r}(x)} |K(z, x) - K(z, y)| \, dz \leq C.$$

BEWEIS. Mit dem Mittelwertsatz und den Eigenschaften von Calderón-Zygmund-Kernen folgt für $y \in B_r(x)$ und $z \in \mathbb{R}^d \setminus B_{2r}(x)$, dass

$$(30) \quad \begin{aligned} |K(z, x) - K(z, y)| &\leq |x - y| \sup_{w \in B_r(x)} |\nabla_w K(z, w)| \\ &\leq 2^{n+1} C_K |x - y| |x - z|^{-n-1}. \end{aligned}$$

Hier benutzen wir außerdem die Dreiecksungleichung für $|w - z| \geq |x - z| - |w - x| \geq |x - z|/2$, wobei die letzte Ungleichung für $|x - y| \leq r$ und $|x - z| \geq 2r$ gültig ist. Schließlich folgt die Behauptung durch Integration von (30), denn mit Kugelkoordinaten folgt

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d \setminus B_{2r}(x)} |K(z, x) - K(z, y)| \, dz &\leq C_K 2^{n+1} \omega_{n-1} \int_{2r}^{\infty} r^{-n-1} r^{n-1} \, dr \\ &= C_K 2^n \omega_{n-1}. \end{aligned}$$

\square

Nun können wir Theorem 2.2 beweisen.

BEWEIS. Wir zeigen zunächst die schwache (1, 1) Abschätzung für Calderón-Zygmund-Kerne. Hierzu werden wir gelegentlich die Ungleichung

$$(31) \quad \|f\|_p^p \geq \int_{\{f(x) > \varepsilon\}} |f(x)|^p dx \geq \varepsilon^p |\{f > \varepsilon\}|$$

benutzen. Es sei nun $f \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$ und $\lambda > 0$. Die Calderón-Zygmund-Zerlegung auf f angewendet liefert Funktionen b und g mit $f = g + b$ und den in Lemma 2.4 genannten Eigenschaften. Es gilt offensichtlich

$$\{x : |Tf(x)| > \lambda\} \subset \{x : |Tg(x)| > \lambda/2\} \cup \{x : |Tb(x)| > \lambda/2\}.$$

Mit der L^2 Beschränktheit folgt damit

$$\begin{aligned} |\{x : |Tg(x)| > \lambda/2\}| &\leq \frac{C}{\lambda^2} \int_{\mathbb{R}^d} |Tg(x)|^2 dx \\ &\leq \frac{C}{\lambda^2} \int_{\mathbb{R}^d} |g(x)|^2 dx \\ &\leq \frac{C}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^d} |g(x)| dx, \end{aligned}$$

da $|g(x)| \leq C\lambda$ gilt. Schließlich folgt wegen $\|g\|_1 \leq \|f\|_1$

$$|\{x : |Tg(x)| > \lambda/2\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_1.$$

Wir können uns also nun der Abschätzung von Tb zuwenden.

Es sei $O_\lambda = \cup_k B_k$, wobei B_k Kugeln um die Mittelpunkte x_k der Würfel W_k mit Radius \sqrt{n} · Seitenlänge von W_k . Das heißt aber, dass für $y \in W_k$ der Abstand $|x_k - y|$ zu x_k höchstens die Hälfte des Radius von B_k beträgt. Dies benötigen wir für die Anwendung von Lemma 2.5. Für das Volumen von O_λ gilt.

$$|O_\lambda| \leq C \sum_k |Q_k| \leq \frac{1}{\lambda} \sum_k \int_{Q_k} |f| dx \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_1.$$

Als nächstes schätzen wir Tb_k ab. Für $x \notin Q_k$ gilt, da die b_k Mittelwert 0 haben, dass $Tb_k(x) = \int K(x, y)b_k(y) dy = \int (K(x, y) - K(x, x_k))b_k(y) dy$. Anwendung des Satzes von Fubini und Lemma 2.5 liefert

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d \setminus B_k} |Tb_k(x)| dx &\leq \int_{Q_k} |b_k(y)| \int_{\mathbb{R}^d \setminus B_k} |K(x, y) - K(x, x_k)| dx dy \\ &\leq C \int_{Q_k} |b_k(y)| dy \leq C \int_{Q_k} |f(y)| dy \end{aligned}$$

Summation über k ergibt schließlich

$$(32) \quad \int_{\mathbb{R}^d \setminus O_\lambda} |Tb(y)| \, dy \leq \sum_k \int_{\mathbb{R}^d \setminus B_k} |Tb_k(y)| \, dy \leq C \|f\|_1.$$

Damit folgt also unter Verwendung von (31) und (32)

$$\begin{aligned} |\{x : Tb(x) > \frac{\lambda}{2}\}| &\leq |O_\lambda| + |\{x \in \mathbb{R}^d \setminus O_\lambda : |Tb(x)| > \frac{\lambda}{2}\}| \\ &\leq |O_\lambda| + \frac{2}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^d \setminus O_\lambda} |Tb(x)| \, dx \\ &\leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_1 \end{aligned}$$

Insgesamt ist damit die schwach $(1, 1)$ Bedingung für Tf erfüllt.

Die L^p -Beschränktheit von T für $1 < p < 2$ folgt nun mit der L^2 -Beschränktheit und dem Interpolationssatz von Marcinkiewicz.

Für $2 < p < \infty$ folgt die Aussage durch Dualisieren, indem man erkennt, dass die Adjungierte von T also T^* ein Calderón-Zygmund-Operator ist, falls T ein solcher ist. T^* ist daher nach dem ersten Teil $L^{p'}$ -Beschränkt, wobei p' der zu p konjugierte Hölder-Exponent ist. Damit ist dann T L^p -Beschränkt. \square

3. Fouriermultiplikationsoperatoren

In der Theorie partieller Differentialgleichungen ist es oftmals nützlich für die Lösbarkeit die zu untersuchenden Operatoren als Calderón-Zygmund-Operatoren zu erkennen und so geeignete Abschätzungen zu erhalten. Insbesondere L^p -Abschätzungen für die Lösung zu linearen Problemen kann dazu dienen nichtlineare Gleichungen zu behandeln.

Häufig erhält man aber durch Anwenden der Fouriertransformation nur explizite Lösungsformeln in Form von sogenannten Symbolen. Wendet man etwa die Fouriertransformation auf die Gleichung $(\lambda - \Delta)u = f$ an so erhält man $(\lambda + |\xi|^2)\hat{u} = \hat{f}$. Eine Lösung dieser Gleichung wäre also formal durch $u = \mathcal{F}^{-1}(\lambda + |\xi|^2)^{-1} \mathcal{F}f$ gegeben. In dieser Formel ist nicht so schnell ersichtlich, ob dies ein Calderón-Zygmund-Operator ist oder nicht. Deshalb wollen wir im Folgenden Operatoren obiger Form untersuchen und als Hauptziel eine hinreichende Bedingung angeben, die die L^p -Beschränktheit des Operators sichert.

DEFINITION 3.1. *Eine Funktion $m : \mathbb{R}^d \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{K}$ heißt Symbol der Ordnung k , falls m beliebig oft differenzierbar ist und für jedes $\alpha \in \mathbb{N}^d$ eine Konstante C_α existiert, so dass*

$$(33) \quad \left| \frac{\partial^\alpha m}{\partial \xi^\alpha}(\xi) \right| \leq C_\alpha |\xi|^{-|\alpha| - k}.$$

Wir geben zunächst ein paar nützliche Rechenregeln für Symbole an.

- LEMMA 3.2. (a) Ist m_j für $j = 1, 2$ ein Symbol der Ordnung k_j , dann ist $m_1 m_2$ ein Symbol der Ordnung $k_1 + k_2$ und $m_1 + m_2$ ein Symbol der Ordnung k . Jede der Konstanten in der Abschätzung (33) für $m_1 m_2$ (bzw. $m_1 + m_2$) hängt nur von endlich vielen der Konstanten für m_1 und m_2 ab.
- (b) Ist $\eta \in \mathcal{S}$, dann ist η ein Symbol der Ordnung k für jedes $k \leq 0$.
- (c) Ist m ein Symbol der Ordnung k , dann ist $\varepsilon^{-k} m(\varepsilon \xi)$ ein Symbol der Ordnung k und die Konstanten in (33) können unabhängig von ε gewählt werden.

Den Beweis überlassen wir dem Leser.

LEMMA 3.3. Es sei $m \in \mathcal{S}$ und $k > -d$. Dann gibt es eine Konstante C , die nur von endlich vielen der Konstanten für m in (33) abhängt mit

$$|\mathcal{F}^{-1}m(x)| \leq C|x|^{-d-k}.$$

BEWEIS. Wir wählen eine Abschneidefunktion $\eta_0 \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ mit kompaktem Träger, so dass $\eta_0(\xi) = 1$ für $|\xi| < 1$ und $\eta_0(\xi) = 0$ für $|\xi| > 2$ gilt. Wir setzen $\eta_\infty = 1 - \eta_0$. Damit definieren wir

$$K_j(x) = (2\pi)^{-d} \int e^{ix\xi} \eta_j(\xi|x|) m(\xi) d\xi,$$

wobei $j = 0, \infty$. Wir schätzen K_j jeweils getrennt ab. Für K_0 gilt

$$|K_0(x)| \leq C(2\pi)^{-d} \int_{|\xi| < 2/|x|} |\xi|^k d\xi = C|x|^{-k-d}$$

Für den $j = \infty$ Teil schreiben wir zunächst $(ix)^\alpha e^{ix\xi} = \frac{\partial^\alpha}{\partial \xi^\alpha} e^{ix\xi}$ und integrieren partiell. Dies ergibt

$$\begin{aligned} (ix)^\alpha K_\infty(x) &= \int \left(\frac{\partial^\alpha}{\partial \xi^\alpha} e^{ix\xi} \right) \eta_\infty(\xi|x|) m(\xi) d\xi \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int e^{ix\xi} \frac{\partial^\alpha}{\partial \xi^\alpha} (\eta_\infty(\xi|x|) m(\xi)) d\xi. \end{aligned}$$

Mit (33), Lemma 3.2 und da η_∞ Null in der Nähe von 0 ist, folgt für $k - |\alpha| > -d$

$$|(ix)^\alpha K_\infty(x)| \leq C \int_{|\xi| > 1/|x|} |\xi|^{k-|\alpha|} d\xi = C|x|^{-d-k+|\alpha|}.$$

Damit folgt die Ungleichung $|K(x)| \leq C|x|^{-d-k}$ □

Damit können wir nun das zentrale Resultat dieses Abschnitts beweisen.

THEOREM 3.4. Ist m ein Symbol der Ordnung 0, dann ist $T_m = \mathcal{F}^{-1}m\mathcal{F}$ ein Calderón-Zygmund-Operator.

BEWEIS. Die L^2 -Beschränktheit des Operators T_m folgt aus $m \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$ nach Definition und Satz 2.14. Wir zeigen nun noch, dass der Kern von T_m von der Form $K(x - y)$ ist und K Abschätzungen der Form

$$(34) \quad \left| \frac{\partial^\alpha}{\partial x^\alpha} K(x) \right| \leq C|x|^{-n-|\alpha|}$$

erfüllt. Da die inverse Fouriertransformation von m nicht notwendigerweise durch eine Funktion gegeben ist, approximieren wir m zunächst durch schnell fallende Funktionen. Hierzu nehmen wir $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ mit $\varphi(x) = 1$ für $|x| < 1$ und $\varphi(x) = 0$ für $|x| > 2$. Wir setzen dann $m_\varepsilon(\xi) = \varphi(\varepsilon\xi)(1 - \varphi(\xi/\varepsilon))m(\xi)$. Wegen Lemma 3.2 ist m_ε ein Symbol der Ordnung 0 mit von ε unabhängigen Konstanten. Außerdem gilt $m_\varepsilon \in \mathcal{S}$ und damit gelten wegen Lemma 3.3 die Abschätzungen (34) für $K_\varepsilon := \mathcal{F}^{-1}m_\varepsilon$. Dies folgt aus den Eigenschaften der Fouriertransformation, da die α -te Ableitung von K_ε die inverse Fouriertransformation von $(-i\xi)^\alpha m_\varepsilon(\xi)$ ist und $(-i\xi)^\alpha m_\varepsilon(\xi)$ ein Symbol der Ordnung $|\alpha|$ ist.

Da die Konstanten nicht von ε abhängen, können wir den Satz von Arzela-Ascoli zusammen mit einem Diagonalfolgenargument anwenden. Arzela-Ascoli liefert für eine Kugel um 0 und ein $\alpha \in \mathbb{N}^d$ eine Folge α -ter Ableitungen von K_ε , die auf der abgeschlossenen Kugelschale $\overline{B(0, r)} \setminus B(0, 1/r)$, für $r > 1$ gleichmäßig konvergiert. Nun lässt sich mit Hilfe des Diagonalfolgenarguments eine Teilfolge von K_ε konstruieren, so dass für eine Funktion K die Teilfolge $K_{\varepsilon_j} \rightarrow K$ und alle ihre Ableitungen gleichmäßig gegen K , bzw. die entsprechende Ableitung von K konvergiert. Der Kern K erfüllt dann natürlich auch die Abschätzungen (34).

Es bleibt also noch zu zeigen, dass T_m durch den Kern K dargestellt werden kann. Es sei $f \in \mathcal{S}$. Mit dem Satz von Lebesgue und dem Satz von Plancherel folgt $T_{m_\varepsilon} f \rightarrow T_m f$ in $L^2(\mathbb{R}^d)$ für $\varepsilon \rightarrow 0$. Nach Definition von K_ε und den Eigenschaften der Fouriertransformation, Satz 2.3 gilt $T_{m_\varepsilon} f = K_\varepsilon * f$. Haben f und g disjunkten und jeweils kompakten Träger, so gilt

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} T_m f(x) g(x) \, dx &= \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} T_{m_{\varepsilon_j}} f(x) g(x) \, dx && (L^2 - \text{Konv.}) \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} K_{\varepsilon_j}(x - y) f(y) g(x) \, dy \, dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} K(x - y) f(y) g(x) \, dy \, dx && (\text{glm. Konv.}) \end{aligned}$$

und damit folgt, dass T_m durch den Kern K dargestellt werden kann. \square

Ein Dichteschluss zusammen mit Theorem 2.2 und Theorem 3.4 liefert nun abschließend

KOROLLAR 3.5. *Ist m ein Symbol der Ordnung 0, dann ist $T_m : L^p(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^d)$ für $1 < p < \infty$ ein stetiger Operator.*

Als erste Anwendung des Multiplikatorenatzes wollen wir uns nun mit Besselpotentialräumen und ihrem Zusammenhang zu den Sobolevräumen beschäftigen. Die Besselpotentialräume liefern eine Möglichkeit gebrochene Ableitungen zu definieren und so eine kontinuierliche Skala verschiedener Glattheit zu erhalten.

DEFINITION 3.6. Für $s \geq 0$ und $1 < p < \infty$ heißt

$$H^{s,p}(\mathbb{R}^d) := \{f \in L^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{F}^{-1}(1 + |\xi|^2)^{s/2} \mathcal{F}f \in L^p(\mathbb{R}^d)\}$$

der Besselpotentialraum der Ordnung s . Eine Norm auf $H^{s,p}(\mathbb{R}^d)$ wird durch $\|f\|_{H^{s,p}} = \|\mathcal{F}^{-1}(1 + |\xi|^2)^{s/2} \mathcal{F}f\|_p$ definiert.

LEMMA 3.7. $H^{s,p}(\mathbb{R}^d)$ ist ein Banachraum.

BEWEIS. Übung □

Dass die Besselpotentialräume wirklich eine Skala bzgl. der Glattheit liefert zeigt der folgende Satz.

SATZ 3.8. Ist $s \in \mathbb{N}$, dann gilt $W^{s,p}(\mathbb{R}^d) = H^{s,p}(\mathbb{R}^d)$.

BEWEIS. Wir zeigen die Aussage nur für gerade s . Für ungerade ist der Beweis schwieriger und technisch aufwändiger. Ist s gerade, so ist $(1 + |\xi|^2)^{s/2} = P_s(\xi)$ ein Polynom vom Grad s . Da für $f \in W^{s,p}(\mathbb{R}^d)$ auch $\partial^\alpha f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ für alle $|\alpha| \leq s$ gilt, folgt mit der Eigenschaft der Fouriertransformation, dass $P(-i\partial)f = \mathcal{F}^{-1}P_s(\xi)\mathcal{F}f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ und somit $W^{s,p}(\mathbb{R}^d) \subset H^{s,p}(\mathbb{R}^d)$.

Umgekehrt ist $\frac{\xi^\alpha}{(1+|\xi|^2)^{s/2}}$ ein Mihklin Symbol für jedes $|\alpha| \leq s$ und daher folgt $\|\mathcal{F}^{-1}\xi^\alpha \mathcal{F}f\|_p = \|\mathcal{F}^{-1}\frac{\xi^\alpha}{(1+|\xi|^2)^{s/2}}(1 + |\xi|^2)^{s/2} \mathcal{F}f\|_p \leq \|\mathcal{F}^{-1}(1 + |\xi|^2)^{s/2} \mathcal{F}f\|_p = \|f\|_{H^{s,p}}$. □

Auf Gebieten lassen sich analog zu den Sobolevräumen auch Besselpotentialräume definieren.

DEFINITION 3.9. Für $s \geq 0$ und $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ definieren wir

$$H^{s,p}(\Omega) = \{f|_\Omega : f \in H^{s,p}(\mathbb{R}^d)\}.$$

L^p -Theorie Elliptischer Randwertprobleme

Wir wollen im Folgenden elliptische Differentialoperatoren der Form

$$(35) \quad Au(x) = \sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \partial_i \partial_j u(x) + \sum_i b_i(x) u(x) + c(x)$$

auf Gebieten in \mathbb{R}^d betrachten. Ein Differentialoperator A heißt elliptisch, falls $a_{ij}(x) \in \mathbb{R}$ für jedes $x \in \mathbb{R}^d$ und es eine Konstante $\delta > 0$ gibt, so dass

$$- \sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \xi_j \xi_j \geq \delta |\xi|^2$$

für alle $x, \xi \in \mathbb{R}^d$ gilt. In den Beweisen werden wir uns im Wesentlichen auf den technisch einfachsten Fall $(a_{ij}) = (\delta_{ij})$, also $A = \Delta$, beschränken. Wir werden für beschränkte Gebiete Ω ein Lokalisierungsargument anwenden. Daher behandeln wir zunächst den Fall $\Omega = \mathbb{R}^d$ und $\Omega = \mathbb{R}_+^d := \{(x', x_d) \in \mathbb{R}^d : x_d > 0, x' \in \mathbb{R}^{d-1}\}$.

1. Lösungstheorie in \mathbb{R}^d

Wir assoziieren zu einem Differentialoperator A von der Form (35) einen stetigen Operator durch $D(A_p) = W^{2,p}(\mathbb{R}^d)$, $A_p u := Au$. Der nächste Satz zeigt, dass die Wahl des Definitionsbereichs günstig ist, denn $A_p : W^{2,p}(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^d)$ ist Surjektiv.

SATZ 1.1. *Es sei A ein elliptischer Differentialoperator mit konstanten Koeffizienten a_{ij} und $b_i = 0, c = 0$. Weiter sei $\lambda \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re} \lambda > 0$ und $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$. Dann existiert eine eindeutige Lösung $u \in W^{2,p}(\mathbb{R}^d)$ der Gleichung*

$$(36) \quad (\lambda - A)u = f \text{ in } \mathbb{R}^d.$$

Desweiteren gilt für $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$ mit $|\alpha| \leq 2$.

$$(37) \quad \|D^\alpha u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leq \frac{C}{|\lambda|^{1-|\alpha|/2}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}.$$

BEWEIS. Wir führen den Beweis für den Fall $A = \Delta$. Anwenden der Fouriertransformation auf (36) liefert $(\lambda + |\xi|^2)\hat{u} = \hat{f}$ und somit ist $u =$

$\mathcal{F}^{-1}(\lambda + |\xi|^2)^{-1}\mathcal{F}f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ eine Lösung, falls $m_\lambda(\xi) := (\lambda + |\xi|^2)^{-1}$ ein Symbol der Ordnung 0 ist. Zunächst bemerken wir

$$|\lambda + \xi^2| = \sqrt{|\operatorname{Re} \lambda + \xi|^2 + |\operatorname{Im} \lambda|^2} \geq \sqrt{|\operatorname{Re} \lambda|^2 + |\operatorname{Im} \lambda|^2} = |\lambda|, \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

und damit

$$\left| \frac{\xi^\alpha}{\lambda + \xi^2} \right| \leq \frac{\sqrt{|\lambda|}^{|\alpha|}}{|\lambda|} = \frac{1}{|\lambda|^{1-\frac{|\alpha|}{2}}}, \quad |\xi| \leq \sqrt{|\lambda|},$$

$$\left| \frac{\xi^\alpha}{\lambda + \xi^2} \right| \leq \frac{|\xi|^{|\alpha|}}{|\xi|^2} = \frac{1}{|\xi|^{2-|\alpha|}} \leq \frac{1}{|\lambda|^{1-\frac{|\alpha|}{2}}}, \quad |\xi| \geq \sqrt{|\lambda|}.$$

Um zu zeigen, dass m_λ ein Symbol der Ordnung 0 ist, bemerken wir noch, dass sich $\xi^\beta D^\beta m_\lambda(\xi)$ als endliche Summe mit Summanden der Form

$$\xi^{\beta_1} (D^{\beta_1} |\xi|^2) m_\lambda \cdots \xi^{\beta_n} (D^{\beta_n} |\xi|^2) m_\lambda$$

mit $\beta = \sum_{i=1}^n \beta_i$ schreiben lässt. (Induktion)

Damit folgt mit obigen Abschätzungen, dass m_λ , $\xi_i m_\lambda$ und $\xi_i \xi_j m_\lambda$ Symbole der Ordnung 0 sind. Nach Korollar 3.5 genügt T_{m_λ} damit den Abschätzungen

$$\|D^\alpha T_{m_\lambda}\|_{\mathcal{L}(L^p(\mathbb{R}^d))} \leq \frac{1}{|\lambda|^{1-|\alpha|/2}}.$$

Die Eindeutigkeit der Lösung folgt mit der Injektivität der Fouriertransformation. \square

Für die Lokalisierung benötigen wir noch die Lösbarkeit, falls $a_{ij}, b_i, c \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$. Es sei $A = \sum_{i,j=1}^d \alpha_{ij} \partial_{ij}$ ein elliptischer Differentialoperator mit konstanten Koeffizienten α_{ij} . Wir definieren

$$Bu(x) = \sum_{i,j=1}^d (a_{ij}(x) - \alpha_{ij}) \partial_{ij} u(x) + \sum_{i=1}^d b_i(x) \partial_i u(x) + c(x)u(x).$$

Wir assoziieren hierzu wieder den Operator $B_p u = Bu$ mit $D(B_p) = W^{2,p}(\mathbb{R}^d)$. Dann gilt

THEOREM 1.2. *Es seien A und B wie oben gegeben. Dann gibt es Konstanten $\varepsilon, \lambda_0, C$, so dass für λ mit $\operatorname{Re} \lambda > 0$ und $|\lambda| > \lambda_0$ die Gleichung*

$$(38) \quad (\lambda - A_p - B_p)u = f \text{ in } \mathbb{R}^d$$

für jedes $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ eine eindeutig bestimmte Lösung $u \in W^{2,p}(\mathbb{R}^d)$ besitzt, falls $\|a_{ij} - \alpha_{ij}\|_\infty \leq \varepsilon$ gilt. Desweiteren gilt für u die Abschätzung (37).

BEWEIS. Es ist klar, dass $(\lambda - A_p - B_p) : W^{2,p}(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^d)$ stetig ist. Wir zeigen, dass $(\lambda - A_p - B_p)^{-1} : L^p(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^d)$ existiert und stetig ist. Dazu schreiben wir zunächst für $u \in W^{2,p}(\mathbb{R}^d)$

$$(\lambda - A_p - B_p)u = (Id - B_p(\lambda - A_p)^{-1})(\lambda - A_p)u.$$

Also existiert $(\lambda - A_p - B_p)^{-1} \in \mathcal{L}(L^p(\mathbb{R}^d))$, falls $\|B_p(\lambda - A_p)^{-1}\|_{\mathcal{L}(L^p(\mathbb{R}^d))} < 1$ gilt. In diesem Fall erhält man $(\lambda - A_p - B_p)^{-1} = (\lambda - A_p)^{-1}(Id - B_p(\lambda - A_p)^{-1})^{-1}$, wobei der zweite Operator wegen der Neumann Reihe existiert und stetig ist. Die geforderte Abschätzung $\|B_p(\lambda - A_p)^{-1}\|_{\mathcal{L}(L^p(\mathbb{R}^d))} < 1$ folgt mit Hilfe von (37) für ε klein genug und λ groß genug, denn

$$\begin{aligned} \|B_p(\lambda - A_p)^{-1}f\|_p &\leq \sum_{i,j=1}^d \|(a_{ij}(x) - \alpha_{ij})\partial_{ij}(\lambda - A_p)^{-1}f\|_p \\ &\quad + \left\| \sum_{i=1}^d b_i \partial_i (\lambda - A_p)^{-1} f \right\|_p + \|c(\lambda - A_p)^{-1}f\|_p \\ &\leq d^2 \varepsilon \|\partial_{ij}(\lambda - A_p)^{-1}f\|_p + d \max_{i=1,\dots,d} \|b_i\|_\infty \|\partial_i(\lambda - A_p)^{-1}f\|_p \\ &\quad + \|c\|_\infty \|(\lambda - A_p)^{-1}f\|_p \\ &\leq C\varepsilon \|f\|_p + C \frac{1}{\sqrt{|\lambda|}} \|f\|_p + C \frac{1}{|\lambda|} \|f\|_p. \end{aligned}$$

Die Abschätzung (37) folgt schließlich mit (37) für A_p und der Darstellung $(\lambda - A_p - B_p)^{-1} = (\lambda - A_p)^{-1}(Id - B_p(\lambda - A_p)^{-1})^{-1}$. \square

2. Lösungstheorie in \mathbb{R}_+^d

Da für $\Omega = \mathbb{R}_+^d$ der Rand $\partial\Omega = \{x \in \mathbb{R}^d : x_d = 0\} \neq \emptyset$ gilt, müssen wir noch Bedingungen für u auf $\partial\Omega$ fordern, um die eindeutige Lösbarkeit der Gleichung $(\lambda - A)u = f$ zu sichern. Wir werden zwei verschiedene Randbedingungen untersuchen.

- Dirichlet-Randbedingung: $u|_{\partial\Omega} = 0$
- Neumann-Randbedingung: $\partial_n u|_{\partial\Omega} = 0$

Hierbei bezeichnet ∂_n die Richtungsableitung in Richtung der äußeren Normalen an $\partial\Omega$.

Es sei nun zunächst A ein elliptischer Differentialoperator mit konstanten Koeffizienten. Zur Lösung der Gleichung $(\lambda - A)u = f$ mit Dirichlet oder Neumann Randbedingungen wollen wir das zuvor gezeigte Ergebnis in \mathbb{R}^d mit Hilfe von Reflexion an der Hyperebene $\{x_d = 0\}$ zeigen. Hierzu bemerken wir zunächst, dass $(\lambda - A)^{-1}$ durch einen Calderón-Zygmund-Kern K_λ gegeben ist, da das zugehörige Symbol $(\lambda - a(\xi))^{-1}$ ein Symbol der Ordnung 0 ist. Das heißt $(\lambda - A)^{-1}f = K_\lambda * f$ und diese Darstellung liefert unmittelbar, dass $u = (\lambda - A)^{-1}f \in C^\infty$ gilt, falls $f \in C^\infty$.

Es sei nun $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}_+^d)$. Wir definieren

$$f_D(x', x_d) = \begin{cases} -f(x', -x_d) & \text{für } x_d < 0, \\ f(x', x_d) & \text{für } x_d > 0. \end{cases}$$

Damit ist f_D ungerade in der letzten Variable. Nun definieren wir $u_D \in C^\infty(\mathbb{R}^d) \cap L^p(\mathbb{R}^d)$ als Lösung von $(\lambda - A)u = f_D$ in \mathbb{R}^d . Damit ist u_D

ebenfalls ungerade, denn es gilt

$$\begin{aligned} (\lambda - A)(u_D(\cdot, \cdot)|_{x=(x', x_d)}) &= ((\lambda - A)u_D)(x', -x_d) \\ &= f_D(x', -x_d) \\ &= -f_D(x', x_d) \\ &= (\lambda - A)(-u_D)(x', x_d). \end{aligned}$$

Also löst sowohl $u_D(\cdot, \cdot)$ als auch $-u_D$ die Gleichung $(\lambda - A)u = -f_D$. Die Funktionen $u_D(\cdot, \cdot)$ und $-u_D$ müssen damit übereinstimmen. Da $u_D \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ gilt folgt insbesondere $u_D(x', 0) = 0$ für alle $x' \in \mathbb{R}^{d-1}$. Die Funktion u_D genügt daher der Dirichlet Randbedingung und $u_D|_{\mathbb{R}_+^d}$ löst

$$\begin{aligned} (\lambda - A)u &= f && \text{in } \mathbb{R}_+^d \\ u &= 0 && \text{auf } \partial\mathbb{R}_+^d \end{aligned}$$

Insbesondere folgen die Normabschätzungen (37) da

$$\|D^\alpha u_D\|_{L^p(\mathbb{R}_+^d)} \leq \|D^\alpha u_D\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leq \frac{C}{|\lambda|^{1-|\alpha|/2}} \|f_D\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leq \frac{C}{|\lambda|^{1-|\alpha|/2}} 2 \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^d)}.$$

Da $C_c^\infty(\mathbb{R}_+^d)$ dicht in $L^p(\mathbb{R}_+^d)$ liegt, lässt sich $(\lambda - A)^{-1}$ auf ganz $L^p(\mathbb{R}_+^d)$ eindeutig fortsetzen.

Für Neumann-Randbedingungen setzt man f gerade nach \mathbb{R}^d fort und erhält analoge Abschätzungen. Außerdem erhält man durch exakt gleiche Argumentation des Beweises von Theorem 1.2 auch die Aussagen dieses Satzes für \mathbb{R}_+^d statt \mathbb{R}^d und wir haben das folgende Theorem entsprechend zu Theorem 1.2 gezeigt.

THEOREM 2.1. *Es seien A und B wie im letzten Abschnitt gegeben. Dann gibt es Konstanten $\varepsilon, \lambda_0, C$, so dass für λ mit $\operatorname{Re} \lambda > 0$ und $|\lambda| > \lambda_0$ die Gleichung*

$$(39) \quad \begin{aligned} (\lambda - A - B)u &= f \text{ in } \mathbb{R}_+^d \\ Ru &= 0 \text{ auf } \partial\mathbb{R}_+^d, \end{aligned}$$

wobei $R = \operatorname{Id}$ (Dirichlet-RB) oder $R = \partial_n$ (Neumann-RB), für jedes $f \in L^p(\mathbb{R}_+^d)$ eine eindeutig bestimmte Lösung $u \in W^{2,p}(\mathbb{R}_+^d)$ besitzt, falls $\|a_{ij} - \alpha_{ij}\|_\infty \leq \varepsilon$ gilt. Desweiteren gilt für u die Abschätzung

$$(40) \quad \|D^\alpha u\|_{L^p(\mathbb{R}_+^d)} \leq \frac{C}{|\lambda|^{1-|\alpha|/2}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^d)}.$$

BEMERKUNG 2.2. *Mit Hilfe dieses Theorems lässt sich ein der Differentialgleichung $(\lambda - A)u = f$ zugeordneter Operator wie folgt definieren*

- (a) *Für Dirichlet-Randbedingungen: $D(A_D) = W^{2,p}(\mathbb{R}_+^d) \cap W_0^{1,p}(\mathbb{R}_+^d)$ mit $A_D u = Au$.*
- (b) *Für Neumann-Randbedingungen: $D(A_N) = \{u \in W^{2,p}(\mathbb{R}_+^d) : \partial_d u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}_+^d)\}$*

3. Lösungstheorie in beschränkten Gebieten

Wir betrachten nun die Gleichung

$$(41) \quad \begin{aligned} (\lambda - A)u &= f \text{ in } \Omega \\ Ru &= 0 \text{ auf } \partial\Omega \end{aligned}$$

wobei A wieder ein elliptischer Differentialoperator und $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ein beschränktes Gebiet von der Klasse C^2 ist. Das Hauptresultat für beschränkte Gebiete ist

THEOREM 3.1. *Es seien A und B wie im letzten Abschnitt gegeben. Dann gibt es Konstanten $\varepsilon, \lambda_0, C$, so dass für λ mit $\operatorname{Re} \lambda > 0$ und $|\lambda| > \lambda_0$ die Gleichung (41), wobei wie vorher $R = \operatorname{Id}$ (Dirichlet-RB) oder $R = \partial_n$ (Neumann-RB), für jedes $f \in L^p(\Omega)$ eine eindeutig bestimmte Lösung $u \in W^{2,p}(\Omega)$ besitzt, falls $\|a_{ij} - \alpha_{ij}\|_\infty \leq \varepsilon$ gilt. Desweiteren erfüllt u die Abschätzung*

$$(42) \quad \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)} \leq \frac{C}{|\lambda|^{1-|\alpha|/2}} \|f\|_{L^p(\Omega)}.$$

BEMERKUNG 3.2. *Analog zum Fall $\Omega = \mathbb{R}_+^d$ können wir die folgenden Differentialoperatoren definieren*

- (a) *Für Dirichlet-Randbedingungen: $D(A_D) = W^{2,p}(\mathbb{R}_+^d) \cap W_0^{1,p}(\mathbb{R}_+^d)$ mit $A_D u = Au$.*
- (b) *Für Neumann-Randbedingungen: $D(A_N) = \{u \in W^{2,p}(\mathbb{R}_+^d) : \nabla u|_{\partial\Omega} \cdot n = 0 \text{ im Spursinne}\}$.*

Bevor wir das Theorem beweisen, wollen wir noch ein einfaches Korollar formulieren.

KOROLLAR 3.3. *Die Operatoren $(\lambda - A_D)^{-1}, (\lambda - A_N)^{-1} : L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$ sind kompakt, für alle λ für die sie existieren.*

BEWEIS. Ist $\operatorname{Re} \lambda > 0$ und $|\lambda| > \lambda_0$ so ist nach Obigem und nach dem Satz von Rellich $Id_w : W^{2,p}(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$ ein kompakter Operator und $(\lambda - A_D)^{-1}$ bzw. $(\lambda - A_N)^{-1}$ stetig von $L^p(\Omega)$ nach $W^{2,p}(\Omega)$. Also ist $(\lambda - A_D)^{-1} = Id_w(\lambda - A_D)^{-1} : L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$ kompakt. Für die übrigen λ für die die Resolvente existiert verende die Resolventenidentität aus der Funktionalanalysis. \square

BEWEIS. (von Theorem 3.1, Beweisskizze) Es sei $\{U_j, j = 1, \dots, n\}$ eine endliche Überdeckung von $\partial\Omega$, wobei für die Mengen U_j $\operatorname{diam} U_j \leq \varepsilon$ gilt. Gemäß Definition 5.2 aus Kapitel 2 gibt es zugehörige Abbildungen $\phi_j : Q \rightarrow U_j$. Aus der stetigen Differenzierbarkeit der ϕ_j folgt, dass sich die Jakobi-Matrix nur um $\delta(\varepsilon)$ von Id unterscheidet und $\delta(\varepsilon) \rightarrow 0$ für $\varepsilon \rightarrow 0$ gilt.

Weiter wählen wir aus der offenen Überdeckung $\{B(x, \varepsilon_x) : x \in \Omega \setminus \bigcup_j U_j, \varepsilon_x < \operatorname{dist}(x, \partial\Omega)\}$ von $\overline{\Omega \setminus \bigcup_j U_j}$ endlich viele aus, etwa $\{O_j : j = n+1, \dots, N\}$.

Wir definieren nun lokale Operatoren. Sei hierzu φ_j eine quadratische Zerlegung der Eins (d.h. $\sum_j \varphi_j^2 = 1$) zu $\{U_j\} \cup \{O_j\}$. Damit setzen wir:

(a) Fall $j \leq n$: Wir definieren u_j als Lösung von

$$(\lambda - A_j)u_j = \varphi_j f =: f_j \quad \text{in } \mathbb{R}^d.$$

(b) Fall $n < j \leq N$: Wir definieren $u_j = \tilde{u}_j \circ \phi_j^{-1}$, wobei \tilde{u}_j eine Lösung von

$$\begin{aligned} (\lambda - \tilde{A}_j)\tilde{u}_j &= (\varphi_j \circ \phi_j)(f \circ \phi_j) && \text{in } \mathbb{R}_+^d \\ R\tilde{u}_j &= 0 && \text{auf } \partial\mathbb{R}_+^d \end{aligned}$$

Hierbei müssen wir die Koeffizienten von \tilde{A}_j so wählen, dass $A_j u_j = (\tilde{A}_j \tilde{u}_j) \circ \phi_j = f_j = \varphi_j f$ gilt. Das bedeutet (wir vernachlässigen hier den Index j)

$$\begin{aligned} Au &= A(\tilde{u} \circ \phi^{-1}) \\ &= \sum_{i,l=1}^d a_{il} \partial_i \partial_l (\tilde{u} \circ \phi^{-1}) \\ &= \sum_{i,l=1}^d a_{il} \partial_i \left(\sum_{k=1}^d \tilde{u} \cdot \partial_l (\phi^{-1})_k \right) \\ &= \sum_{i,l=1}^d a_{il} \left(\sum_{k,m=1}^d \partial_m \partial_k \tilde{u} \cdot \partial_i (\phi^{-1})_m \cdot \partial_l (\phi^{-1})_k + \partial_k \tilde{u} \cdot \partial_i \partial_l (\phi^{-1})_k \right) \\ &=: \tilde{A}\tilde{u}. \end{aligned}$$

Da für ε klein jede der Funktionen ϕ_j bis auf Rotation fast die identische Abbildung ist, ergibt sich, dass der Differentialoperator \tilde{A} eine kleine Störung eines elliptischen Operators ist (da $\partial_i \phi_m^{-1} \sim \delta_{im}$). Klein meint hier im Sinne von Theorem 2.1. Daher ist \tilde{u}_j wohldefiniert.

Damit definieren wir den ersten Kandidaten für die Lösung auf dem beschränkten Gebiet durch $v(f) := \sum_{j=1}^N \varphi_j u_j$, dann gilt

$$\begin{aligned} (\lambda - A)v &= \lambda v - \sum_{j=1}^N \varphi_j A u_j + A(\varphi_j v) - \varphi_j A u_j \\ &= \sum_{j=1}^N \lambda u_j - \varphi_j A u_j - [A, \varphi_j] u_j \\ &= \sum_{j=1}^N \varphi_j f_j - B(\lambda - A_j)^{-1} f_j \\ &=: f - T_\lambda f \end{aligned}$$

Aus der Produktregel folgt, dass der Operator $[A, \varphi_j]$ nur Ableitungen erster Ordnung in v und als Koeffizienten erste und zweite Ableitungen von φ enthält. Daher ist der Operator $T_\lambda : L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$ stetig mit der Abschätzung

$$\|T_\lambda f\|_p \leq \frac{C}{\sqrt{|\lambda|}} \|f\|_p.$$

Für λ groß genug existiert also $(Id - T_\lambda)^{-1}$ und wir erhalten schließlich eine Lösung der Gleichung durch $u = v((Id - T_\lambda)^{-1} f)$. Die Normabschätzungen für u folgen aus der Beschränktheit von $(Id - T_\lambda)^{-1}$ und der Konstruktion von v . \square

4. Ausblick: Eine weitere Anwendung der Fouriertransformation

Wir betrachten die Wärmeleitungsgleichung in \mathbb{R}^d

$$(43) \quad \begin{aligned} u_t - \Delta u &= 0 && \text{in } (0, \infty) \times \mathbb{R}^d \\ u(0) &= u_0, \end{aligned}$$

mit einer Anfangstemperaturverteilung $u_0 \in \mathcal{S}$. Wir suchen also eine Funktion $u : (0, \infty) \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$, die diese Gleichung im Distributionensinne erfüllt. Anwenden der Fouriertransformation ergibt

$$\begin{aligned} \hat{u}_t + |\xi|^2 \hat{u} &= 0 && \text{in } (0, \infty) \times \mathbb{R}^d \\ \hat{u}(0, \xi) &= \hat{u}_0(\xi) && \text{in } \mathbb{R}^d. \end{aligned}$$

Also ist für festes $\xi \in \mathbb{R}^d$ die Lösung $\hat{u}(t, \xi)$ gegeben durch die Lösung dieser gewöhnlichen DGL., nämlich

$$\hat{u}(t, \xi) = e^{-t|\xi|^2} \hat{u}_0(\xi).$$

Anwenden von \mathcal{F}^{-1} und Beispiel 2.4 aus Kapitel 4 liefert, da $\mathcal{F}^{-1} f(x) = \mathcal{F} f(-x)$

$$\begin{aligned} u(t, x) &= \mathcal{F}^{-1} \left(e^{-t|\xi|^2} \hat{u}_0 \right) \\ &= \left(\mathcal{F}^{-1} e^{-t|\xi|^2} \right) * u_0 \\ &= \left(\mathcal{F} e^{-t|\xi|^2} \right) * u_0 \\ &= \left(\frac{1}{2t} \right)^{d/2} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} * u_0 \\ &=: G_t * u_0. \end{aligned}$$

Die Funktion G_t wird auch Gauss-Kern genannt. Es gilt $\|G_t\|_1 = 1$ und daher folgt mit der Ungleichung von Young für die Faltung, dass der durch $u(t) = G_t * u_0$ definierte Operator stetig auf $L^p(\mathbb{R}^d)$ für alle $t > 0$ ist. Desweiteren ist G_t analytisch in dem Parameter t . Da auch $\partial_t^k G_t \in L^1(\mathbb{R}^d)$ für $k \in \mathbb{N}$, folgt, dass damit $u(t, x) = G_t * u_0(x)$ sogar analytisch in t für $t > 0$ ist.

Evolutionsgleichungen – Das abstrakte Cauchy-Problem

Im verbleibenden Teil der Vorlesung wollen wir uns mit linearen, parabolischen Evolutionsgleichungen beschäftigen, d.h. mit lineare partiellen Differentialgleichungen, die eine Zeit- und Ortsvariablen enthalten, in denen ein Mal nach der Zeit differenziert wird und die Ortsableitungen durch einen elliptischen Differentialoperator beschrieben werden können. Die Modellgleichung in diesem Zusammenhang ist die *Wärmeleitungsgleichung*, die in ihrer einfachsten Form so aussieht:

$$\begin{aligned}\partial_t u(t, x) &= \Delta u(t, x), & t > 0, & x \in \mathbb{R}^d, \\ u(0, x) &= u_0(x), & x &\in \mathbb{R}^d,\end{aligned}$$

mit einer gegebenen Anfangsbedingung u_0 .

Unser Ansatz zur Lösung solcher Gleichungen besteht darin, die Gleichung als gewöhnliche Differentialgleichung in einem Banachraum aufzufassen. Bezeichnet in obigem Beispiel Δ_2 den Laplace-Operator auf $L^2(\mathbb{R}^d)$, so können wir obige Gleichung umschreiben zu

$$\begin{aligned}u'(t) &= \Delta_2 u(t), & t > 0, \\ u(0) &= u_0,\end{aligned}$$

wobei das Gleichheitszeichen nun im Sinne von „gleich in L^2 “ zu verstehen ist. Wir haben nun ein leichteres Problem, nämlich eine gewöhnliche Differentialgleichung, in einem komplizierteren Gebilde, nämlich dem Banachraum L^2 , zu betrachten. Ein solches Problem in der abstrakten Form

$$\begin{aligned}u'(t) &= Au(t), & t > 0, \\ u(0) &= u_0,\end{aligned}$$

wobei A ein linearer Operator in einem Banachraum X und $u : [0, \infty) \rightarrow X$ ist, nennt man *abstraktes Cauchy-Problem*.

Rein formal handelt es sich nun um eine gewöhnliche Differentialgleichung, deren Lösung naiv aus der Sicht der Analysis III betrachtet $u = e^{tA}u_0$ sein sollte, auch wenn im Moment natürlich $e^{t\Delta_2}$ keinen Sinn ergibt. So naiv der Ansatz auch scheint, er trägt sehr, sehr weit...

1. Stark-stetige Operatorhalbgruppen

Wir nähern uns behutsam einer Antwort auf die Frage was e^{tA} für einen unbeschränkten Operator A auf einem Banachraum X sein soll. In den folgenden Abschnitten entwickeln wir diese Theorie im abstrakten Rahmen. Dabei müssen wir häufig Funktionen $u : [a, b] \rightarrow X$ integrieren, wozu wir eine Vorbemerkung machen.

1.1. Das Vektor-wertige Riemann-Integral. Sei X ein Banachraum, $-\infty < a < b < \infty$ und $f \in C([a, b]; X)$. Ist $\pi = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ mit $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ eine Zerlegung von $[a, b]$ mit Feinheitmaß $|\pi| = \max_{j=1}^n (t_j - t_{j-1})$, sowie $\tau_j \in [t_{j-1}, t_j]$, $j = 1, \dots, n$, Zwischenstellen, so konvergieren die Riemann-Summen

$$\sum_{j=1}^n f(\tau_j)(t_j - t_{j-1})$$

für $|\pi| \rightarrow 0$ gegen das X -wertige Riemann-Integral

$$\int_a^b f(t) dt.$$

Das funktioniert genauso wie in der Analysis I, wobei man natürlich alle Beträge im Bildbereich durch die Norm in X ersetzen muss. Ebenfalls wie in Analysis I definieren wir uneigentliche Integrale wie

$$\int_a^\infty f(t) dt := \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(t) dt,$$

falls dieser Grenzwert existiert und verwenden munter andere Eigenschaften des Integrals wie Linearität, die Dreiecksungleichung, partielle Integration und den Hauptsatz.

Neu hinzu kommen die folgenden Eigenschaften.

LEMMA 1.2. Sei X ein Banachraum und $u \in C([a, b]; X)$. Dann gilt

$$(a) \quad B \in \mathcal{L}(X) \implies B \int_a^b u(t) dt = \int_a^b Bu(t) dt.$$

(b) Ist $A : X \supseteq D(A) \rightarrow X$ abgeschlossen und $u \in C([a, b]; D(A))$ (d.h. $u \in C([a, b]; X)$, $Au(t) \in D(A)$ für alle $t \in [a, b]$ und $Au \in C([a, b]; X)$), so ist $\int_a^b u(t) dt \in D(A)$ und es gilt $A \int_a^b u(t) dt =$

$$\int_a^b Au(t) dt.$$

BEWEIS. Übung. □

DEFINITION 1.3. Sei X ein Banachraum, $-\infty < a < b < \infty$ und $T : [a, b] \rightarrow \mathcal{L}(X)$. Dann heißt

- (a) T normstetig $\iff T$ stetig, d.h. $\|T(t) - T(t_0)\|_{\mathcal{L}(X)} \rightarrow 0$ ($t \rightarrow t_0$).
 (b) T stark-stetig $\iff \|T(t)x - T(t_0)x\|_X \rightarrow 0$ ($t \rightarrow t_0$) für alle $x \in X$.

BEMERKUNG 1.4. (a) T normstetig $\implies T$ stark-stetig.
 (b) Ist T stark-stetig, so definieren wir

$$\int_a^b T(s) ds \in \mathcal{L}(X) \quad \text{mit} \quad \left(\int_a^b T(s) ds \right) x := \int_a^b T(s)x ds.$$

DEFINITION 1.5 (Laplace-Transformation).

- (a) Eine Funktion $u \in C([0, \infty); X)$ heißt exponentiell beschränkt, falls Konstanten $M \geq 0$ und $\omega \in \mathbb{R}$ existieren mit $\|u(t)\|_X \leq Me^{\omega t}$ für alle $t \geq 0$.
 (b) Ist u exponentiell beschränkt, so existiert für alle $\lambda \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(\lambda) > \omega$ das uneigentliche Integral $\int_0^\infty e^{-\lambda t} u(t) dt$ und die Funktion

$$\hat{u} : \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(\lambda) > \omega\} \rightarrow X \quad \text{mit} \quad \hat{u}(\lambda) := \int_0^\infty e^{-\lambda t} u(t) dt$$

heißt Laplace-Transformierte von u .

Die folgende fundamentale Eigenschaft der Laplace-Transformation wollen wir hier nur zitieren.

SATZ 1.6 (Eindeutigkeit der Laplace-Transformation). Sei $u \in C([0, \infty); X)$ und $t \mapsto \int_0^t u(s) ds$, $t > 0$, exponentiell beschränkt mit Konstanten M und ω . Existiert dann ein $\omega' > \omega$, so dass $\hat{u}(\lambda) = 0$ für alle $\lambda > \omega'$ gilt, so ist $u \equiv 0$.

Was hat das alles nun mit unserem abstrakten Cauchy-Problem zu tun? Wir formulieren dieses zunächst einmal exakt:

1.7. Abstraktes Cauchy-Problem (ACP). Sei X ein Banachraum und $(A, D(A))$ ein abgeschlossener, linearer Operator in X . Zu gegebenem $u_0 \in X$ finde ein $u \in C^1((0, \infty); X) \cap C([0, \infty); X) \cap C((0, \infty); D(A))$ mit

$$\begin{cases} u'(t) &= Au(t), & t > 0, \\ u(0) &= u_0. \end{cases}$$

Sei nun u eine exponentiell beschränkte Lösung von (ACP). Dann gilt dank Lemma 1.2 (b) für die Laplace-Transformierte $\hat{u} \in D(A)$ und

$$\begin{aligned} A\hat{u}(\lambda) &= A \int_0^\infty e^{-\lambda t} u(t) dt = \int_0^\infty e^{-\lambda t} Au(t) dt = \int_0^\infty e^{-\lambda t} u'(t) dt \\ &= e^{-\lambda t} u(t) \Big|_0^\infty + \int_0^\infty \lambda e^{-\lambda t} u(t) dt = -u_0 + \lambda \hat{u}(\lambda) \end{aligned}$$

für alle $\operatorname{Re}(\lambda) > \omega$, wobei ω die Konstante aus der exponentiellen Beschränktheit von u ist.

Damit gilt $(\lambda - A)\hat{u}(\lambda) = u_0$, d.h. im Falle, dass $\lambda \in \rho(A)$ gilt, haben wir

$$\hat{u}(\lambda) = R(\lambda, A)u_0.$$

Ist die Resolventenmenge von A also „ausreichend groß“, so können wir hoffen, dass wir Lösungen von (ACP) bekommen, wenn wir die Resolvente von A in irgendeiner Weise Laplace-rücktransformieren können. Das ist unser nächstes Ziel.

NOTATION 1.8. *Es sei $T : [0, \infty) \rightarrow \mathcal{L}(X)$ stark-stetig und exponentiell beschränkt mit Konstanten M und ω . Dann definieren wir $\hat{T}(\lambda) \in \mathcal{L}(X)$ für $\operatorname{Re}(\lambda) > \omega$ durch*

$$\hat{T}(\lambda)x := \int_0^\infty e^{-\lambda t} T(t)x dt = \widehat{(T(\cdot)x)}(\lambda), \quad x \in X.$$

DEFINITION 1.9. *Sei $\omega \in \mathbb{R}$. Eine Familie $\{R(\lambda) : \lambda > \omega\} \subseteq \mathcal{L}(X)$ heißt Pseudoresolvente, falls für alle $\lambda, \mu > \omega$ die Resolventengleichung*

$$R(\lambda) - R(\mu) = (\mu - \lambda)R(\mu)R(\lambda)$$

gilt.

SATZ 1.10. *Es sei $\{R(\lambda) : \lambda > \omega\}$ eine Pseudoresolvente. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent.*

- (a) *Es existiert ein abgeschlossener linearer Operator A in X mit $(\omega, \infty) \subseteq \rho(A)$ und $R(\lambda) = R(\lambda, A)$ für alle $\lambda > \omega$.*
- (b) *$R(\lambda)$ ist injektiv für ein $\lambda > \omega$.*
- (c) *$R(\lambda)$ ist injektiv für alle $\lambda > \omega$.*

BEWEIS. Ist $R(\lambda) = R(\lambda, A)$ für alle $\lambda > \omega$, so ist $R(\lambda)$ natürlich für all diese λ auch injektiv. Somit folgt (c) sofort aus (a), genauso wie (b) direkt aus (c) folgt. Wir beweisen also „(b) \Rightarrow (a)“.

Es sei $\lambda_0 > \omega$ und $R(\lambda_0)$ injektiv. Für alle $x \in R(\lambda_0)(X)$ setzen wir dann $A := \lambda_0 - R(\lambda_0)^{-1}$, was dank der Injektivität von $R(\lambda_0)$ möglich ist. Dann ist A offensichtlich linear mit $D(A) = R(\lambda_0)(X)$. Außerdem gilt dann $(\lambda_0 - A)R(\lambda_0) = \operatorname{id}_X$ und $R(\lambda_0)(\lambda_0 - A) = \operatorname{id}_{D(A)}$.

Sei nun $\lambda > \omega$ beliebig. Dann gilt mit zweimaliger Anwendung der Resolventengleichung

$$\begin{aligned} (\lambda - A)R(\lambda) &= (\lambda - A)[R(\lambda_0) + R(\lambda) - R(\lambda_0)] \\ &= (\lambda - A)[R(\lambda_0) + (\lambda_0 - \lambda)R(\lambda_0)R(\lambda)] \\ &= [(\lambda - \lambda_0) + (\lambda_0 - A)]R(\lambda_0)[I + (\lambda_0 - \lambda)R(\lambda)] \\ &= (\lambda - \lambda_0)R(\lambda_0)[I + (\lambda_0 - \lambda)R(\lambda)] + I + (\lambda_0 - \lambda)R(\lambda) \\ &= I + (\lambda_0 - \lambda)[R(\lambda) - R(\lambda_0) - (\lambda_0 - \lambda)R(\lambda_0)R(\lambda)] = I. \end{aligned}$$

Genauso zeigt man $R(\lambda)(\lambda - A) = I$ auf $D(A)$. Schließlich ist damit $\varrho(A) \neq \emptyset$ und damit A in jedem Fall abgeschlossen. \square

Mit diesem Kriterium, wann eine Pseudoresolvente tatsächlich Resolvente eines Operators ist, können wir nun zeigen, welche Operatorfamilien die Urbilder der Resolventen unter der Laplace-Transformation sind.

THEOREM 1.11. *Sei $T : [0, \infty) \rightarrow \mathcal{L}(X)$ stark-stetig und exponentiell beschränkt mit Konstanten M und ω . Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent.*

- (a) *Es existiert ein abgeschlossener linearer Operator $(A, D(A))$ mit $(\omega, \infty) \subseteq \varrho(A)$ und $\hat{T}(\lambda) = R(\lambda, A)$ für alle $\lambda > \omega$.*
- (b) *$T(0) = I$ und $T(t + s) = T(t)T(s)$ für alle $s, t \geq 0$.*

Damit sind die Abbildungen $T : [0, \infty) \rightarrow \mathcal{L}(X)$, die im obigen Theorem die Bedingung (b) erfüllen, die Kandidaten für die Laplace-Rücktransformation der Resolvente. In der Einführung zu diesem Kapitel hatten wir gesehen, dass diese Lösungen unserer abstrakten Cauchyprobleme moralisch von der Form $e^{tA}u_0$ sein müssten. Tatsächlich finden wir nun Abbildungen, die die Funktionalgleichung der Exponentialfunktion $e^0 = 1$ und $e^{t+s} = e^t e^s$ erfüllen. Wir geben diesen Abbildungen T zunächst ihren Namen.

DEFINITION 1.12. *Eine Abbildung $T : [0, \infty) \rightarrow \mathcal{L}(X)$ heißt C_0 -Halbgruppe, falls*

- *T stark-stetig,*
- *$T(0) = I$*
- *$T(t + s) = T(t)T(s)$ für alle $s, t \geq 0$ (Halbgruppen-Eigenschaft).*

BEWEIS VON THEOREM 1.11. Es sei $\mu > \lambda > \omega$. Dann gilt für alle $x \in X$

$$\begin{aligned} \frac{\hat{T}(\lambda)x - \hat{T}(\mu)x}{\mu - \lambda} &= \frac{1}{\lambda - \mu} e^{(\lambda - \mu)t} \Big|_0^\infty \hat{T}(\lambda)x - \frac{1}{\mu - \lambda} \int_0^\infty e^{-\mu t} T(t)x \, dt \\ &= \int_0^\infty e^{(\lambda - \mu)t} \hat{T}(\lambda)x \, dt - \frac{1}{\mu - \lambda} \int_0^\infty e^{(\lambda - \mu)t} e^{-\lambda t} T(t)x \, dt. \end{aligned}$$

Integrieren wir nun im zweiten Integral partiell, so erhalten wir

$$\begin{aligned}
&= \int_0^\infty e^{(\lambda-\mu)t} \int_0^\infty e^{-\lambda r} T(r)x \, dr \, dt - \frac{1}{\mu-\lambda} \int_0^t e^{-\lambda r} T(r)x \, dr \, e^{(\lambda-\mu)t} \Big|_{t=0}^\infty \\
&\quad + \frac{1}{\mu-\lambda} \int_0^\infty (\lambda-\mu)e^{(\lambda-\mu)t} \int_0^t e^{-\lambda r} T(r)x \, dr \, dt \\
&= \int_0^\infty e^{(\lambda-\mu)t} \int_0^\infty e^{-\lambda r} T(r)x \, dr \, dt - \int_0^\infty e^{(\lambda-\mu)t} \int_0^t e^{-\lambda r} T(r)x \, dr \, dt \\
&= \int_0^\infty e^{(\lambda-\mu)t} \int_t^\infty e^{-\lambda r} T(r)x \, dr \, dt.
\end{aligned}$$

Mit der Substitution $r = s + t$ liefert das

$$\begin{aligned}
\frac{\hat{T}(\lambda)x - \hat{T}(\mu)x}{\mu-\lambda} &= \int_0^\infty e^{(\lambda-\mu)t} \int_0^\infty e^{-\lambda(t+s)} T(t+s)x \, ds \, dt \\
&= \int_0^\infty e^{-\mu t} \int_0^\infty e^{-\lambda s} T(t+s)x \, ds \, dt.
\end{aligned}$$

Außerdem gilt natürlich nach der Definition der Laplace-Transformierten \hat{T} für jedes $x \in X$

$$\hat{T}(\mu)\hat{T}(\lambda)x = \int_0^\infty e^{-\mu t} \int_0^\infty e^{-\lambda s} T(t)T(s)x \, ds \, dt.$$

„(a) \Rightarrow (b)“ Gilt $\hat{T}(\lambda) = R(\lambda, A)$ für alle $\lambda > \omega$, so gilt dank der Resolventengleichung $(\mu - \lambda)\hat{T}(\mu)\hat{T}(\lambda) = \hat{T}(\lambda) - \hat{T}(\mu)$ für alle $\lambda, \mu > \omega$. Also ist mit obiger Rechnung

$$\int_0^\infty e^{-\mu t} \int_0^\infty e^{-\lambda s} T(t+s)x \, ds \, dt = \int_0^\infty e^{-\mu t} \int_0^\infty e^{-\lambda s} T(t+s)x \, ds \, dt$$

und der Eindeigkeitssatz 1.6 für die Laplace-Transformierte liefert $T(t+s) = T(t)T(s)$ für alle $s, t \geq 0$.

Wegen $T(0) = T(0+0) = T(0)T(0)$ ist dann $T(0)$ eine Projektion. Wir zeigen nun, dass $T(0)$ injektiv ist, denn dann muss $T(0) = I$ gelten. Sei also $x \in X$ mit $T(0)x = 0$ gegeben. Dann gilt für alle $t > 0$

$$T(t)x = T(t+0)x = T(t)T(0)x = T(t)0 = 0,$$

also ist für ein beliebiges $\lambda > \omega$

$$R(\lambda, A)x = \hat{T}(\lambda)x = \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} T(t)x \, dt = 0$$

und da die Resolvente injektiv ist, haben wir $x = 0$.

„(a) \Leftarrow (b)“ Aus obiger Rechnung folgt mit der Voraussetzung $T(t+s) = T(t)T(s)$ nun $(\mu - \lambda)\hat{T}(\mu)\hat{T}(\lambda) = \hat{T}(\lambda) - \hat{T}(\mu)$, d.h. $\{\hat{T}(\lambda) : \lambda > \omega\}$ ist eine Pseudoresolvente. Es bleibt wegen Satz 1.10 noch zu zeigen, dass $\hat{T}(\lambda)$ für ein $\lambda > \omega$ injektiv ist. Sei also $\lambda > \omega$ und $x \in X$ mit $\hat{T}(\lambda)x = 0$ gegeben. Dann gilt mit der Resolventengleichung für jedes $\mu > \omega$

$$\hat{T}(\mu)x = \hat{T}(\lambda)x - (\mu - \lambda)\hat{T}(\mu)\hat{T}(\lambda)x = 0.$$

Also ist wieder mit Satz 1.6 $T(t)x = 0$ für alle $t \geq 0$. Insbesondere gilt also $x = T(0)x = 0$. \square

Wir haben in der Definition einer C_0 -Halbgruppe nicht vorausgesetzt, dass T exponentiell beschränkt ist. Tatsächlich folgt das schon aus obiger Definition.

SATZ 1.13. *Ist T eine C_0 -Halbgruppe auf X , so gibt es Konstanten $M \geq 0$ und $\omega \in \mathbb{R}$ mit $\|T(t)\|_{\mathcal{L}(X)} \leq Me^{\omega t}$ für alle $t \geq 0$.*

BEWEIS. Sei $x \in X$. Dann ist die Abbildung $\xi_x : [0, 1] \rightarrow X$ mit $\xi_x(t) := T(t)x$ stetig, d.h. die Menge $\{T(t)x : t \in [0, 1]\} \subseteq X$ ist kompakt und damit beschränkt für jedes $x \in X$. Nach dem Satz von der gleichmäßigen Beschränktheit ist damit auch $\{T(t) : t \in [0, 1]\}$ in $\mathcal{L}(X)$ beschränkt. Also ist $M := \sup_{t \in [0, 1]} \|T(t)\|_{\mathcal{L}(X)} < \infty$.

Sei nun $t \geq 0$ und $t = n + s$ mit $n \in \mathbb{N}_0$ und $s \in [0, 1)$. Dann gilt für $\omega = \log(M)$

$$\|T(t)\|_{\mathcal{L}(X)} = \|T(s)T(n)\|_{\mathcal{L}(X)} = \|T(s)T(1)^n\|_{\mathcal{L}(X)} \leq MM^n = Me^{\omega n} \leq Me^{\omega t}.$$

\square

Die Halbgruppeneigenschaft $T(t+s) = T(t)T(s)$, die hier die exponentielle Beschränktheit gratis mitliefert, hat noch weitere angenehme Folgen. Als Beispiel geben wir den folgenden Satz an.

SATZ 1.14. *Gelten für $T : [0, \infty) \rightarrow \mathcal{L}(X)$ die Beziehungen $T(0) = I$ und $T(t+s) = T(t)T(s)$ für alle $t, s \geq 0$, so ist T genau dann stark-stetig, wenn dies in Null gilt, d.h. wenn $\lim_{t \searrow 0} T(t)x = x$ für alle $x \in X$ gilt.*

DEFINITION 1.15. *Sei T eine C_0 -Halbgruppe auf X . Der nach Satz 1.10 existierende abgeschlossene lineare Operator $(A, D(A))$ heißt Erzeuger oder Generator von T .*

Wir sammeln einige wichtige Beziehungen zwischen Halbgruppe und Generator.

SATZ 1.16 (Allerweltsformel). Sei T eine C_0 -Halbgruppe auf einem Banachraum X mit Generator $(A, D(A))$. Dann gelten die folgenden Aussagen.

- (a) $T(t)R(\mu, A) = R(\mu, A)T(t)$ für alle $t \geq 0$ und alle $\mu \in \rho(A)$.
- (b) Ist $x \in D(A)$, so gilt $T(t)x \in D(A)$ und $AT(t)x = T(t)Ax$ für alle $t \geq 0$.
- (c) Es ist $x \in D(A)$ und $Ax = y$ genau dann, wenn $\int_0^t T(s)y \, ds = T(t)x - x$ gilt.
- (d) Für jedes $x \in X$ und jedes $t > 0$ gilt $\int_0^t T(s)x \, ds \in D(A)$ und $A \int_0^t T(s)x \, ds = T(t)x - x$.
- (e) A ist dicht definiert, d.h. $\overline{D(A)} = X$.
- (f) Es ist genau dann $x \in D(A)$, wenn der Grenzwert $y := \lim_{t \searrow 0} \frac{T(t)x - x}{t}$ existiert. In diesem Fall gilt $Ax = y$.

BEWEIS. **Zu (a):** Sei $x \in X$ und $\lambda \geq \omega$, wobei ω die Konstante aus der exponentiellen Beschränktheit von T ist (vgl. Satz 1.13). Dann gilt

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-\lambda t} T(t)R(\mu, A)x \, dt &= R(\lambda, A)R(\mu, A)x = R(\mu, A)R(\lambda, A)x \\ &= R(\mu, A) \int_0^\infty e^{-\lambda t} T(t)x \, dt = \int_0^\infty e^{-\lambda t} R(\mu, A)T(t)x \, dt \end{aligned}$$

und mit Satz 1.6 folgt die Behauptung.

Zu (b): Sei $x \in D(A)$ und $\lambda > \omega$. Dann ist mit Hilfe von (a)

$$T(t)x = T(t)R(\lambda, A)(\lambda - A)x = R(\lambda, A)T(t)(\lambda - A)x \in D(A)$$

und wir erhalten durch Anwendung von $\lambda - A$ auf diese Gleichung

$$(\lambda - A)T(t)x = T(t)\lambda x - T(t)Ax,$$

d.h. $AT(t)x = T(t)Ax$.

Zu (c): Für alle $y \in X$ und alle $\lambda > \omega$ gilt mit partieller Integration

$$\begin{aligned} R(\lambda, A)y &= \int_0^\infty e^{-\lambda t} T(t)y \, dt \\ &= e^{-\lambda t} \int_0^t T(s)y \, ds \Big|_0^\infty + \lambda \int_0^\infty e^{-\lambda t} \int_0^t T(s)y \, ds \, dt. \end{aligned}$$

Der erste Summand ist nun Null, da

$$\begin{aligned} \left\| e^{-\lambda t} \int_0^t T(s)y \, ds \right\|_X &\leq M e^{-\lambda t} \int_0^t e^{\omega s} \, ds \|y\|_X \\ &= \frac{M}{\omega} e^{-\lambda t} (e^{\omega t} - 1) \|y\|_X \leq \frac{M}{\omega} e^{-(\lambda - \omega)t} \|y\|_X \rightarrow 0 \end{aligned}$$

für $t \rightarrow \infty$ gilt.

Damit ist

$$R(\lambda, A)y = \lambda \int_0^\infty e^{-\lambda t} \int_0^t T(s)y \, ds \, dt.$$

Andererseits gilt für jedes $x \in X$

$$\lambda R(\lambda, A)x - x = \lambda \int_0^\infty e^{-\lambda t} T(t)x \, dt - \lambda \int_0^\infty e^{-\lambda t} \, dt x = \lambda \int_0^\infty e^{-\lambda t} (T(t)x - x) \, dt.$$

Mit Hilfe dieser Betrachtungen beweisen wir nun zunächst „ \Rightarrow “. Ist $x \in D(A)$ und $y = Ax$, so gilt

$$R(\lambda, A)y = R(\lambda, A)Ax = -R(\lambda, A)(\lambda - A)x + \lambda R(\lambda, A)x = \lambda R(\lambda, A)x - x.$$

Also gilt

$$\lambda \int_0^\infty e^{-\lambda t} (T(t)x - x) \, dt = \lambda \int_0^\infty e^{-\lambda t} \int_0^t T(s)y \, ds \, dt$$

und Satz 1.6 liefert wieder die Behauptung.

Zum Beweis von „ \Leftarrow “ beobachten wir, dass aus der Voraussetzung und obigen Betrachtungen $\lambda R(\lambda, A)x - x = R(\lambda, A)y$ folgt. Damit ist $x = R(\lambda, A)(\lambda x - y) \in D(A)$ und es gilt $\lambda x - Ax = \lambda x - y$, also $Ax = y$.

Zu (d): Sei $x \in X$ und $\lambda > \omega$. Setzen wir $y = R(\lambda, A)x$, so ist $y \in D(A)$ und es gilt mit (c)

$$\int_0^t T(s)x \, ds = \int_0^t T(s)\lambda y \, ds - \int_0^t T(s)Ay \, ds = \lambda \int_0^t T(s)y \, ds - T(t)y + y.$$

Nun ist $T(\cdot)y \in C((0, \infty); D(A))$, also gilt nach Satz 1.2 (b) und der Aussage in (b), dass $\int_0^t T(s)x \, ds \in D(A)$ ist und

$$\begin{aligned} A \int_0^t T(s)x \, ds &= \lambda \int_0^t T(s)Ay \, ds - T(t)Ay + Ay \stackrel{(c)}{=} \lambda(T(t)y - y) - T(t)Ay + Ay \\ &= T(t)(\lambda - A)y - (\lambda - A)y = T(t)x - x \end{aligned}$$

gilt.

Zu (e): Sei $x \in X$. Nach (d) gilt $x_\varepsilon := \frac{1}{\varepsilon} \int_0^\varepsilon T(s)x \, ds \in D(A)$ für jedes $\varepsilon > 0$ und dank der Stetigkeit von $s \mapsto T(s)x$ in X ist $\lim_{\varepsilon \searrow 0} x_\varepsilon = T(0)x = x$.

Zu (f): Zum Beweis von „ \Rightarrow “ sei $x \in D(A)$. Dann gilt mit (c)

$$\frac{T(t)x - x}{t} = \frac{1}{t} \int_0^t T(s)Ax \, ds \rightarrow Ax \quad (t \searrow 0).$$

Es bleibt also „ \Leftarrow “ zu beweisen. Sei dazu $x \in X$ gegeben, so dass der Grenzwert $y := \lim_{t \searrow 0} \frac{1}{t}(T(t)x - x)$ in X existiert. Wir setzen

$$x_n := n \int_0^{1/n} T(s)x \, ds, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Dann ist $x_n \in D(A)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ dank (d) und wie in (e) sieht man $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ in X . Weiter gilt mit (d) und nach Voraussetzung

$$Ax_n = nA \int_0^{1/n} T(s)x \, ds = n(T(1/n)x - x) \rightarrow y \quad (n \rightarrow \infty).$$

Die Abgeschlossenheit von A liefert nun sofort $x \in D(A)$ und $Ax = y$, also die Behauptung. \square

Führen wir die gedankliche Analogie zur Exponentialfunktion fort und setzen im Geiste $T(t) = e^{tA}$, so sind eigentlich alle Formeln im obigen Satz ganz natürlich. Als Beispiel schreiben wir uns (c) um:

$$\int_0^t T(s)y \, ds = \int_0^t e^{sA} Ax \, ds = e^{sA} x \Big|_0^t = e^{tA} x - x = T(t)x - x.$$

Man wiederhole selbiges zur Übung mit (f)!

Ist also A der Generator einer C_0 -Halbgruppe T , so kann man mit einiger Berechtigung statt $T(t)$ auch e^{tA} schreiben (was auch oft gemacht wird).

Zum Abschluss wollen wir natürlich noch zeigen, dass unsere Halbgruppen wirklich eine Lösung des abstrakten Cauchy-Problems (ACP) liefern.

THEOREM 1.17. *Ist A der Generator einer C_0 -Halbgruppe T auf einem Banachraum X und $u_0 \in D(A)$, so ist $u(t) := T(t)u_0$, $t \geq 0$, die eindeutige Lösung von (ACP).*

BEWEIS. Da T stark-stetig ist, gilt zunächst $u \in C([0, \infty); X)$. Weiter ist mit $u_0 \in D(A)$ nach Satz 1.16 (b) auch $u(t) \in D(A)$ für alle $t \geq 0$ und $Au(t) = T(t)Au_0 \in C([0, \infty); X)$, d.h. wir haben sogar $u \in C([0, \infty); D(A))$. Außerdem gilt mit (c)

$$u(t) = T(t)u_0 = u_0 + \int_0^t T(s)Au_0 \, ds,$$

was eine nach dem Hauptsatz auf $(0, \infty)$ stetig nach t differenzierbare Funktion ist. Damit ist auch $u \in C^1((0, \infty); X)$ und wir haben

$$\frac{d}{dt}u(t) = \frac{d}{dt} \int_0^t T(s)Au_0 \, ds = T(t)Au_0 = AT(t)u_0$$

mit Hilfe von (b). Da schließlich auch $u(0) = T(0)u_0 = u_0$ gilt, ist also u eine Lösung von (ACP).

Es bleibt noch die Eindeutigkeit zu zeigen. Sei dazu u irgendeine Lösung von (ACP), die den Regularitätsanforderungen aus 1.7 genügt. Für ein beliebig vorgegebenes $\tau > 0$ setzen wir nun

$$w(t) := T(\tau - t)u(t), \quad t \in [0, \tau].$$

Dann gilt mit der gleichen Begründung wie oben und Satz 1.16 (b)

$$\frac{d}{dt}w(t) = -AT(\tau - t)u(t) + T(\tau - t)u'(t) = T(\tau - t)(u'(t) - Au(t)) = 0,$$

da u eine Lösung von (ACP) ist. Das bedeutet aber, dass w auf $[0, \tau]$ konstant ist, d.h. wir haben

$$u(\tau) = w(\tau) = w(0) = T(\tau)u_0 \quad \text{für alle } \tau > 0$$

und sind fertig. □

Natürlich ist dieses Ergebnis bis jetzt nur von eingeschränktem Nutzen, solange wir nicht wissen, welche Operatoren denn überhaupt Erzeuger von C_0 -Halbgruppen sind. Ja, es könnte sogar sein, dass es außer beschränkten Operatoren, für die man mit Hilfe der Exponentialreihe sogar eine normstetige Halbgruppe erhält, gar keine Erzeuger gibt. Wir werden daher in den nächsten Abschnitten Kriterien beweisen, wann ein (unbeschränkter) Operator ein Erzeuger ist.

2. Der Satz von Hille-Yosida

Wenden wir uns also der Frage zu, für welche unbeschränkten Operatoren A wir eine C_0 -Halbgruppe $T(= (e^{tA})_{t \geq 0})$ finden können. Der Ansatz diese über die Exponentialreihe zu definieren, fällt aus Konvergenzgründen ebenso flach wie die Verwendung von $e^{tA} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + tA/n)^n$. Um diese Problematik zu umgehen, werden wir A durch geeignete beschränkte Operatoren A_n , $n \in \mathbb{N}$, approximieren und dann e^{tA} durch Approximation mittels e^{tA_n} erhalten. Das liefert die folgende Charakterisierung, die das Hauptresultat dieses Abschnitts ist.

THEOREM 2.1 (Hille, Yosida, 1948). *Es sei $(A, D(A))$ ein linearer Operator in einem Banachraum X mit $\overline{D(A)} = X$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent.*

- (a) A erzeugt eine C_0 -Halbgruppe T von Kontraktionen auf X , d.h. $\|T(t)\|_{\mathcal{L}(X)} \leq 1$ für alle $t \geq 0$.
- (b) $(0, \infty) \subseteq \varrho(A)$ und $\|R(\lambda, A)\|_{\mathcal{L}(X)} \leq 1/\lambda$ für alle $\lambda > 0$.
- (c) $\{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(\lambda) > 0\} \subseteq \varrho(A)$ und $\|R(\lambda, A)\|_{\mathcal{L}(X)} \leq 1/\operatorname{Re}(\lambda)$ für alle diese λ .

Zum Beweis dieses Theorems benötigen wir noch einige Vorarbeiten. Wir beginnen mit einer in vielen Zusammenhängen nützlichen Methode, dem sogenannten Rescaling.