



Lineare Algebra II

2. Übung

Gruppenübungen

(G 7) Orthonormalisierung

Gegeben seien die Vektoren $\mathbf{b}_1 = (1 \ 1 \ 1 \ 1)^T$, $\mathbf{b}_2 = (1 \ 0 \ 1 \ 0)^T$ und $\mathbf{b}_3 = (2 \ 1 \ 1 \ 2)^T$.

- (a) Konstruieren Sie eine Orthonormalbasis der linearen Hülle $\text{lin}(b_1, b_2, b_3)$.
- (b) Zeigen Sie, daß der Vektor $\mathbf{v} = (\frac{3}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{-5}{2} \ \frac{9}{2})^T$ in der linearen Hülle $\text{lin}(b_1, b_2, b_3)$ liegt und stelle ihn als Linearkombination der in Teil a) konstruierten Basis dar.

(G 8) Komplementärräume

Es seien V ein endlichdimensionaler euklidischer Vektorraum sowie $U, W \leq V$ Untervektorräume von V . Beweisen Sie die folgenden Gleichungen:

- (a) $(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$
- (b) $(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp$
- (c) $V = U \oplus U^\perp$
- (d) $\dim U^\perp = \dim V - \dim U$

(G 9) Hyperebenen

Es sei V ein endlichdimensionaler reeller Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle -, - \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ und $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ ein Vektor in V .

- (a) Zeigen Sie, daß die Menge \mathbf{v}^\perp eine Hyperebene (d.h. ein Untervektorraum der Kodimension 1) ist.
- (b) Beschreiben Sie die Spiegelung $\sigma_{\mathbf{v}}$ an der Hyperebene \mathbf{v}^\perp durch \mathbf{v} und das Skalarprodukt. Geben sie die Abbildungsvorschrift an.

(G 10)

Führe das Schmidtsche Orthonormalisierungsverfahren mit den Vektoren

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 10 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

aus.

Welches Problem tritt dabei auf und was ist dessen Ursache?

(G 11)

Komplexe quadratische komplexe Matrizen A , welche die Gleichung $A^*A = E$ erfüllen, heißen *unitär*.

- (a) Ist U unitär, so ist auch U^* unitär.
- (b) Eine $n \times n$ -Matrix U ist genau dann unitär, wenn die Spalten von U eine ON-Basis von \mathbb{C}^n bilden.

(G 12)

Wir betrachten den reellen Vektorraum Raum V aller Polynome vom Grad höchstens 2 auf dem Einheitsintervall. Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis bezüglich des Skalarproduktes

$$\langle p, q \rangle := \int_0^1 p(x)q(x) dx.$$

Hausübungen

(H 4) Die unitäre Gruppe, 10 Punkte

Komplexe quadratische Matrizen A , welche die Gleichung $A^*A = E$ erfüllen, heißen *unitär*. Die Menge aller unitären $n \times n$ -matrizen wird mit $U(n)$ bezeichnet.

- (a) Beweisen Sie, daß $U(n)$ eine Gruppe ist.
- (b) Beweisen Sie, daß jede unitäre $n \times n$ -Matrix eine Isometrie $\mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ beschreibt (d.h. daß die lineare Abbildung Abstände von Vektoren erhält).
- (c) Beweisen Sie, daß Eigenwerte unitäre Abbildungen Betrag 1 haben.

(H 5) 10 Punkte

Konstruieren Sie eine Orthogonalbasis des \mathbb{C}^3 , in der der Vektor $(1 - i, 1 + i, 2i)^T$ vorkommt.

(H 6) 10 Punkte

Es sei V ein endlichdimensionaler komplexer Vektorraum und $A : V \rightarrow V$ ein selbstadjungierter Endomorphismus.

- (a) Beweisen Sie, daß A nur reelle Eigenwerte haben kann.
- (b) Zeigen Sie, daß es einen Eigenvektor $0 \neq v$ von A gibt und daß v^\perp ein A -invarianter Untervektorraum ist.
- (c) Zeigen Sie, daß A diagonalisierbar ist.