



4. Übung zu Lineare Algebra f. Ph.

Aufgabe 9 – Minitest:

In dieser Aufgabe sei V der reelle Vektorraum \mathbb{R}^n , $n \in \mathbb{N}$ mit $n > 0$.
Welche der folgenden Aussagen ist richtig? Begründen Sie Ihre Antwort.

- 1) Seien $u, v \in V$ mit $u, v \neq 0$. Dann ist die lineare Hülle $W := \text{lin}(\{u, v\})$ ein Unterraum von V .
- 2) Es gibt insgesamt $n + 1$ erzeugende Systeme von V .
- 3) Die Menge $\{2008\}$ ist ein erzeugendes System von \mathbb{R} .
- 4) Jedes lineare inhomogene Gleichungssystem in V besitzt eine Lösung.
- 5) Jedes lineare homogene Gleichungssystem, das mindestens zwei Lösungen in V hat, hat unendlich viele.
- 6) 0 ist eine Lösung von jedem linearen homogenen Gleichungssystem in V .
- 7) Die Menge aller Lösungen jedes linearen inhomogenen Gleichungssystems ist ein Untervektorraum in V .
- 8) Ein aus n Variablen und n Gleichungen bestehendes lineares Gleichungssystem kann höchstens n lineare unabhängige Lösungen besitzen.

Aufgabe 10 – Lineare Gleichungssysteme:

Sei $(\mathbb{K}, +, \cdot, 0, 1)$ ein Körper und $\alpha_1, \alpha_2, \alpha, \beta \in \mathbb{K}$.

- 1) Wir betrachten die Gleichung $\alpha x = \beta$ in \mathbb{K} .
 - a) Für welche α, β besitzt die Gleichung eine eindeutige Lösung?
 - b) Für welche α, β besitzt die Gleichung keine Lösung?
 - c) Für welche α, β besitzt die Gleichung unendlich viele Lösungen?

Hinweis: Es gibt $2^2 = 4$ Fallunterscheidungen.

- 2) Betrachten wir die Gleichung $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = \beta$ in \mathbb{K}^2
 - a) Für welche $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ besitzt die Gleichung eine eindeutige Lösung?
 - b) Für welche $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ besitzt die Gleichung keine Lösung?
 - c) Für welche $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ besitzt die Gleichung unendlich viele Lösungen?
 - d) Sei $\mathbb{K}^2 = \mathbb{R}^2$. Skizzieren Sie jeweils die Lösungsmengen.

Hinweis: Es gibt $2^3 = 8$ Fallunterscheidungen.

Aufgabe 11 – Basis:

Im \mathbb{R}^3 betrachten wir die Untervektorräume

$$U := \text{lin}\{(1, 0, -1)^t, (-1, 1, 0)^t\}, \quad V := \{(x_1, x_2, x_3)^t \in \mathbb{R}^3 : x_2 + x_3 = 0\}$$

- 1) Bestimmen Sie jeweils eine Basis von U , V , $U \cap V$, $U + V$.
- 2) Welche Dimension hat $U + V$.

Hausaufgabe 10 – Untervektorräume:

Es sei $V = \mathbb{Q}^4$ (mit Zeilenvektoren als Elemente),

$$M := \{(1, 2, 3, 4), (2, 0, 1, -1), (1, 1, 1, 1), (1, 0, 0, -1)\} \subseteq V,$$

$U = \text{lin}(M)$ der von den Vektoren in M erzeugte Untervektorraum von V sowie $v = (1, -1, 0, 2)$ und $w = (1, 0, 0, 2)$. Überprüfen Sie, ob v und w in U enthalten sind.

Hausaufgabe 11 – Lineare Gleichungssysteme:

- (i) Lösen Sie das folgende lineare Gleichungssystem über \mathbb{R} mit Hilfe des Gauß-Algorithmus. Für welche Werte von $a \in \mathbb{R}$ hat es keine, genau eine bzw. unendlich viele Lösungen?

$$\begin{array}{rclcl} 2x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & = & -1 \\ 2x_1 & + & a^2x_2 & + & 2x_3 & = & a \\ 2x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & 1 \end{array}$$

- (ii) Es sei ein inhomogenes lineares Gleichungssystem über \mathbb{R} mit k Gleichungen und in $k + 1$ Variablen gegeben. Wie kann sich die Anzahl der Lösungen dieses Systems ändern, wenn man eine Gleichung hinzunimmt?
- (iii) Was ändert sich, wenn das System jetzt homogen ist und eine homogene Gleichung hinzukommt?

Hausaufgabe 12 – Lineare Unabhängigkeit:

Für welche $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sind die folgenden Vektoren $u = (\alpha^2, 1, \beta)$, $v = (\beta, -1, 1)$ linear unabhängig?