



6. Übung zu Lineare Algebra f. Ph.

Aufgabe 1

(10 Punkte)

Seien V ein n -dimensionaler Vektorraum und W ein m -dimensionaler Vektorraum über demselben Körper \mathbb{K} . Ferner sei $f: V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung.

- $\text{Ker}(f) =$
- $\text{Im}(f) =$
- Geben Sie die Dimensionsformel für f an.
- Eine Menge $U \subset V$ ist ein Untervektorraum von V , falls ...
- $\{u_1, \dots, u_k\} \subset V$ mit $k \leq n$ sind linear abhängig genau dann wenn...

Lösung:

- $\text{Ker}(f) = \{x \in V : f(x) = 0\}$. (2 Punkte)
- $\text{Im}(f) = \{f(x) : x \in V\}$. (2 Punkte)
- $\text{Ker}(f) + \text{Im}(f) = \dim(V)$. (2 Punkte)
- Eine Menge $U \subset V$ ist ein Untervektorraum von V , falls es gilt für alle $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ und alle $v, w \in U$
$$\lambda v + \mu w \in U. \quad (2 \text{ Punkte})$$
- $\{u_1, \dots, u_k\} \subset V$ mit $k \leq n$ sind linear abhängig genau dann wenn das linear Gleichungssystem $\lambda_1 \cdot u_1 + \dots + \lambda_k \cdot u_k = 0$ eine nichttriviale Lösung besitzt. (2 Punkte)

Aufgabe 2

(10 Punkte)

In dieser Aufgabe sei V der reelle Vektorraum \mathbb{R}^n , $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$.

Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt, für jede falsche Antwort wird ein Punkt abgezogen. Die minimale Punktzahl dieser Aufgabe liegt bei 0.

- Die Vektoren $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ sind linear abhängig.
 Richtig. Falsch.
- Die Menge der rationalen Zahlen \mathbb{Q} ausgestattet mit der üblichen Addition und Multiplikation, ist ein Körper.
 Richtig. Falsch.
- Seien $v, w \in V$ zwei linear unabhängige Vektoren, dann ist die Menge $U := \{\lambda \cdot v + \mu \cdot w : \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$ ein Untervektorraum von V .
 Richtig. Falsch.
- Seien $v, w \in V$ zwei linear abhängige Vektoren, dann ist die Menge $U := \{\lambda \cdot v + \mu \cdot w : \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$ ein Untervektorraum von V .
 Richtig. Falsch.

- e) Es gibt einen nichttrivialen Vektorraum, in dem es nur endlich viele Vektoren gibt.
 Richtig. Falsch.
- f) Seien U, W Untervektorräume von V . Dann sind $U \cap W$ und $U + W$ Vektorräume.
 Richtig. Falsch.
- g) Jedes inhomogene lineare Gleichungssystem in V besitzt eine Lösung.
 Richtig. Falsch.
- h) Die Anzahl der Pivotvariablen in der Zeilenstufenform (=Rang des LGS) ist die maximale Anzahl der linear unabhängigen Vektoren des Lösungsraums.
 Richtig. Falsch.
- i) Jede linear unabhängige Familie in V läßt sich zu einer Basis fortsetzen.
 Richtig. Falsch.
- j) Die Funktion $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$ ist eine lineare Abbildung.
 Richtig. Falsch.

Lösung:

- a) Falsch.
b) Richtig.
c) Richtig.
d) Richtig.
e) Richtig.
f) Richtig.
g) Falsch.
h) Falsch.
i) Richtig.
j) Falsch.

Aufgabe 3*(5 Punkte)*

Seien \mathbb{C}^2 ein Vektorraum über \mathbb{C} und $c \in \mathbb{C}$ eine Konstante. Wir betrachten ein lineares Gleichungssystem

$$\begin{aligned} iz_1 + z_2 &= c \\ z_1 - z_2 &= 1 + i \end{aligned}$$

- a) Bestimmen Sie alle Lösungen in \mathbb{C}^2 des linearen Gleichungssystems.
b) Gibt es ein $c \in \mathbb{C}$, so dass das LGS keine Lösung besitzt?

Lösung:

- a) Aus der ersten Gleichung folgt $z_2 = c - iz_1$, in die zweite Gleichung einsetzen erhalten wir $z_1(1+i) = (1+i) + c \Rightarrow z_1 = 1 + \frac{c}{1+i}$. (2 Punkte)
Diese wieder in die erste Gleichung einsetzen ergibt $z_2 = c - i - \frac{ic}{1+i}$. (1 Punkte)
- b) Aus a) folgt, dass die Lösbarkeit des LGSs nicht von c abhängt. Es gibt für jedes $c \in \mathbb{C}$ eine Lösung in \mathbb{C}^2 . (2 Punkte)

Aufgabe 4

(8 Punkte)

Gegeben sei folgendes Gleichungssystem

$$3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 0$$

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 0$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0$$

$$x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0$$

- a) Bestimmen Sie eine Basis des Lösungsraums.
- b) Was ist die Dimension des Lösungsraums?

Lösung:

- a) Gleichungen umsortieren:

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0$$

$$3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 0$$

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 0$$

$$x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0$$

Zeile 3 und Zeile 2 mit Zeile 1 subtrahieren ergibt

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0$$

$$0 - 2x_2 - 4x_3 - 6x_4 = 0$$

$$0 - x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 0$$

$$x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0$$

(1 Punkte)

Nach einer weiteren Kürzung erhalten wir

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0$$

$$x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0$$

(1 Punkte)

Setze z.B. $x_3 = \lambda, x_4 = \mu$ so erhalten wir $x_2 = -2\lambda - 3\mu$ und $x_1 = \lambda + 2\mu$.

(2 Punkte)

Die Lösung

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(2 Punkte)

- b) Die Anzahl der Pivotvariablen ist 2. (1 Punkte)
Die Dimension der Lösungsraum ist 2. (1 Punkte)

Aufgabe 5 (10 Punkte)

Erweitern Sie $\{u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\}$ zu einer Basis des Vektorraums \mathbb{R}^3 . Mit welchem

Satz kann man sicher davon ausgehen, dass eine Basiserweiterung stets möglich ist?

Lösung: Die Vektoren u, v sind linear unabhängig. (1 Punkte)

Es ist noch ein Vektor zu konstruieren, der zu u, v unabhängig ist. (1 Punkte)

Sei $w = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ der gesuchte Vektor. Es muss gelten, dass folgendes LGS nur die triviale

Lösung 0 besitzt. (1 Punkte)

$$\lambda_1 + \lambda_2 + a\lambda_3 = 0$$

$$0 + \lambda_2 + b\lambda_3 = 0$$

$$\lambda_1 + 0 + c\lambda_3 = 0$$

(2 Punkte)

Durch Gauß-Jordan Verfahren erhalten wir folgende Stufenform

$$\lambda_1 + \lambda_2 + a\lambda_3 = 0$$

$$0 + \lambda_2 + b\lambda_3 = 0$$

$$(c - a + b)\lambda_3 = 0$$

(2 Punkte)

Da nur die triviale Lösung 0 erwünscht ist, muss es gelten: $c - a + b \neq 0$. Also z.B. $a = 0$, $b = 0$ und $c = 1$ erfüllt diese Bedingung. (1 Punkte)

Der Basisergänzungssatz garantiert uns, dass jedes linear unanhängige System sich zu einer Basis erweitern lässt. (2 Punkte)